

114



*D. Jakubowski*



# KALENDARZ LEKARSKI

## KRAKOWSKI

NA ROK

# 1893.

Na wezwanie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego

ułożył

*Dr Franciszek Murdzieński,*

*Lekarz ordynujący Szpitala ś. Ludwika.*

ROK DRUGI.

W KRAKOWIE,

NAKŁADEM KSIĘGARNI S. A. KRZYŻANOWSKIEGO.

1893.



# SPIS RZECZY.

Przedmowa.	Str.
Kalendarz kościelny.	
Spis środków lekarskich, zawartych w podręczniku terap.	I
Podręcznik terapeutyczny . . . . .	1
Nowe leki . . . . .	125
Ważniejsze krajowe i zagraniczne zakłady zdroj.-kąpielowe	142
Wybór najodpowiedniejszych zdrojowisk do leczenia poszczególnych chorób . . . . .	157
Kąpiele z dodatkiem środków lekarskich . . . . .	167
Szkodliwe połączenie leków . . . . .	168
Najwyższe dawki środków leczniczych . . . . .	169
Waga różnych dawek . . . . .	170
Porównanie wag aptekarskich . . . . .	170
Dawki przeciętne dla dzieci . . . . .	171
Porównanie dawki leków . . . . .	172
Ile kropli liczy się na gramm . . . . .	173
Leczenie zapomocą wzięwań . . . . .	173
Dawki środków używanych do wzięwań . . . . .	174
Leczenie zapomocą wstrzykiwań podskórnych . . . . .	175
Kosmetyki . . . . .	177
Norma ordynacyjna i dyspensacyjna leków na rachunek Skarbu państwa . . . . .	182
Tablica brzemienności . . . . .	185
Otrucia ostre i sposób ratowania w tychże . . . . .	186
Ratowanie pozornie zmarłych . . . . .	191
Warunki przyjmowania obłąkanych do zakładów publicznych lub prywatnych . . . . .	193
Rozbiór moczu . . . . .	195
Kilka uwag o świadectwach lekarskich . . . . .	201
Świadectwo sądowo-lekarskie . . . . .	203
O sądowych oględzinach i sekcyach zwłok . . . . .	204
Naczelne władze sanitarne . . . . .	207
Władze sanitarne w Galicyi . . . . .	207
C. k. krajowa Rada zdrowia . . . . .	208
Służba zdrowia w Galicyi . . . . .	209
Alfabetyczny spis lekarzy . . . . .	223
Alfabetyczny spis chirurgów . . . . .	228
Ogólne przepisy pocztowe . . . . .	230
Poradnik telegraficzny . . . . .	233
Skala stemplowa . . . . .	234
Notatki (4 kwartalniki w osobnych książeczkach).	

42819

W KRAKOWIE,

W DUKARNI „CZASU“ FR. KLUCZYCKIEGO I SPÓŁKI  
pod zarządem Józefa Łakocińskiego.



## PRZEDMOWA.

**P**rzychylne przyjęcie zeszłorocznego Kalendarza, będące jedyną nagrodą mozolnej pracy, skłoniło mnie do wydania następnego rocznika.

Wszystkim życzeniom Kolegów w kierunku różnych zmian co do formy, dodania pewnych specjalnych artykułów i t. p. nie byłem jeszcze w możności zadośćuczynić, raz z obawy nadmiernego powiększenia objętości rocznika, to znowu ze względu na znaczne koszty, jakieby z tego wynikły. Zwolna rozszerzę ramy tego wydawnictwa w następnych latach, zabezpieczywszy sobie już teraz współpracownictwo przy poszczególnych działach.


Nowość, jaką na wzór zagranicznych wydawnictw wprowadzam t. j. portrety naszych ulubionych Profesorów, zadowolni zapewne wszystkich.

Rozpaczam ten szereg wizerunkiem **Dra Macieja Leona Jakubowskiego**, kawalera ces. austr. orderu żelaznej Korony III klasy, Profesora n. Pedyastryi Uniw. Jag., Dyrektora Kliniki chorób dziecięcych, Członka honorowego Tow. lek. krak., Założyciela Szpitala św. Ludwika dla dzieci w Krakowie i pierwszej w Galicyi lecznicy dla dzieci skrofulicznych w Rabce.

*Dr Murdziński.*

Biblioteka Jagiellońska







# Styczeń.

# Janwar.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 N.	<b>Nowy Rok.</b> Almacha m.	20 <b>N. 4 Adw.</b> Ihnatia jep. m.
2 P.	Makarego i Martyn. ☿	21 Julianyi mucz.
3 W.	Daniela m. i Genowefy p.	22 Anastazyia mucz.
4 S.	Tytusa m. i Eugeniusza	23 Muczen. 10 w Kry.
5 C.	Emiliana p. i Telesfora	24 <i>Wigil. do Roźdest.</i>
6 P.	<b>Trzech Króli</b>	25 <b>Roźdest. Chryst.</b>
7 S.	Juliana i Lucyana m.	26 <b>Sobor Pr. Bohor.</b>
8 N.	<b>1 po 3 Kr.</b> Seweryna m.	27 <b>N. 1 po Roź. Stefana mucz.</b>
9 P.	Marcyanny panny m. ☾	28 20 tysiacz. Muczen.
10 W.	Wilhelma b. i Jana Dobr.	29 14 tysiacz. ubit. Mład.
11 S.	Higiniusza b. i Leone.	30 Anysyi prepod.
12 C.	Honoraty i Arkadyusza	31 Melanyi Rymianki
13 P.	Hilarego b. i Gotfryda w.	1 <b>Janwar. N. Obrez. Hosp.</b>
14 S.	Feliksa męcz.	2 Sylwestra papy Rym.
15 N.	<b>2 po 3 Kr. Imie Jezusa</b>	3 <b>N. 2 po Roź. Małachia pr.</b>
16 P.	Marcellego p. i Ottona w.	4 Sobor 70 apost.
17 W.	Antoniego op. wyzn.	5 <i>Wig. do Bohojawlenia</i>
18 S.	Kat. ś. Piotra w Rz. ☿	6 <b>Bohøjawlenyi Hospod.</b>
19 C.	Ferdynanda w. i Henryka	7 Sobor S. Joanna
20 P.	Fabiana i Sebastjana m.	8 Heorhia prepod.
21 S.	Agnieszki panny m.	9 Połyjewkta mucz.
22 N.	<b>3 po 3 Kr.</b> Wincentego m.	10 <b>N. 1 po B. Hryhoria jepisk.</b>
23 P.	Zaślubienie N. Maryi P.	11 Fteodosya prepod.
24 W.	Tymoteusza bisk. m.	12 Tatyanny mucz.
25 S.	Nawrócenie św. Pawła ☾	13 Jermyła mucz.
26 C.	Batyldy i Pauli wdowy	14 SS. Otec w Synai
27 P.	Jana Złotoustego b. w.	15 Pawła Ftyweysk.
28 S.	Karola W. i Walerego b.	16 Petra Weryhy
29 N.	<b>4 Staroz.</b> Franciszka Sal.	17 <b>N. 2 po B. Antonyia Welyk.</b>
30 P.	Hiacynty i Martyny p. m.	18 Aftanasya i Kyryła
31 W.	Albertonii-Ludwiki wd.	19 Makarya prepod.

## KALENDARZ ŻYDOWSKI.

5 — 17 Tekufah.

18 — 1 **Schebat.**

## ODMIANY KSIĘŻYCA.

☿ dnia 2 g. 2 m. 41 popoł.

☾ dnia 18 g. 2 m. 28 rano.

☾ dnia 9 g. 11 m. 28 wiecz.

☾ dnia 25 g. 7 m. 26 rano.



## Luty.

## Fewrał.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 S.	<i>Wigil.</i> Ignacego bisk. ☸	20 Jeuftymya Welykaho
2 C.	<b>Oczyszczenie N. Maryi P.</b>	21 Maxyma prepod.
3 P.	Błażeja biskupa męcz.	22 Tymoftea apost.
4 S.	Weroniki panny	23 Kłymenta jepisk.
5 N.	<b>5 Mięsop.</b> Agaty p. m.	24 <b>N. 3 po B.</b> Xenyi prepod.
6 P.	Doroty panny męcz.	25 Hryhorya bohosi.
7 W.	Romualda opata	26 Xenofonta prepod.
8 S.	Jana z Mathy ☾	27 Joanna Złatoust.
9 C.	Apolonii p. m. i Sabina	28 Jefrema prepod.
10 P.	Scholastyki i Sylwiana	29 Ihnatia jep. mucz.
11 S.	Hipolita i Eufrozyny	30 <b>Trzech Światytel.</b>
12 N.	<b>6 Zapustna.</b> Modesta m.	31 <b>N. 4 po B.</b> Miasop. Kyra m.
13 P.	Juliana i Katarzyny R.	1 <b>Fewrał.</b> Tryfona mucz.
14 W.	Walentego kapł. męcz.	2 <b>Strytenye Hospod.</b>
15 S.	<i>Popielec.</i> Faustyna m.	3 Symeona bohopr.
16 C.	Julianny panny męcz. ☸	4 Isydora prepod.
17 P.	Sabina bisk. i Sylwina	5 Ahaftyi mucz.
18 S.	Symeona i Konstancyi	6 Wukoła prepod.
19 N.	<b>1 Wstępna.</b> Konrada w.	7 <b>N. 5 po B.</b> Syrop. Parftenya
20 P.	Leona p. i Zenobiusza	8 <i>Post Wiel.</i> Fteodora mucz.
21 W.	Eleonory panny	9 Nykyfora mucz.
22 S.	<i>Such.</i> Kat. ś. Piotra w A.	10 Charałampia mucz.
23 C.	Florentego i Piotra D. ☾	11 Własya jep. mucz.
24 P.	<i>Such.</i> Macieja apostoła	12 Meletya archiep.
25 S.	<i>Such.</i> Wiktoryna i Wikt.	13 Martyniana prepod.
26 N.	<b>2 Sucha.</b> Aleksandra b.	14 <b>N. 1 Wstupna.</b> Auxentia pr.
27 P.	Anastazyi p. i Fortunata	15 Onysyma apost.
28 W.	Romana opata	16 Pamfyła mucz.

## KALENDARZ ŻYDOWSKI.

1 — 15 Dzień radości.  
17 — 1 **Adar.**

23 — 7 Śmierć Mojżesza.

## ODMIANY KSIĘŻYCA.

☸ dnia 1 g. 3 m. 11 rano.

☾ dnia 8 g. 9 m. 11 wiecz.

☸ dnia 16 g. 5 m. 16 wiecz.

☾ dnia 23 g. 3 m. 13 popoł.

## Marzec.

## Mart.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 S.	Albina b. i Antoniny	17 Fteodora mucz.
2 C.	Heleny ces. i Amalii ☸	18 Lwa Papy Rymskaho
3 P.	Kunegundy p. i Tycyana	19 Archyppa apost.
4 S.	Kazimierza królew. pol.	20 Lwa episk.
5 N.	<b>3 Głucha.</b> Fryderyka op.	21 <b>N. 2 Postu.</b> Tymoftea pr.
6 P.	Kolety p. i Maryana b.	22 SS. MM. w Ewhen.
7 W.	Tomasza z Akwinu w.	23 Połykarpa jep. mucz.
8 S.	Jana Bożego i Beaty	24 Obr. Gławy Joanna Kre.
9 C.	Franciszki Rzymianki	25 Tarasia archiep.
10 P.	40 Męczenników ☾	26 Porfiryra archiep.
11 S.	Konstantego Wielk.	27 Prokopia archiep.
12 N.	<b>4 Srodop.</b> Grzegorza W.	28 <b>N. 3 Postu.</b> Wasyliya pr.
13 P.	Krystyny panny	1 <b>Mart.</b> Jewdoki mucz.
14 W.	Zacharyasza p. i Matyldy	2 Fteodota mucz.
15 S.	Izabelli i Leoneyi pp.	3 Jewtropia mucz.
16 C.	Cyryaka dyakona	4 Harasyrna prepod.
17 P.	Gertrudy i Patrycego b.	5 Konona mucz.
18 S.	Aleksandra i Edwarda ☸	6 SS. 42 męczenników
19 N.	<b>5 Biała.</b> Józefa obl. NMP.	7 <b>N. 4 Postu.</b> Wasyliya mucz.
20 P.	Eufemii i Teodozyi mm.	8 Fteofylaka mucz.
21 W.	Benedykta opata w.	9 SS. 40 Męczenników
22 S.	Katarzyny król. szwedz.	10 Kondrata mucz.
23 C.	Wiktoryana i Oktawiana	11 Sofronia prepod.
24 P.	<i>Wig. 7 Bol. NP.</i> Gabr. ☾	12 Fteofana prepod.
25 S.	<b>Zwiastowanie N. Maryi P.</b>	13 Nikyfora patryar.
26 N.	<b>6 Kwietnia.</b> Teodora b.	14 <b>N. 5 Postu.</b> Wenedykta pr.
27 P.	Jana pusteln. i Ruperta	15 Ahapia mucz.
28 W.	Sykstusa pap. wyzn.	16 Sawyna mucz.
29 S.	Eustazego op. i Cyrylad.	17 Alexia prepod.
30 C.	<i>Wiecz. Pańska</i> Kwiryna	18 Kyrylla archiep.
31 P.	<i>Wielki.</i> Balbiny i Kornel.	19 Chrysanfta mucz.

## KALENDARZ ŻYDOWSKI.

1 — 13 Post. Estery.  
 2 — 14 Purim.  
 3 — 15 Schuschan-Purim.

18 — 1 **Nisan.**  
 31 — 14 Przeddzień do Paschy.

## ODMIANY KSIĘŻYCA.

☸ dnia 2 g. 5 m. 2 popoł.  
 ☾ dnia 10 g. 6 m. 13 popoł.

☸ dnia 18 g. 5 m. 33 rano.  
 ☾ dnia 24 g. 10 m. 33 rano.

## Kwiecień.

## Apriel.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 S.	<i>Wielka.</i> Hugona bisk. ☿	20 Prepod. Otec. w Ob. Saw.
2 N.	<b>Wielk. Zmartw. P.</b> Franc.	21 <b>N. 6 Postu.</b> Jakowa prepod.
3 P.	<b>Wielkan.</b> Pankracego	22 Wasyliya jepiskopa
4 W.	Izydora bisk. wyzn.	23 Nykona prep.
5 S.	Wincentego Ferer. w.	24 Zacharyi prepod.
6 C.	Celestyna papieża	25 <b>Błahowiszcze</b>
7 P.	Epifaniasza męcz.	26 <b>Piatok wełyki.</b> Sobor Hawr.
8 S.	Dyonizego bisk. w.	27 Matrony mucz.
9 N.	<b>1 Przew.</b> Maryi Kleofe ☉	28 <b>N. Woskresenye.</b> Hariona pr.
10 P.	Ezechiela proroka	29 <b>Pon. switły.</b> Marka prepod.
11 W.	Leona pap. wyzn.	30 <b>Wt. switły.</b> Joanna Listw.
12 S.	Juliusza p. i Damiana	31 Ipatya jepisk.
13 C.	Justyna m. i Idy panny	1 <b>Apriel.</b> Maryi Jehyp.
14 P.	Waleryana i Maksyma	2 Tyta prepod.
15 S.	Ludwiny i Kasyldy pp.	3 Nykyty prepod.
16 N.	<b>2 po W. Grobu Jez.</b> Lamb. ☿	4 <b>N. 1 po W.</b> Josyfa prepod.
17 P.	Rudolfa bisk. męcz.	5 Fteodula mucz.
18 W.	Apoloniusza męcz.	6 Jewtychia jepisk.
19 S.	Jerzego b. i Antonii p.	7 Heorhia prepod.
20 C.	Agnieszki z Pol.	8 Irodiona apost.
21 P.	Anzelma bisk. w.	9 Jewpsyhia jepisk.
22 S.	Sotera i Kaja mm.	10 Terentia mucz.
23 N.	<b>3 po W. Wojciecha</b> arc. ☉	11 <b>N. 2 po W.</b> Antypy jepisk.
24 P.	Jerzego m. i Saby żołn.	12 Wasyliya prepod.
25 W.	Marka ewangelisty	13 Artemona jepisk.
26 S.	Kleta i Marcelina mm.	14 Martyna papy.
27 C.	Anastazego p. i Teofila	15 Arystarcha apost.
28 P.	Witalisa m. i Waleryi p.	16 Ahapii mucz.
29 S.	Piotra męczennika	17 Symeona prepod.
30 N.	<b>4 po W.</b> Katarzyny Sen.	18 <b>N. 3 po W.</b> Joanna prepod.

### KALENDARZ ŻYDOWSKI.

1 — 15	Święto Paschy.	7 — 21	Siódme święto.
2 — 16	Drugie św. Paschy.	8 — 22	Koniec Paschy.
3 — 17	} Półświęta.	17 — 1	Ijar.
4 — 18		20 — 4	Post.
5 — 19		24 — 8	Post.
6 — 20		30 — 14	Passah-Scheni.

### ODMIANY KSIĘŻYCA.

☿ dnia 1 g. 8 m. 17 rano.	☿ dnia 16 g. 3 m. 34 popoł.
☉ dnia 9 g. 12 m. 34 popoł.	☉ dnia 23 g. 6 m. 26 rano.

# Maj.

# Maj.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA BUSKIE.
1 P.	<i>Filipa i Jakóba apost.</i> ☿	19 Joanna prep.
2 W.	Zygmunta i Atanazego	20 Fteodora prepod.
3 S.	<i>Znalezienie ś. Krzyża</i>	21 Januaria mucz.
4 C.	Floryana m. i Moniki	22 Fteodora Sykeota
5 P.	Gotarda b. i Piusa V.	23 Heorhia mucz.
6 S.	Jana w ol. i Benedykty	24 Sawwy mucz.
7 N.	<b>5 po W.</b> Flawii i Domie.	25 <b>N. 4 po W.</b> Marka Apost.
8 P.	† Stanisława bisk. Krak. m.	26 Wasyliya mucz.
9 W.	† Grzegorza Naz. b. ☾	27 Symeona jep. mucz.
10 S.	† Izydora włosc. i Joba	28 Jasona apost.
11 C.	<b>Wniebowst. P.</b> Beatryksy	29 Dewiat muczennikow
12 P.	Nereusza i Pankracego	30 Jakowa proroka
13 S.	Hilarego b. i Serwacego	1 <b>Mai.</b> Jeremia pror.
14 N.	<b>6 po W. NP.</b> Łask. Bonif.	2 <b>N. 5 po W.</b> Aftanasya Weł.
15 P.	Zofii i 3 jej córek ☾	3 Tymoftea mucz.
16 W.	Jana Nep. i Ubalda b.	4 Pełahyi mucz.
17 S.	Paschalisa w. i Torpeda	5 Iryny mucz.
18 C.	Feliksa kapuc. i Eryka	6 <b>Wozn. Hosp.</b> Jowa Prawedn.
19 P.	Piotra Cel. i Pudene.	7 Wospom. Kresta
20 S.	<i>Wigil.</i> Bernardyna Sen.	8 Joanna Bohosław.
21 N.	<b>Zesł. Ducha ś.</b> Heleny kr.	9 <b>N. 6 po W.</b> Pren. M. Nykoł.
22 P.	<b>Świąteczny.</b> Julii p. m. ☾	10 Symona Apost.
23 W.	Dezyderyusza bisk. w.	11 Mokia mucz.
24 S.	<i>Such.</i> Joanny wd. i Afry	12 Jepyfania jepisk.
25 C.	Urbana p. i Grzegorza	13 Hlykeryi mucz.
26 P.	<i>Such.</i> Filipa Nereusza	14 Isydora mucz.
27 S.	<i>Such.</i> Jana pap. męcz.	15 Pachamyja Welyk.
28 N.	<b>1 po S. SSS.</b> Trójcy. Magd.	16 <b>N. Sosz. S. Ducha.</b> Fteodora
29 P.	Maksyma b.w.i Teodozyi	17 <b>SSS. Trojcy.</b> Andronika ap.
30 W.	Feliksa pap. w. ☿	18 Fteodora prepod.
31 S.	Petronelli panny m.	19 Patrykia jepisk.

## KALENDARZ ŻYDOWSKI.

4 — 18 Święto szkolne.  
 16 — 1 **Sivan.**  
 20 — 5 Przeddz. Ziel. Świąt.

21 — 6 Zielone Święto.  
 22 — 7 Drugie święto.

## ODMIANY KSIĘŻYCA.

☿ dnia 1 g. 12 m. 23 rano.  
 ☾ dnia 9 g. 3 m. 24 rano.  
 ☾ dnia 15 g. 11 m. 46 wiecz.

☾ dnia 22 g. 3 m. 51 popoł.  
 ☿ dnia 30 g. 4 m. 22 popoł.



## Czerwiec.

## Ijun.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.		ŚWIĘTA RUSKIE.
1 C.	<b>Boże Ciało.</b> Nikodema m.	20	Ftałatea mucz.
2 P.	Eugeniusza i Erazma	21	Konstantyna i Jeleny
3 S.	Klotyldy król. i Pauli	22	Wasylyia mucz.
4 N.	<b>2 po S.</b> Flawiana bisk.	23	<b>N. 1 po S.</b> Michaiła prepod.
5 P.	Florenceyi panny	24	Symeona prepod.
6 W.	Norberta op. i Klaudysza	25	Tretye Obritenyie Hła.
7 S.	Roberta bisk. i Sabiny ☉	26	Karpa apost.
8 C.	Medarda bisk. wyzn.	27	<b>Tyło Chryst.</b> Fteraponta jep.
9 P.	<i>Serca Jez.</i> Felicyana m.	28	Nykyty prepod.
10 S.	Małgorzaty kr. Szkoek.	29	Fteodosyi mucz.
11 N.	<b>3 po S.</b> Barnaby apost.	30	<b>N. 2 po S.</b> <i>Post do Petra</i> Isaak.
12 P.	Onufrego wyznawcy	31	Jeremia apost.
13 W.	Antoniego z Padwy	1	<b>Ijun.</b> Justyna mucz.
14 S.	Bazylego W. bisk. w. ☉	2	Nykyfora patr.
15 C.	Wita i Modesta mm.	3	Łukijana mucz.
16 P.	Justyny p. i Benona b.	4	Sostradan. Pr. Boh. Mytrof.
17 S.	Adolfa b. i Marcyana m.	5	Doroftea jep. mucz.
18 N.	<b>4 po S.</b> Marka i Marcelina	6	<b>N. 3 po S.</b> Wyssariona pr.
19 P.	Gierwazego i Protaz. m.	7	Fteodora jepisk.
20 W.	Reginy i Florentyny pp.	8	Fteodora mucz.
21 S.	Alojzego Gonzagi w. ☉	9	Kyryła archiep.
22 C.	Paulina b. i Konsoreyi	10	Tymoftea jep. mucz.
23 P.	Agrypiny i Wandy pp.	11	Warftołomea apost.
24 S.	<i>Narodzenie św. Jana</i>	12	Onufrya prepod.
25 N.	<b>5 po S.</b> Wilhelma i Łucyi	13	<b>N. 4 po S.</b> Akiłyny mucz.
26 P.	Jana i Pawła braci m.	14	Jelyssea proroka
27 W.	Władysława króla w.	15	Amosa proroka
28 S.	<i>Wigilia.</i> Leona pap.	16	Tychona prep.
29 C.	<b>Piotra i Pawła apostołów</b> ☉	17	Manuiła mucz.
30 P.	Emilii i Lucyny mm.	18	Leontia mucz.

## KALENDARZ ŻYDOWSKI.

15 — 1 **Thamuz.**

## ODMIANY KSIĘŻYCA.

☉ dnia 7 g. 2 m. 43 popoł.

☉ dnia 14 g. 6 m. 51 rano.

☾ dnia 21 g. 3 m. 37 rano.

☾ dnia 29 g. 7 m. 25 rano.



# Lipiec.

# Ijuł.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 S.	Teobalda op. i Aarona	19 Judy Ftad. apost.
2 N.	6 po S. Nawiedz. NMP.	20 N. 5 po S. Meftodia jepisk.
3 P.	Alfreda i Anatolego bisk.	21 Juiyana mucz.
4 W.	Józefa Kalas. i Prokopa	22 Jewsewya jep. mucz.
5 S.	Cyrylla i Metodego ap.	23 Ahrypiny mucz.
6 C.	Izajasza i Dominiki ☾	24 Roźdest S. Joanna Krest.
7 P.	Estery kr. i Klaudyusza	25 Fewronyi prepod.
8 S.	Elźbiety król. wdowy	26 Dawyda prepod.
9 N.	7 po S. Jana z Dukli	27 N. 6 po S. Sampsona prep.
10 P.	Amalii p. i 7 braci m.	28 Kyra i Joanna
11 W.	Pelagii, Sabina i Norb.	29 Petra i Pawła Apost.
12 S.	Jana Gwałb. i Epifany	30 SS. Apost. 12.
13 C.	Małgorzaty panny m. ☾	1 Ijuł. Kosmy i Dam.
14 P.	Bonawentury doktora w.	2 Położ. Ryzy. Preś. Boh.
15 S.	Rozesł. Apost. i Henryka	3 Iakynfta mucz.
16 N.	8 po S. NP. Szkapł. i Rajn.	4 N. 7 po S. Andreia archiep.
17 P.	Aleksego w. i Berty p.	5 Aftanasia Afron.
18 W.	Szymona z Lipnicy w.	6 Sysoa prepod.
19 S.	Wincentego a Paulo w.	7 Ftomy prepod.
20 C.	Czesława i Kassyana ☾	8 Prokopya mucz.
21 P.	Daniela pror. i Praksedy	9 Pankratya jep. mucz.
22 S.	Maryi - Magdaleny	10 45 Muczen.
23 N.	9 po S. Teofila i Apolinar.	11 N. 8 po S. Jewfymyi mucz.
24 P.	Krystyny panny męcz.	12 Prokta mucz.
25 W.	Jakóba apost. i Krzyszt.	13 Hawryła archan.
26 S.	Anny Matki N. Maryi P.	14 Akyły apost.
27 C.	Natalii i Liliozy pp.	15 Kyryka mucz.
28 P.	Innocentego i Wiktora ☾	16 Aftynohema jepisk.
29 S.	Marty gosp. p. i Lucylli	17 Maryny mucz.
30 N.	10 po S. Kunegundy kr.	18 N 9 po S. Jemyłyana mucz.
31 P.	Ignacego Lojoli wyzn.	19 Makryny prepod.

## KALENDARZ ŻYDOWSKI.

2 — 18 Post. Zdob. świątyni.	23 — 10 Post. Spalenie świąt.
14 — 1 Ab.	28 — 15 Dzień radości.

## ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 6 g. 11 m. 5 wiecz.	☾ dnia 20 g. 6 m. 2 popoł.
☾ dnia 13 g. 1 m. 47 popoł.	☾ dnia 28 g. 9 m. 10 popoł.

## Sierpień.

## Awgust.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 W.	Piotra w Okowach m.	20 Ilyi proroka
2 S.	N. Maryi P. Anielskiej	21 Symeona prepod.
3 C.	Znalez. ś. Szczepana	22 Maryi Mahdałyny
4 P.	Dominika wyzn.	23 Trofyma mucz.
5 S.	NMP. Śnieżnej i Osw. ☉	24 Chrystyny mucz.
6 N.	<b>11 po S. Przemien. Pańskie</b>	25 <b>N. 10 po S. Uспен. S. Anny</b>
7 P.	Kajetana w. i Alberta	26 Jermołaja mucz.
8 W.	Cyryaka i Maryana m.	27 Pantaleimona mucz.
9 S.	Kamilla z Lel. i Romana	28 Prochora apost.
10 C.	Wawrzyńca i Filomeny	29 Kałynyka mucz.
11 P.	Zuzanny panny m. ☉	30 Syły apost.
12 S.	Klary, Hilaryi i Felicys.	31 <i>Zapust do Uspenya</i>
13 N.	<b>12 po S. Hipolita męcz.</b>	1 <b>N. 11 po S. Awgust. Prois.</b>
14 P.	<i>Wigilia. Euzebiusza m.</i>	2 Stefana mucz.
15 W.	<b>Wniebowzięcie N. M. P.</b>	3 Isaaka prepod.
16 S.	Rocha wyznawcy	4 Sedmy Otrokow
17 C.	Anastazego b. i Mirona	5 Jewsychnyia mucz.
18 P.	Heleny Szwedzkiej kr.	6 <b>Preobraz. Hospodyne</b>
19 S.	Benigny p. i Sebalda ☉	7 Demetya prepod.
20 N.	<b>13 po S. Jacka i Bernarda</b>	8 <b>N. 12 po S. Jemelyana jep.</b>
21 P.	Joanny Fremiot wdowy	9 Matfitya apost.
22 W.	Symforyana i Tymot.	10 Ławrentya mucz.
23 S.	Zacharyasza i Filipa B.	11 Jewpła mucz.
24 C.	<i>Bartłomieja apostoła</i>	12 Fotya mucz.
25 P.	Ludwika kr. francusk.	13 Maxyma prepod.
26 S.	Aleksandra m. i Zefiryna	14 Michea proroka
27 N.	<b>14 po S. Pociesz. NMP. ☽</b>	15 <b>N. 13 po S. Uspenye Pr. Bohor.</b>
28 P.	Augustyna biskupa	16 Nerukotworen. Obraz.
29 W.	Seiecie ś. Jana i Sabina	17 Myrona mucz.
30 S.	Feliksa męcz.	18 Flora i Ławra mucz.
31 C.	Rajmunda wyzn.	19 Andrea mucz.

## KALENDARZ ŻYDOWSKI.

13 — 1 **Elul.**

## ODMIANY KSIĘŻYCA.

☉ dnia 5 g. 5 m. 23 rano.

☽ dnia 11 g. 9 m. 47 wiecz.

☾ dnia 19 g. 10 m. 51 rano.

☿ dnia 27 g. 9 m. 43 wiecz.

# Wrzesień.

# Sentiabr.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 P.	Idziego opata wyzn.	20 Samuila proroka
2 S.	Stefana kr. i Kaliksty m.	21 Ftaddea apost.
3 N.	15 po S. Joach. i Bron. ☾	22 N. 14 po S. Ahaftonyka m.
4 P.	Rozalii panny	23 Łuppa mucz.
5 W.	Wawrzyńca i Urbana p.	24 Jewtychia mucz.
6 S.	Zacharyasza proroka	25 Watftołomea apost.
7 C.	Wigilia. Reginy p. m.	26 Adryana m. i Natalii m.
8 P.	Narodzenie N. Maryi P.	27 Pimena prepod.
9 S.	Gorgoniusza i Sergiusz.	28 Moysea muryna
10 N.	16 po S. Im. NP. Mikoł. ☉	29 N. 15 po S. Usik. Hł. S. Joan.
11 P.	Prota, Jacka i Teodory	30 Alexandra patryiar.
12 W.	Tobiasza w. i Gwidona	31 Położ. Poiasz. P. Bohor.
13 S.	Aureliusza bisk.	1 Sentiabr. Symona S.
14 C.	Podwyższenie ś. Krzyża	2 Mamanta mucz.
15 P.	Nikodema, Emila i Melity	3 Anftyma mucz.
16 S.	Ludmiły m. i Edity p.	4 Wawyły Swiaszczen.
17 N.	17 po S. Pietna ś. Franc.	5 N. 16 po S. Zacharyi pror.
18 P.	Józefa z Kopt. w. ☾	6 Wosp. Cud. S. Mychaila
19 W.	Januarego m. i Konst.	7 Sozonta mucz.
20 S.	Such. Eustachego i Faust.	8 Roźdestwo Pr. Bohorod.
21 C.	Mateusza apost. ew.	9 Joakima i Anny
22 P.	Such. Maurycego bisk.	10 Mynodory prepod.
23 S.	Such. Tekli panny m.	11 Fteodory prepod.
24 N.	18 po S. Władysł. z Gieln.	12 N. 17 po S. Awtonoma m.
25 P.	Kleof. i Tow. i Aurel. ☿	13 Kornyla mucz.
26 W.	Jozefata b. i Cypryana	14 Wozdwyżenye S. Kresta
27 S.	Przenies. ś. Stanisława	15 Nykity mucz.
28 C.	Wacława męcz.	15 Josafata archiep.
29 P.	Michała archaniola	17 Sofii mucz.
30 S.	Hieronima doktora w.	18 Jewmenia prepod.

## KALENDARZ ŻYDOWSKI.

10 — 29	Selichot. Przeddzien Nowego Roku.	19 — 9	Przeddzien święta poj.
11 — 1	Tischri. Nowy Rok 5654.	20 — 10	Święto pojednania.
12 — 2	Drugie święto.	24 — 14	Przeddz. św. kuczek.
13 — 3	Post. Gedaljach.	25 — 15	Święto kuczek.
		26 — 16	Drugie św. kuczek.

## ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 3 g. 10 m. 41 rano.	☾ dnia 18 g. 5 m. 19 rano.
☾ dnia 10 g. 8 m. 4 rano.	☾ dnia 25 g. 9 m. 23 wiecz.

**Październik.**

**Oktyabr.**

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 N.	<b>19 po S. NMP. Różańc.</b>	19 <b>N. 18 po S. Trofyma mucz.</b>
2 P.	<i>Aniołów Stróżów</i> ☾	20 Jewstafya mucz.
3 W.	Kandyda m. i Lukrecyi p.	21 Kodrata apost.
4 S.	Franciszka Seraf. w.	22 Foky mucz.
5 C.	Flawii i Charytyny pp.	23 Zaczat. s. Joanna Krest.
6 P.	Brunona bisk. wyzn.	24 Ftekly mucz.
7 S.	Justyny p. i Helana w.	25 Jewfrosini prepod.
8 N.	<b>20 po S. Wincentego Kadł.</b>	26 <b>N. 19 po S. Joanna Bohosł.</b>
9 P.	Dyonizego Ar. i Publii ☾	27 Kałystrata mucz.
10 W.	Franciszka Borg. w.	28 Charytona prepod.
11 S.	Placydy i Filonelli pp.	29 Kyryaka prepod.
12 C.	Maksymiliana bisk.	30 Hryhorya jep. mucz.
13 P.	Edwarda króla wyzn.	1 <b>Octiabr. Pokr. P. Boh.</b>
14 S.	Kaliksta p. i Fortunaty	2 Kypryana jepisk.
15 N.	<b>21 po S. Jadwigi i Teresy</b>	3 <b>N. 20 po S. Dyonysya m.</b>
16 P.	Pawła opata wyzn.	4 Jeroftea jepesk. mucz.
17 W.	Florentego i Małgorzaty	5 Charytyny mucz.
18 S.	Łukasza Ewangelisty ☾	6 Ftomy apost.
19 C.	Piotra z Alkantary w.	7 Sergia i Wakha
20 P.	Przenies. ś. Wojciecha	8 Pełachii prepod.
21 S.	Urszuli panny m.	9 Jakowa apost.
22 N.	<b>22 po S. Jana Kantego</b>	10 <b>N. 21 po S. Jewłampya m.</b>
23 P.	Jana Kapistr. i Seweryna	11 Fyłypa apost.
24 W.	Rafała archaniola	12 Prowa mucz.
25 S.	Kryspina i Kryspiana ☾	13 Karpa i Papyła
26 C.	Ewarysta pap. i Fulki	14 Nazarya mucz.
27 P.	Iwona w. i Sabiny m.	15 Jewftymya prepod.
28 S.	<i>Szymona i Tadeusza ap.</i>	16 Łonhyna mucz.
29 N.	<b>23 po S. Narcyza bisk.</b>	17 <b>N. 22 po S. Osyi proroka</b>
30 P.	Marcelego papieża	18 Łuki jew. apost.
31 W.	<i>Wigilia. Wölfंगा b. ☾</i>	19 Joila proroka

**KALENDARZ ŻYDOWSKI.**

1 — 21 <b>Święto palmowe.</b>	11 — 1 <b>Marcheschwan.</b>
2 — 22 Koniec kuczek.	16 — 6 } Post.
3 — 23 <b>Radość z praw.</b>	19 — 9 }
6 — 26 Tekufah.	23 — 13 }

**ODMIANY KSIĘŻYCA.**

☾ dnia 2 g. 4 m. 19 popoł.	☾ dnia 25 g. 8 m. 27 rano.
☾ dnia 9 g. 9 m. 27 wiecz.	☾ dnia 31 g. 11 m. 41 wiecz.
☾ dnia 18 g. 12 m. 20 rano.	



## Listopad.

## Nojabr.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.		ŚWIĘTA RUSKIE.
1 S.	<b>Wszystkich Świętych</b>	20	Artemia mucz.
2 C.	<i>Dzień Zaduszny.</i> Wiktor.	21	Hariona prepod.
3 P.	Huberta b. i Sylwii wd.	22	Awerkia jepisk.
4 S.	Karola Bor. i Modesty	23	Jakowa apost.
5 N.	<b>24 po S.</b> Elżbiety m.	24	<b>N. 23 po S.</b> Arefty mucz.
6 P.	Leonarda wyzn.	25	Markiana mucz.
7 W.	Herkulana i Amaranta	26	<b>Demetria mucz.</b>
8 S.	Czterech Koronatów ☉	27	Nestora mucz.
9 C.	Teodora żołn. i Ursyna	28	Terentia mucz.
10 P.	Andrzeja z Aw. i Nimfy	29	Anastasyi mucz.
11 S.	Marcina bisk. w.	30	Zynowia mucz.
12 N.	<b>25 po S.</b> Op. NP. Marcina	31	<b>N. 24 po S.</b> Stachya apost.
13 P.	Homobona i Dydaka w.	1	<b>Nojabr.</b> Kosmy i Damian.
14 W.	Serafona m. i Hipacego	2	<b>Josafata Archiep. mucz.</b>
15 S.	Leopolda wyzn.	3	Akepsymy mucz.
16 C.	Edmunda i Pawła ☾	4	Joannykia prepod.
17 P.	Salomei król. panny	5	Hałaktyona mucz.
18 S.	Pośw. kośc. Rz. i Grzeg.	6	Pawła archiep.
19 N.	<b>26 po S.</b> Stan. K. i Elżbiety	7	<b>N. 25 po S.</b> MM. 33 Melyty
20 P.	Feliksa de Valois wyzn.	8	<b>Mychała archan.</b>
21 W.	<i>Ofiarowanie N. Maryi P.</i>	9	Onysyfora mucz.
22 S.	Cecylii panny męcz.	10	Szesty apostołów
23 C.	Klemensa i Lukrecyi ☿	11	Myny mucz.
24 P.	Jana od Krzyża i Flory	12	Joanna myłostywa
25 S.	<i>Katarzyny panny męcz.</i>	13	Joanna Złatoust.
26 N.	<b>27 po S.</b> Piotra Aleks.	14	<b>N. 26 po S.</b> Fylypa ap. Zap.
27 P.	Waleryana bisk. męcz.	15	Hurya i Samon mucz.
28 W.	Rufina m. i Grzegorza p.	16	Matftea jewanhel.
29 S.	Saturnina i Illuminaty	17	Hryhoria jepisk.
30 C.	<i>Andrzeja apost.</i> ☾	18	Płatona mucz.

## KALENDARZ ŻYDOWSKI.

10 — 1 **Kislev.**

11 — 2 Pocz. modl. o deszcz.

29 — 20 Dzień próśby o deszcz.

## ODMIANY KSIĘŻYCA.

☉ dnia 8 g. 1 m. 57 popoł.

☾ dnia 16 g. 6 m. 44 popoł.

☿ dnia 23 g. 7 m. 8 popoł.

☾ dnia 30 g. 10 m. 8 rano.



## Grudzień.

## Dekabr.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 P.	Eligiusza b. i Natalii wd.	19 Awdya proroka
2 S.	<i>Post.</i> Chryzologa i Aurel.	20 Prokla i Hryhory
3 N.	<b>1 Adw.</b> Franciszka Ks.	21 <b>N. 27 po S. Wchod. Pr. Bohor.</b>
4 P.	Barbary panny męcz.	22 Fylymona apost.
5 W.	Sabby opata wyzn.	23 Amfyłochya jepisk.
6 S.	<i>Post.</i> Mikołaja i Leoncyi	24 Jekataryny mucz.
7 C.	<i>Wigilia.</i> Ambrożego b.	25 Kłymenta papy
8 P.	<b>Niepok. Pocz. N. Maryi P.</b> ☉	26 Ałpyya prepod.
9 S.	<i>Post.</i> Leokadyi i Waleryi	27 Jakowa mucz.
10 N.	<b>2 Adw. N. Maryi P. Loret.</b>	28 <b>N. 1 Adwentu.</b> Stefana m.
11 P.	Damazego papieża	29 Paramona mucz.
12 W.	Aleksego i Pawła	30 Andrea apost.
13 S.	<i>Post.</i> Łucyi i Otylii p.	1 <b>Dekabr.</b> Nauma pror.
14 C.	Nikazego b. i Spiridiona	2 Awwakuma pror.
15 P.	<i>Post.</i> Ireneusza męcz.	3 Sofonia pror.
16 S.	<i>Post.</i> Euzebiusza b. ☾	4 Warwary mucz.
17 N.	<b>3 Adw.</b> Łazarza bisk.	5 <b>N. 2 Adwentu.</b> Sawwy Osw.
18 P.	Ocz. płodu NP. i Olimpji	6 <b>Nykołaja jepisk.</b>
19 W.	Faustyna i Nemez.	7 Amwrosia jep. medyol.
20 S.	<i>Such.</i> Teofila męcz.	8 Patapia prepod.
21 C.	<i>Tomasza apostoła</i>	9 <b>Zaczat. Bohoro.</b>
22 P.	<i>Such.</i> Zenona męcz.	10 Myny Jermoh. mucz.
23 S.	<i>Such. Wigilia.</i> Wiktor. ☿	11 Danyła Stołpny
24 N.	<b>4 Adw.</b> Adama i Ewy	12 <b>N. 3 Adwentu.</b> Spyridona j.
25 P.	<b>Boże Narodzenie</b>	13 Ewstratia jepisk.
26 W.	<b>Szczepana pierwszego m.</b>	14 Ftyrsa mucz.
27 S.	<i>Jana ewangelisty</i>	15 Jełewfteryja jepisk.
28 C.	Młodzianków męcz.	16 Ahhea proroka
29 P.	Tomasza Kantuaryjsk. ☾	17 Danyła proroka
30 S.	Dawida kr. i Sabina	18 Sewastyana mucz
31 N.	<b>1 po Boż. N.</b> Sylwestra p.	19 <b>N. 4 Adwentu.</b> Wonyfatya m.

## KALENDARZ ŻYDOWSKI.

3 — 24 Wzniesienie światła.	11 — 2 Koniec pośw. świąt.
4 — 25 Pośw. świątyni.	19 — 10 Post. Oblęż. Jeruzal.
10 — 1 <b>Tebeth.</b>	

## ODMIANY KSIĘŻYCA.

☉ dnia 8 g. 8 m. 40 rano.	☿ dnia 23 g. 5 m. 36 rano.
☾ dnia 16 g. 11 m. 21 rano.	☾ dnia 29 g. 12 m. 18 rano.

# Szczawnica

w powiecie Nowotarskim w Galicyi.

powszechnie znany Zakład zdrojowo-kąpielowy,  
klimatyczny, żętyczny i kefirowy

położony w pięknej górskiej okolicy, otoczony górami,  
odznaczający się orzeźwiającem powietrzem z 7 zdrojami  
silnej szczawy sodowo-solnej i sodowo-żelazistej.

**Liczne, niedrogie a porządnie urządzone mie-**  
szkania zakładowe i w domach prywatnych  
właścicieli, przeszło **900** pokoiów, trzy głów-  
ne restauracye i kilka drugorzędnych.

Lekarzem zakładowym jest **Dr. Władysław**  
**Ściborowski**, prócz niego ośmiu lekarzy udziela  
chorym rady lekarskiej. **Stała apteka** w mieście,  
a druga w Krościenku; **mleko, żętyca, kefir.**  
**Zakład inhalacyjny, solankowy**, tudzież powietrza  
zawierającego części balsamiczne igliwiowe.  
**Zakład wodoleczniczy Dra Kołaczковского**, kąpie-  
ni z kąpielami ciepłemi, żelazistemi i borowi-  
nowemi, oraz natryskami letniemi i zimnemi,  
kąpiele rzeczne w Dunajcu i bliższym Zakład  
Ruskim Potoku. — **Czytelnia** czasopism, **wypoży-**  
**czalnia książek.** **Klub szczawnicki** dla zabawy.  
**Muzyka miejscowa.** **Teatr krakowski.** Zebrania  
towarzyskie, koncerty. **Zakład artystyczno-foto-**  
**graficzny A. Szuberta.** Poczta i telegraf w miej-  
scu. Sklepy wszelkiego rodzaju. — **Wycieczki**  
w uroczyska okolice Szczawnicy. Komunikacya  
z Krakowem i Lwowem koleją żelazną do Sta-  
rego Sącza, z kądem 41 kilometrów wybornym  
gościńcem na miejsce.

**Pora zdrojuwa trwa od 20 Maja do 20 Września.**

**Zamówienia na mieszkania** przyjmuje Zarząd Zakładu  
zdrojowego przez Stary Sącz w Szczawnicy i Zarząd Za-  
kładu zdrojowo-kąpielowego w Szczawnicy na **Miedziusiu.**

**Zamówienia na wodę mineralną** adresować wprost do  
**H. Mattoniego** w Wiedniu, albo za pośrednictwem **Zarządu**  
**Zakładu zdrojowego w Szczawnicy.**

**Pierwsza krajowa fabryka  
opatrunków chirurgicznych  
M. L. DOBROWOLSKIEGO  
magistra farmacyi,  
w Nowej Wsi przy Krakowie,  
poczta Łobzów,**

nagrodzona medalem srebrnym na Wystawie  
krajowej 1887 r.,

premiowana dyplomem honorowym  
na Wystawie przyrodniczo-lekarskiej 1888 r.,  
zostająca pod kontrolą

**Komisji Przem. krak. Tow. lekarskiego,**  
polecona przez

**krakowskie Towarzystwo lekarskie,**

wyrabia i sterylizuje wszystkie opatrunki  
antyseptyczne, a dostarcza je niżej cen fa-  
bryk zagranicznych. Sporządza też niektóre  
przetwory farmaceutyczne oraz środki dez-  
infekcyjne, jak: wapno karbolowe, torf kar-  
bolowy i sublimatowy, a oblicza je przy  
hurtownym odbiorze nadzwyczaj tanio.

**Cenniki przesyła na żądanie.**

**PP. Aptekarzom, Lekarzom i Zarządcom szpitali,  
przy znacznych stałych odbiorach opatrunków,  
robi specjalne niskie oferty.**

# SPIS ŚRODKÓW LEKARSKICH

ZAWARTYCH

## W PODRĘCZNIKU TERAPEUTYCZNYM.

- Acidum agaric.* 520, 919.  
— *arsenicus* 46, 777.  
— *benzoic* 224, 226, 263, 301, 668, 735, 823, 1007.  
— *bichloroaceticum* 312.  
— *boric.* 229, 234, 236, 307, 321, 325, 329, 338, 340, 438, 458, 538, 736, 855, 960, 1015.  
— *carbol.* 71, 131, 167, 230, 308, 320, 336, 352, 390, 391, 466, 524, 565, 760, 768, 770, 780, 991, 1008.  
— *hydrochlor. vide muriatic.*  
— *hyperosmicum* 553, 593.  
— *lacticum* 257, 578, 918.  
— *muriatic.* 171, 213, 225, 373, 374.  
— *nitric.* 311.  
— *phosphoric.* 227.  
— *pyrogallicum* 168.  
— *pyrolignos* 449, 781.  
— *salicyl.* 68, 228, 233, 359, 441, 443, 448, 456, 519, 536, 539, 589, 744, 925, 930, 992, 994, 1014.  
— *tannic.* 109, 139, 204, 223, 343, 440, 451, 462, 476, 488, 569, 663, 758, 824, 867.  
— *tartaric.* 603.  
*Aconitin.* 980.  
*Adonis* 92, 1003.  
*Aether acet.* 49, 65.  
— *sulphur.* 47, 108, 256, 583.  
*Aethylenum brom.* 437.  
*Agaricin v. acid. agaric.* 520.  
*Aloe* 45, 650.  
*Althea* 559, 662.  
*Alumen cr.* 74, 133, 140, 318, 568, 590, 715, 739.  
*Ammon. brom.* 4, 431, 625, 850.  
— *chlorat.* 58.  
— *muriat.* 566, 577.  
— *sulphoichtyol.* 474, 475, 615, 702, 703, 706, 801.  
*Amylenhydrat.* 347, 523.  
*Amylnitrit.* 101.  
*Amylum.* 387, 865.  
*Anthrarobin* \*503.  
*Antifebrin* 157.  
*Autinervin* 558.  
*Antipyrin* 59, 276, 353, 554, 618, 638, 645, 730, 732, 818, 852, 910, 942.  
*Apocodein* \*154.  
*Apomorphin* 154, 207, 416.  
*Aqua calcis* 302.  
— *chloroformii* 295.  
— *foeniculi* 199.  
— *laurocer.* 513, 564.  
— *picis* 779.  
— *plumbi* 542.  
*Arbutin* 220.  
*Argentum nitric.* 24, 77, 123, 134, 181, 232, 317, 319, 322, 327, 346, 525, 572, 959, 964, 1024.  
— *oleinic.* 345.  
*Arnica* 667, 1006.  
*Aristol.* 306, 719, 958.  
*Arsenic. v. Acid. arsen. et natr. arsen.*  
*Artemisia* 433.  
*Aseptol* 1011.




- Atropin* 182, 420, 436, 521, 543, 544.  
*Bals. copai.* 110, 112, 113, 114.  
 — *peruv.* 8, 145, 812.  
 — *tolutan.* 146.  
*Belladonna int.* 104, 251, 300, 422, 434, 612, 722, 986.  
 — *ext.* 81, 143, 365.  
*Benzin.* 912.  
*Benzol* 912 b.  
*Benzoes flor.* 262, 400, 1005.  
*Benzosol* 924.  
*Betol* 556.  
*Bismut. salicyl.* 203, 366, 673, 769.  
 — *subnitric.* 118, 199, 337, 428, 506, 790, 927.  
 — *valerianic.* 184.  
*Bitumen fagi* 390.  
*Blauda pigutki* 241.  
*Borax* 717, 854.  
*Bromoform* 734.  
*Burowa plyn* 590.  
*Butylechloral* 633, 643.  
*Calc. carbon.* 872, 873.  
 — *phosph.* 789, 788.  
*Calomel.* 96, 264, 290, 298, 333, 358, 385, 596, 606, 682, 889, 969.  
*Camphora* 64, 79, 256, 270, 274, 344, 822, 878, 950, 954.  
*Cannabis indic.* 215.  
*Capsicum* 349.  
*Cascarilla* 265.  
*Cascara sagr.* 652, 656.  
*Castoreum* 178.  
*Cera alba* 501.  
*Cerium oxalicum* 508.  
 — *valerianicum* 509.  
*Chamomilla ol.* 297.  
*China* 28.  
 — *cort. (decoct)* 61, 528, 630, 745, 830, 856.  
 — *ferrocitric.* 249.  
 — *muriatic.* 58, 526, 527, 531, 533, 617, 623, 639, 726, 817, 940, 944, 947, 983.  
 — *sulphuric.* 34.  
 — *tannic.* 202, 367, 532, 825.  
*Chinolin* 69.  
*Chloramid p. nowe leki.*  
*Chloralcroton* 640.  
*Chloralhydrat.* 277, 279, 300, 369, 382, 383, 386, 609, 690, 723, 843, 848, 849, 979, 981, 982, 989.  
*Chlorina liquid.* 877.  
*Chloroform* 80, 183, 295, 296, 605, 636, 666, 746, 771, 804.  
*Chrysarobin* 412, 497, 498, 499.  
*Cocain mur.* 105, 144, 175, 408, 500, 510, 511, 541, 665, 669, 712, 721, 724, 755, 765, 773, 916, 917, 935, 985.  
*Coccionella* 729.  
*Codein* 177, 351, 626, 731, 844, 976.  
*Coffein citric.* 75, 185, 622, 784, 999.  
 — *natrobenz.* 91, 1000.  
 — *natrosalicyl.* 617, 950.  
*Colchicum Tra.* 802.  
*Collodium* 930.  
*Collyrium adstr.* 324.  
*Colombo* 200, 265, 380.  
*Condurango* 164, 173, 174.  
*Convallar. maj.* 93, 699.  
*Coto Tra* 197.  
*Cotoin* 194.  
*Creolin* 163, 169, 447, 815, 955, 1016.  
*Creosot* 267, 738, 839, 840, 922, 923, 926, 927.  
*Croton ol.* 897.  
*Cubebae* 135.  
*Cuprum arsenicosum* 52.  
 — *sulphur.* 116, 335, 775.  
*Curare* 432, 595.  
*Dermatol* 397, \*958.  
*Digitalis infus.* 90, 292, 695, 698, 828, 995.  
 — *pulv.* 997.  
*Diuretin* \*94, 291.  
*Dover p. pulv. D.*  
*Emplastr. cerussae* 341.  
 — *Diachylon* 932.  
 — *hydrargyri* 429, 709, 883.  
 — *de melilot.* 502.  
 — *Saponat.* 429.  
*Equisetum* 94, 829.  
*Ergotin* 482, 483, 484, 492, 493.  
*Eserin* 465.  
*Eucalyptus tinct.* 530.  
*Euphorin.* 555, 621.  
*Europhen* 305.  
*Exalgin* 284, 646, 803.  
*Extr. bellad.* 408, 986 i v. *Bellad.*  
 — *chinae* 30, 31, 421.



- Extr. opii* 1, 195, 408, 479, 613,  
 660, 700, 934, 967.  
*Ferrum albuminum* 50, 248.  
 — *bromat.* 754.  
 — *carbon. sacch.* 243, 376.  
 — *hydrog. reduct.* 51, 245.  
 — *jodat. sacch.* 836.  
 — *lactic.* 246.  
 — *oxydat.* 244.  
 — *pyrophosphor.* 247, 787.  
 — *reduct.* 245.  
 — *sesquichl. ext.* 72, 128, 170,  
 313, 485, 827, 831, 832.  
 — *sulphuricum* 46, 241, 242, 486.  
*Filix mas.* 896, 898, 901.  
*Flores benz. vid. acid. benz.*  
 — *sulphur.* 73, 142, 808.  
*Folia uvae ursi* 219.  
*Gelsemium extr.* 644.  
*Glycerin* 406.  
*Guajacol* 928, 929.  
*Gummi gutti* 97, 418.  
*Haemoglobin.* 53.  
*Hydrargyr bichlor.* 237, 323, 328,  
 414, 426, 515, 579, 588, 763,  
 866, 879, 888, 970, 1009, 1010.  
 — *oxydulatum* 868, 869, 891.  
 — *praec. alb.* 29, 239, 428, 782,  
 884, 931.  
 — *praec. flav.* 238, 597.  
 — *praec. rub.* 141, 407, 679, 710.  
 — *salicyl.* 892, 893, 894.  
 — *thymolo-aceticum* 890.  
*Hydrast. canad. extr. fluid.* 368,  
 489, 491, 614, 920.  
*Hydrastinin.* 490.  
*Hyosciam. extr.* 125, 215, 627,  
 685.  
*Ichtyol.* 17, 455, 540, 799, 800.  
*Ipecacuanh. inf.* 150, 158, 159,  
 160, 205, 575, 580, 582, 628,  
 751, 774.  
*Jod* 574, 585, 677, 742, 885, 887,  
 971. *p. Tra.*  
*Jodoform* 5, 6, 7, 22, (*bacill.*) 23,  
 89, 137, 234, 303, 304, 326,  
 354, 611, 705, 863, 864, 882,  
 914, 956, 957, 1017, 1018, 1019,  
*emuls.* 1022.  
*Jodol.* 594, 678, 1020, 1023.  
*Juglans fol.* 201.  
*Juniperus* 293, 697, *ol.* 570.
- Kali brom.* 507.  
 — *carbon.* 310.  
 — *caustic.* 962.  
 — *chloricum* 60, 66, 78, 165, 286,  
 548, 741, 870, 871, 987.  
 — *hypermangan.* 120, 132, 162,  
 166, 439, 461, 517, 740, 845.  
 — *hydrojod. v. jodatum* 20, 21,  
 100, 103, 280, 294, 430, 450,  
 469, 470, 607, 616, 704, 707,  
 857, 859, 860, 937, 938, 968.  
 — *sozjodolic.* 537.  
*Kamala* 903.  
*Kosso* 899.  
*Koussinum* 902.  
*Lac. sulphur.* 9, 15, 427, 442, 503.  
*Lanolin* 694, 816.  
*Laudanum* 711. *v. Opium.*  
*Linimentum volatile* 895.  
*Liparin* 795.  
 — *alumin. acet.* 362, 363, 425, 601.  
*Liquor ammon. anis.* 107, 260,  
 821.  
 — *Burowa* 590.  
 — *ferri album.* 50, 54, 248.  
 — *kali arsenic.* 835.  
*Liquiritia pulv.* 494, 648.  
*Lithion carbon.* 83, 634.  
 — *jodat.* 82.  
*Lobelia* 1003.  
*Lupulin* 271, 272, 273.  
*Magnesia carbon.* 654.  
 — *sulphur.* 602.  
 — *usta* 379.  
*Mannit* 356.  
*Mellissa* 198.  
*Mentha pip.* 357.  
*Menthol* 457, 460, 512, 659, 766.  
*Mixt. gummos.* 193, 948.  
*Morphium muriat. int.* 149, 154,  
 176, 179, 211, 632, 658, 714,  
 725, 759, 915, 936, 939, 975,  
 978.  
 — *inj.* 252, 545.  
 — *ext.* 217, 218.  
*Naphthalin int.* 106, 905, 949.  
*Naphthol* 11, 16, 411, 518, 783,  
 809, 814, 951, 952.  
*Natr. benzoic.* 156, 268, 299, 560.  
 — *biborac.* 717.  
 — *bicarbon.* 127, 149, 153, 210,  
 370, 563, 654, 680, 681, 973, 974.

- Natr. bromat.* 275, 281, 431, 608, 953.  
 — *carbon.* 309.  
 — *chlorat.* 748.  
 — *jodatum.* 288, 550, 552, 708, 858, 880, 881.  
 — *nitros.* 102.  
 — *salicyl.* 61, 160, 221, 253, 360, 549, 620, 642, 764, 819, 820, 941.  
 — *sozodol.* 73.  
 — *subsulph.* 772.  
 — *sulphoichtyol.* 471, 472, 473.  
 — *sulphur.* 95.  
*Nitroglycerin* 189, 1002.  
*Oesypium* 762, 769.  
*Ol. amygdal.* 993.  
 — *caryophyl.* 811.  
 — *camphor.* 48, 718.  
 — *chamomillae* 297.  
 — *cinamom.* 40, 65.  
 — *crotonis* 897.  
 — *eucalypti* 42.  
 — *fagi* 405.  
 — *jecor. aselli* 791, 792, 833, 838.  
 — *ligni Santal.* 111.  
 — *lavandulae* 811.  
 — *petrae* 692, 693.  
 — *pini* 571.  
 — *ricini* 367.  
 — *rusci* 392, 402, 404, 505.  
 — *santali* 111.  
 — *terebinth.* 42, 63, 419, 599.  
*Onon. spin.* 747.  
*Opium Tinct. v. laudanum* 2, 216, 255, 966.  
*Papayotin* 70.  
*Paraldehyd* 348.  
*Pasta Lassara* 395.  
*Pelletierin* 900, 904.  
*Pepsin* 62, 171, 377, 378.  
*Petroleum* 692.  
*Phenacetin* 615, 943.  
*Phosphor* 793, 794, 795, 796.  
*Pilocarpin* 43, 62, 289, 355, 464, 687, 909.  
*Pilulac asiatic.* 586.  
*Piperinum* 584.  
*Piperazin* 84, 635.  
*Pix liquid.* 779.  
*Plumb. acet.* 74, 117, 331, 332, 389, 444, 445, 487, 921.  
 — *tannic.* 342.  
*Podophyllin* 655.  
*Polygal. Senega* 151, 581, 752.  
*Praecipit. alb. v. Hydr. p. a. flav. rubr.*  
*Propylamin* 283.  
*Pulv. Doveri* 155, 196.  
*Pulv. lapid. Baptistae* 14.  
 — *liquir.* 494.  
*Pyoctanin caer.* 161.  
*Quebracho* 98, 381.  
*Resorcin.* 12, 26, 231, 269, 316, 847, 913, 967.  
*Rheum tinct.* 649.  
*Rhus arom.* 424.  
*Sabinae ol.* 36, 315.  
*Saccharin* 356, 453, 846.  
*Sal. amar.* 653.  
 — *ammon.* 561.  
*Salep* 192, 946.  
*Salipyrin* 798.  
*Salol.* 85, 222, 557, 676, 911.  
*Salvia* 664.  
*Santonin* 86, 87.  
*Sapo viridis* 504.  
*Secale corn.* 129, 478, 480, 481, 496, 631, 753, 853.  
*Semina Cinæ* 88.  
*Semen lini* 126, 214, 551.  
*Senega v. Polygala.*  
*Solut. arsen. Fowleri* 56, 278, 529, 587, 591, 592, 624, 641, 683, 776, 778.  
 — *Pearson.* 535.  
 — *Burowi* 601.  
*Sozodol* 537.  
*Sparteïn* 186, 1004.  
*Spir. lavandul.* 980.  
 — *Sapo Kalin* 807.  
 — *vini gallic.* 32, 980.  
*Spongia tosta* 861.  
*Strontium bromat.* 372.  
 — *lactic.* 629, 906.  
*Strophantus* 188, 696, 984.  
*Strychnin int.* 423, 688.  
 — *inj.* 25, 686, 689.  
*Styrax* 810, 813.  
*Sublimat v. Hydr. bichl. corros.*  
*Succus citri* 76.  
*Sulfonal* 282, 522, 604, 907, 990.  
*Sulphur. aurat antim.* 153, 417, 730.  
 — *praecipit* 10.

- Syrup ferri jod.* 749, 84.  
*Tannin* 35, 109, 204, 451, 462,  
 476, 488, 514, 569, 785, 875, 988.  
*Tartar. stib.* 206.  
*Terebinth. ven.* 130.  
*Terpinol* 147, 415, 459.  
*Terpinhydrat* 148.  
*Thallinum* 119, 945.  
*Theobrominum* 187, 291, 1001.  
*Thiol. p. nowe leki.*  
*Thiophen* 761.  
*Thymian* 733.  
*Thymol* 454, 661, 737, 1013.  
*Tiliae inf.* 987.  
*Tinctura acon.* 39, 80, 156, 727, 802.  
 — *amara* 212.  
 — *bellad.* 722, 805.  
 — *benzoes* 38.  
 — *canellae* 259.  
 — *cantharid.* 37.  
 — *capsici* 39, 44.  
 — *chinae comp.* 55.  
 — *colchici* 802.  
 — *coto* 197.  
 — *digitalis* 996.  
 — *eucalypti* 530.  
 — *ferri chlorati* 57.  
 — *pomat.* 55, 375.  
 — *gelsemii* 644.  
 — *helianthi* 534.  
 — *jodi* 18, 19, 467, 468, 701, 837,  
 862, 886.  
*Tinctura lobeliae* 99, 1005.  
 — *myrrhae* 66, 743.  
 — *nuc. vom.* 172, 180, 657.  
 — *opii* 2, 178, 255, 598, 933, 965.  
 — *rhei* 649.  
 — *rhur. arom.* 423.  
 — *ratanh.* 266, 463, 874, 876.  
 — *rusci* 403.  
 — *strammon.* 100.  
 — *strophanti* 90, 188, 984, 998.  
 — *valerianae* 190, 258, 296, 842.  
*Tumenol* 396, 401, 409.  
*Unguentum diachylon* 393, 394.  
 — *emolliens* 398.  
 — *hydrarg.* 285, 547, 548, 576, 600.  
 — *Wilkinson.* 410.  
*Urethanum* 384, 610, 691, 850, 908  
*Valerian infus* 350, 750, 851.  
*Valeriana p. Tra.*  
*Vaselinum* 330.  
*Veratrin* 637, 647, 670, 806.  
*Viburnum prunifol.* 3, 4.  
*Vinum Condurango* 164, 174.  
 — *stib.* 99, 152.  
*Zincum chlorat.* 963, 1012.  
 — *oxydat.* 13, 27, 339, 388, 395,  
 399, 435, 841, 865, 961.  
 — *sulphur.* 115, 117, 133, 136,  
 138, 235, 446, 567, 573, 671,  
 675, 757.  
 — *sulphocarb.* 121.  
 — *sozodol.* 124, 672.



# WŁADYSŁAW BEŁDOWSKI

MAGISTER FARMACYI w KRAKOWIE

poleca pp. Lekarzom:

Pillul e. Kreosoto e. bitum. fagi à 0·05 i 0·025 jak również  
i Guajacolowe à 0·05.

Zawierają one w znacznej ilości goryczkę, są bardzo łatwo rozpuszczalne, o czym można się łatwo przekonać, kłócąc jedną pigułkę w rurce probierczej z wodą o ciepłocie 25—30° C. **takowa rozpuszcza się w 10—15 minut**; przez moczenie zaś w wodzie o tej samej ciepłocie w 40 minut. Własnością tą wyróżniają się i przewyższają wszelkie inne tego rodzaju wyroby. Dla pokrycia woni **Kreozotu i Guajakolu** obciagam takowe cukrem waniliowym. Pigułki mego wyrobu są polecane przez Tow. lek. Krak. i odznaczone medalem brązowym na VI Zjeździe lekarzy i przyrodników.

Pigułki wyrabiane bez Balsamu tolutańskiego:

1. Pillul Kreozoti à 0·025 i 0·05 . . . Cena 70 ct.
2. „ Guajacoli à 0·05 . . . . . „ 1 złr.
3. Pigułki następującego składu, przepisu Prof. Dr. E. Korczyńskiego (dla odróżnienia barw. blado żółto)

*Rp.:*

acid. arsenic. 0·0005 Kreosoti fag. 0·02 . . . Cena 70 ct.

**Każde pudełko zawiera 100 pigułek.**

**Liquor mangano — ferri peptonati** zawierający w 100 gramach 0·60 ferri 0·10 manganu . . . Cena 60 ct.

**Cygaretta** przeciw Astmie z Grindelia robusta  
Cena pudełka z 24 papierosami . . . . . 60 ct.

**Pastyłki glonoinowe (nitroglicerynowe)** pudełko 50 ct.

Zwracam również uwagę pp. Lekarzy na Gałeczki (GRANULAE)

Natri arsenicosi à 0·001 . . . . . Cena 50 ct.

Morphii muriat. 0·01 . . . . . „ 80 ct.

Morphii muriat 0·005 . . . . . „ 70 ct.

Codeini muriatici 0·01 . . . . . Cena 1 złr. 50 ct.

Codeini muriatici 0·02 . . . . . „ 1 „ 90 ct.

Atropini sulfurici 0·001 . . . . . Cena 70 ct.

**Słoik zawiera 60 gałeczek.**

**Sposób przepisywania:** Pillul. Granul. Liquor. Pastil etc.  
**fabrie. W. BEŁDOWSKI Cracoviae.**



# PODRĘCZNIK TERAPEUTYCZNY

ZE ZBIOREM

NAJWIĘCEJ UŻYWANYCH RECEPT.

## Abortus.

Jeżeli abortus habitualis, wykazanie przyczyny. Przeciwlues: leczenie przeciwkłówe nawet podczas ciąży — jeżeli jakieś cierpienie macicy, leczenie takowego. Strzedz chorej w okresie w którym poprzednio ronila, szczególnie w pierwszej połowie ciąży. Usunięcie wpływów szkodliwych, podnoszących działanie tłocznii brzusznej, zabronienie spółkowania, nadmiernego ruchu, trzęsącej jazdy itd. Wolne swobodne ubranie. — Unikanie u osób krwistych czynników podniecających, napojów wyskokowych, silnych wrażeń. W razie krwawienia podczas ciąży, gdy nieodchodzą skrzepy krwi, i przy badaniu jaja wyczuć nie można, leczenie wstrzymujące poronienie i spokój.

1. *Extr. Opii aquosi 0·10,*  
*But. Cacao q. s. ut. f. l. artis*  
*Suppositoria ad anum Nr.*  
*quinque.*  
S. Rano i wieczorem czopek (i częściej).

2. *Tinct. Opii simpl. 10·00.*  
S. 20—25 kropli rano i wieczorem w lewatywie.

Gdy niema już nadziei utrzymania ciąży: środki pobudzają-

ce czynność porodową: zimne okłady na brzuch, wstrzykiwania do pochwy rozcżynami środków przeciwnilnych (kw. karbolowy 3%. Creolina 1—2%). Gdy jajo wystąpiło z jamy do szyi macicy, można podać secale cornutum.

Gdy krwawienie znaczne, zatamponowanie pochwy najpierw gazą jodoformową, poniżej zaś tamponami z waty, napojonemi gliceryną. (Zmienić za 6-10 godzin i przestrzyknąć pochwę). Jeżeli zachodzi możebność usunięcia jaja w całości, szczególnie gdy odchody cuchnące, usunąć takowe zabiegiem ręcznym.

W razie krwawienia skutkiem pozostania resztek z jaja płodowego w macicy — wyskrobanie tychże tępa łyżeczką. (Postępowanie aseptyczne).

W ostatnim czasie polecano też :

3. *Extr. fluid. Viburni prunifol. gtt. 10,* w połączeniu z 0·50 chloralu, dopóki bóle nie ustaną.

W następnych dniach :

4. *Ammon. bromat. 15·00,*  
*Extr. fluid. Viburn. 2·00,*  
*Aq. dest. 120·00.*  
S. 2 razy dziennie łyżeczkę.

## Abscessus frigidus.

Z otwarciem tego rodzaju ropni nie potrzeba się wcale spieszyć wyjawsz tych przypadków, w których rychłe usunięcie ropnia wskazanem jest z przyczyn innych. Leczenie ropni zimnych może być bardzo rozmaite. Albo ograniczamy się tylko do otwarcia ropnia i wprowadzenia doń sączka, lub też aspirujemy ropę przyrządem aspiracyjnym Dieulafoya lub Potaina. Po wypuszczeniu całej ilości ropy, wstrzykuje się do jamy kilkadziesiąt gramów zawiesiny jodoformowej, z której część po kilku minutach wypuszczamy, resztę zaś w jamie ropnia pozostawiamy. Na cały ropień zakłada się następnie opatrunek uciskający z przylepca. Postępowanie to wyjątkowo tylko prowadzi do celu za pierwszym razem, zazwyczaj należy je powtórzyć kilka razy w odstępach kilkutygodniowych. W niektórych razach, można cały ropień otworzyć szerokim cięciem, ściany jego wyskrobać ostrą łyżką, a potem po zatamowaniu krwotoku, zalać całą ranę zawiesiną jodoformową i dokładnie zeszyć. Do przetok po ropniach gruczolanych, należy wprowadzać prećiki jodoformowe, kawałki lapisu lub też prećiki z balsamu peruwiańskiego.

5. *Jodoform* 10'00,  
*Glycerin* 100'00.

S. Przed użyciem zakłócić.

6. *Jodoform* 9'00,  
*Mucill. gum. arab.*  
*Glycerin.* āā. 1'00,  
*Mf. bacill. long. ctm.* 4,  
*crass. mllm.* 2.

S. Prećiki jodoformowe.

7. *Jodoform*,  
*Butyr Cacao* āā. 10'00,  
*Mf. bacill. long. ctm.* 4,  
*crass. mllm.* 2.

8. *Bals. peruv. Glycerin.*

*Gelatin* āā. q. s. f. l. a. *bacill. long. ctm.* 8, *crass. mllm.* 4.  
Nr. X.

## Acne vulgaris.

Usunąć cierpienia w zakresie narządu trawienia, płciowego, anemię. Zmywać twarz ciepłą wodą i mydłem dla usunięcia tłuszczu.

Ropnie gruczolowe i podskórne otworzyć bisturem, zaskórnik wycisnąć, następnie naciera się miejsca te spirytusem mydlanym, mydłem siarkowym lub naftolowem z pozostawieniem piany przez  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  godziny, a nawet całą noc, następnie zmyć letnią wodą, wreszcie używa się środków, które wśród mierniej reakcyi, powodują szybkie oddzielenie przyskrórka a więc i komórek wyścielających gruczoły łojowe. Takimi środkami są: siarka, naftol, resoreyna.

9. *Lactis sulphur.* 10'00,  
*Kali carbonici* 5'00,  
*Spir. lavandul* 20'00.  
*Glycerin.* 50'00,  
*Ol. caryophyll.*  
*Ol. menthae.*

*Ol. rosmarin* āā. 1'00.

DS. Zakłócić przed użyciem.

Górną część tego płynu się zlewa, nabiera się na flanelę nieco osadu i wciera takowy dość mocno, nazajutrz zmywa się osad wodą letnią, i tak postępuje 8—10 dni.

10. *Sulphur. praecipit* 10'00,  
*Spir. saponato kalin.* 20'00.  
MDS. Przed użyciem skłócić i wetrzeć pędzlem szczeciniowym.

Szybciej działa:

11. *Naphthol-B* 5'00,  
*Sulphur. praecip.* 25'00,  
*Sapon. virid.*  
*Vasellini flavi* āā. 10'00.  
*Mf. Pasta.* S. Maść.

Pastą tą naciera się wieczorem zapomocą flaneli, zostawia ją na skórze godzinę, a potem się ściiera. Stósować 8—10 dni.

Bardzo energicznym środkiem jest:

**12. Resorcin.**

*Zinci oxydat.*

*Amyli Oryzae āā. 10'00,*

*Vaselin. flav. 20'00.*

Mf. Ung. S. Maść.

Maść tę wciera się wieczorem, zostawia przez  $\frac{1}{2}$  godziny, a następnie ją ściiera.

Ponieważ wszystkie te środki drażnią skórę, należy je łączyć ze środkami łagodzącymi t. j. wieczorem wcierać jedną z powyższych maści a rano wetrzeć:

**13. Zinci oxydati,**

*Magist. Bismut. āā. 1'00,*

*Ung. emollient. 10'00.*

Maść tę naciera się w cieniutkiej warstwie i posypuje pudrem.

**14. Pulv. lapid. Baptistae,**

*Talci veneti,*

*Amyli orizae āā. 30'00,*

*Ol. rosar. gtts. IV.*

*Acne jodata* ustępuje przy zaprzestaniu używania tego środka,

*Acne rosacea.* Pierwszem zadaniem usunięcie podstawy choroby, a więc przy nieżycie przewodu pokarmowego woda Karlsbadzka, Maryenbadzka, przeciw anaemii: żelazo, arszonik, w razie zmian chorobowych części rodnych, leczenie odpowiednie; zaprzestanie napojów wysokowych. Leczenie miejscowe ma na celu sprowadzenie skurczu naczyń, jakoteż usunięcie guzków, będących następstwem przerostu tkanki łącznej i zapalenia grucz. łojowych. Telangiektazya usuwa się przez obwodowe nacięcie pni naczyń rozszerzonych, w kilka dni po tych nacięciach (których ma być kil-

kanaście) wciera się siarkę z wyskokiem.

**15. *Lactis sulphur. 10'00,***  
*Spir. vini gallici 50'00,*  
*Glycerini 1'50.*

lub maść naftolową:

**16. *Naphtholi-B 2'00,***  
*Sulphur. praecip. 10'00,*  
*Sapo virid.*  
*Vaselin flavi āā. 7'00.*

Maść tę wciera się wieczorem na godzinę, usuwając potem wata. Dobrze też działa maść rosoceynowa p. acn. vulg.

Usunięcie większych guzków wymaga operacyi.

W ostatnich czasach polecano:

**17. *Ichtyoli 2'00,***  
*Lanolin.*  
*Vaselin āā. 10'00.*

F. ung. S. Na noc posmarować, rano zmyć wodą z mydłem.

Mały kawałek płótna macza się we wrzącej wodzie i na minutę przykładą na chore miejsca; powtórzyć 2—3 razy dziennie. Do wody można dodać nieco kwasu salicylowego.

## Actinomykosis.

Ile możliwości doszczętne usunięcie części schorzałych, przez wycięcie lub wyskrobanie zapomocą ostrej łyżki. Opatrunek jodoformowy lub sublimatowy.

## Adenitis inguinalis.

Absolutny spokój; w początkach lodowe okłady, przetwory jodowe. W dalszym okresie okłady wysychające (z letniej wody lub octanu glinowego). Skoro się tylko chęłbotanie daje wykazać, należy ropień zapomocą szerokiego cięcia otworzyć i ranę wytamponować gazą jodoformową. Celem przyspieszenia wyleczenia, można resztki gruczolów, o ile jeszcze nie uległy zropieniu, wyłuszczyć



lub usunąć ostrą łyżką. W zatkaności powstałe podczas gojenia się rany, można wprowadzać przeciki jodoformowe lub kawałki lapisu, choć najpewniejszym sposobem pozostanie zawsze rychłe rozcięcie i otwarte leczenie tychże.

**18.** *Tct. jodi* 30'00.

S. Zewnętrznie.

**19.** *Tct. jodi.*

— *Gallar. āā.* 30'00.

S. Zewnętrznie.

**20.** *Kali jodat.* 2'00,

*Jodi pur.* 0'20,

*Glycerin.* 40'00.

S. Zewnętrznie.

**21.** *Kali jodat.* 2'00,

*Jod. puri.* 0'20,

*Ungu. simpl.* 20'00.

Mf. Ung. S. Maść.

**22.** *Jodoform* 9'00,

*Glycerin.*

*Mucill. gumm. arab. āā.* 1'00,

Mf. *bacill. long. ctm.* 4.

*crass. mllm.* 2.

S. S. n.

**23.** *Jodoform*

*Butyr Cacao āā.* 10'00,

Mf. *bacill. long. ctm.* 4.

*crass. mllm.* 2.

S. S. n.

**24.** *Argent. nitric. fus. in bacill.*

*tenuissim* 5'00.

S. S. n.

## Alkoholismus.

*Acutus* zobacz: Otrucia.

*Chronicus.* Leczenie tylko w zakładach mozebnie. *Tra chinæ, Tartar. emetic.* czasami w lżejszych stopniach pomaga:

**25.** *Strychnin nitr.* 0'05,

*Aq. dest.* 15'00.

DS. Do iniekcji.

Dziennie 1—2 inj. po 0'50 płynu

Równocześnie *natr. brom.*

Na tle *A.* najważniejsze zob. *delirium tremens.*

## Alopecia.

1. *e seborrhoea.* (Włosy tłuste, lśniące, pozornie grube z licznymi łuskami). a) Przyczynowo: usunąć niedokrewność, poprawić ogólne odżywienie, leczyć kiłę (alopecia e seborrhoea syphilit.).

b) Leczenie miejscowe. Istniejące strupy i łuski rozmięczyć, a następnie zmywaniem usunąć. Do rozmięczenia strupów używa się oliwy, tranu, olejku migdałowego, wcierając takowe pędzlem szczecinowym lub gąbką 4—5 razy dnia. U mężczyzn można poprzednio włosy krótko obciąć. Do zmycia rozmięczonych strupów i łusek, używa się u dzieci płynnego mydła glicerynowego, u starszych spirytus saponato Kalinus, płynne mydło Gudego z dodatkiem 1% kali carbon. U kobiet z powodu splatania się włosów, zamiast mydła 2—5% roztwór sody, 1%—3% spirytus naftolowy lub według Uny:

**26.** *Resorcin* 5'00,

*Spir. vini* 150'00,

*Ol. ricini* 2'00.

MDS. Do mycia głowy.

Mydło wciera się gąbką lub flanelą aż do powstania obfitej piany, spłukując je obfitą ilością wody letniej. W ten sposób zmyta skóra głowy jest zaczerwienioną, suchą, napiętą, skłoną do pęknięcia przyskórka, dlatego w tym okresie wciera się w nią oleje lub pomady.

**27.** *Zinci oxydati* 5'00,

*Unguenti emolientis* 25'00.

Mf. Unguentum. S. Maść.

lub:

**28.** *Chinini puri* 1'00,

*Acidi tannici* 2'00,

*Unguenti emolientis* 100'00,

*Olei resedae*

*Ol. Naphae āā. gtts. III.*

Mf. Unguentum. S. Pomada.



lub:

- 29.** *Mercur. praecipit. albi* 5'00,  
*Unguenti emolientis* 50'00,  
*Trae Benzoës* 1'00,  
*Olei rosar. gtt̃s.* V.  
 Mf. Ung. S. Pomada.

lub:

- 30.** *Extr. chinæ* 5'00,  
*Balsami peruviani* 1'00,  
*Unguenti emolientis* 50'00.  
 Mf. Ung. S. Pomada.

lub:

- 31.** *Medullæ ossium* 75'00,  
*Extr. chin. frig. parat.* 10'00,  
*Trae cantharid.*  
*Succi Citri āā.* 5'00,  
*Olei de Cedro*  
*Olei Bergamottæ āā. gtt̃s.* X.  
 Mf. Ung. S. Pomada.

Skoro przyskórek dostatecznie zgrubieje i tkliwość skóry ustąpi, trzeba jeszcze przez kilka tygodni w miarę wytwarzających się łusek codzień, lub 3 razy w tygodniu wcierać powyższe pomady po poprzednim zmyciu głowy jednym z płynów:

- 32.** *Spiritus vini gallici* 100'00,  
*Acidi carbolici* 0'15,  
 { *Acidi borici* 3'00,  
 { *Acidi salicylici* 3'00, } lub  
*Glycerin* 1'50.

MDS. Do nacierania

lub:

- 33.** *Eau de Quinin* lub:  
*Cortex Chinæ* 10'00,  
*Spir. Sapon.* 50'00.  
 MDS. Płyn do nacierania.

- 34.** *Chinin sulph.* 1'00,  
*Spir. vini gallic.* 60'00,  
*Aq. colon.* 30'00.

DS. j. w.

- 35.** *Tannin* 1—5'00,  
*Alcohol. q. s. ad solution.*  
*Ol. amygdal.* 50'00.

MDS. j. w.

2) *Alopecia e pityriasi* (nadmierne wytwarzanie się łusek,

włosy suche cienkie, skóra głowy cienka) w tej formie pomady z dodatkiem środków drażniących lub samych środków drażniących.

- 36.** *Ol. Sabinæ gtt̃s.* 10—15,  
*Aq. Coloniensis* 50'00.  
 MDS. Zewnętrznie.

- 37.** *Trae Cantharid.* 2—3'00,  
*Aq. coloniens.* 50'00.  
 MDS. Zewnętrznie.

Weieranie tych środków łączy się z massagem skóry głowy.

3) *Alopecia areata*. Leczenie zazwyczaj nie wielkie skutki odnosi.

1) wyciąganie zwątlonych włosów.

2) dobre odżywienie i leki wzmacniające.

3) weieranie płynów drażniących w połączeniu z przeciwwzrybkowem.

- 38.** *Trae Benzoës* 2'00,  
*Acidi salicylici* 5'00,  
*Spiritus vini gallici* 200'00.  
 MDS. Zewnętrznie.

lub:

- 39.** *Trae Aconiti* 1'00,  
*Trae Capsici* 1'00,  
*Spiritus vini gallici* 200'00,  
*Balsami peruviani* 2'00.  
 MDS. Zewnętrznie.

- 40.** *Ol. cinnam. chin.* 10'00,  
*Aether. sulphur.* 30'00.

S. Raz dziennie pedzlować (nie zmywać głowy).

- 41.** *Chloralhydrat.* 5'00,  
*Aether. sulph.* 25'00,  
*Acid. acet. cryst.* 1'50.

MDS. Do nacierania głowy przez 5 minut.

- 42.** *Ol. Eucalypti*  
*Ol. therebinth. āā.* 15'00,  
*Petrolei crudi*  
*Spir. vini rectif. āā.* 30'00.

MDS. Płyn do nacierania.

3) Injekeye pilocarpinu.

- 43.** *Extr. aquos. Pilocarp.* 30·00,  
*Tinct. cantharid.* 15·00,  
*Liniment. saponat.* 170·00.  
 Wcierać w skórę raz dz.

## Amenorrhoea.

Badać dokładnie i szukać przyczyny. Pamiętać o możebności ciąży. W przypadkach haematometra zabieg operacyjny. Jeżeli przyczyną chlorosis, scrophulosis, tuberculosus, anaemia, zastosować odpowiednie leczenie.

W przypadkach niedostatecznego rozwoju macicy, albo w przypadkach nadmiernego zwinięcia się tejże po porodzie; wstrzykiwania ciepłe, elektryzowania macicy, kąpiele nożne, upust krwi z części pochwowej powtarzane w czterotygodniowych odstępach, szczególnie, gdy są molimina menstrualia. Żelazo wewnętrznie, zmiana powietrza, powietrze górskie, Krynica, kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa).

- 44.** *Trac Capsici* 3·00,  
*Rhumi optimi* 80·00,  
*Mixturae gummosae* 120·00.  
 S. Co 3 g. łyżeczkę od kawy.
- 45.** *Extr. aloes* 1·00.  
*Pulv. myrrh. q. s. ut. f. pill.*  
 Nr. 50.  
 S. 3 r. dnia 2—3 pigułek.
- 46.** *Acid. arsenic.* 0·06,  
*Ferri sulph. exsicc.* 2·00,  
*Piper nigr.*  
*Aloes.*  
*Myrrh. āā. q. s. f. pil.* Nr. 60.  
 S. 2 r. dz. pigułek po jedzeniu.

## Anaemia.

Jeżeli wystąpi wskutek krwotoku lub długotrwałej choroby, podawać leki wzmacniające i podniecające, pożywna dyeta. W razie grożącego zapadu wino

Sherry, szampańskie, czarna kawa, eter, oraz: podskórne wstrzyknięcie rozczynu soli 0·7% w ilości 500—700·00.

- 47.** *Aether sulphur.* 10·00,  
*Camphor.* 1·00.  
 DS. Wstrzyknąć 1—2 wstrzyk.
- 48.** *Olei camphorati* 10·00.  
 DS. Do wstrzykiwań.

- 49.** *Aether acet.* 10·00.  
 DS. 10—20 kropli co  $\frac{1}{2}$  godz.

Przy dłużej trwającej A. według wskazań: arsen, (Woda Guhera), żelazo, wino, pobyt na świeżem powietrzu. Wody żelaziste, Krynica, Żegiestów, kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa).

- 50.** *Liquor. ferri album.* 50·00.  
 DS. 3 razy dziennie łyżeczkę.

- 51.** *Ferri hydrog. reduct.* 5·00,  
*Acid. arsen.* 0·20,  
*Extr. gentian q. s. f. pill.*  
 Nr. 100.

DS. 2 do 3-ch pigułek dzien.

- 52.** *Cuprum arsenicosum* 0·002—0·003 p. dosi zalecają w ciężkiej A.

- 53.** *Haemoglobina* po 0·20 na dzień w formie pastylek przez Dra Pfeiffra (Jessler's Ludwig Apotheke, München).

U dzieci:

- 54.** *Liquor. ferri album.*  
 DS. 5—20 kropli w  $\frac{1}{2}$  szklanki mleka.

- 55.** *Trac ferri pomat.* 10·00,  
*Trac chinae comp. gtt.* X.  
 DS. 3 r. dzien. po 10 kropli.

- 56.** *Sol. arsen. Pearsoni*  
*Aq. amygd. amar. āā.* 7·00.  
 DS. 3 r. dzien. po 2 krople.

Wody pyrophosphoranowo żelaziste. Zob. Chlorosis.

## Anaemia cerebri.

Uwzględnić powody (utrata krwi, wyniszczające choroby —

biegunki). w razie omdlenia: ułożenie poziome z głową ku tyłowi pochyłoną, skrapianie twarzy zimną wodą, rozebranie chorego: kieliszek mocnego wina, Cognacu, bandażowanie kończyn. U dzieci oprócz powyżej podanych środków, kąpiele z gorczycą, wraz z polewaniem głowy zimną wodą, podskórne zastrzykanie Ol. camphor. eteru.

**57. *Trae ferri chlorat.* 20·00.**

DS. 3 r. dz. po 10 kropli.

## **Anchylostomum duodenale.**

Środki przeciwczerwiowe, Santonina, Thymol, zwłaszcza zaś Extr. filic. mar. w dużych dawkach (10—15 gramm.) obok środków czyszczących i lewatyw.

## **Angina diphtheritica.**

Przedewszystkiem odłączyć chorego, dla zapobieżenia rozszerzenia tej choroby. Mieszkanie przewietrzać. Ciepłota w pokoju 14—15 R. Dyeta pożywna, rosół, bulion, jaja, galarety mięsne, wino z wodą, herbata z cognakiem itp. Dużo płynów, lemoniada, woda ze sokiem owocowym. Leczenie rozpocząć lekkiem środkiem przeczyszczającym, bądź kalomel w małej dawce, bądź aq. laxativ. rheum. Wobec miernej gorączki chinina po 0·20 do 0·50 (rano i wieczór) przy wysokich stopniach: antypyryna z cognakiem, również po 0·20—0·50, parę razy dziennie. Zmywania całego ciała wodą z octem. Zimne okłady na głowę, Na szyję okład wysychający, zmieniany co 2 lub 3 godziny. Płukanie z rozczyńców: kali chloricum 2 $\frac{1}{2}$ % Acid. boric. 3 $\frac{1}{2}$ %. Dzieciom mniejszym przepłukiwanie gardła zapomocą strzykawki (z ostrożnością, aby podniebienia nie zranic — a w razie

oporu, lepiej i tego zaniechać). Pędzlowania niezbyt częste albo sokiem z cytryny, lub też Papayotin (1:20). Inhalacje co godzinę, w nocy co 2 godziny: Acid. boric. 2 $\frac{1}{2}$ %, Aq. calcis na  $\frac{1}{2}$  z wodą, Kali chlor. 2 $\frac{1}{2}$ %, Sublimat 1:3000. Z leków do wewnątrz podawanych  $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$ % rozczyń Kali chloricum w odwarze 5 $\frac{1}{2}$ % kory chinowej. W uporczywszych i cięższych przypadkach, wcierania szaruchy po 5·00 dziennie w różne części ciała. Na obrzmiałe gruczoły okłady z liquor alum. acetici. Jeżeli błonica w nosie, lekkie przestrzykiwania kw. borowym 3 $\frac{1}{2}$ % lub kali chlor. 2 $\frac{1}{2}$ %. W razie zapadu, eter, kamfora, czarna kawa, zagrzewanie kończyn, nacierania ciepłym octem, wina mocne, wstrzyknięcie eteru, ol. camphor. Jeżeli błonica przeszła na krtań, stósować leczenie podane przy Laryng. crouposa. Powikłania jak: Nephritis (codziennie badać mocz), otitis, pneumonia, leczyć według wskazań. Przeciw porażeniom: dyeta wzmacniająca, chinina, przetwory żelaza, prąd stały. W czasie całego przebiegu zwracać uwagę: na serce, nerki i błony śluzowe.

*Środki podawane do wewnątrz:*

**58. *Chinin. muriat.* 0·50—1·50,**

*Ammon. chlorati* 1·00,

*Aq. dest.* 60·00,

*Syrup rubid.* 20·00.

DS. 3 razy dz. łyżeczkę.

**59. *Antipyrin* 1·50—2·00,**

*Cognaci* 20·00,

*Aq. destil.* 80·00,

*Syrup simpl.* 20·00.

DS. Co 3 godz. łyżeczkę.

**60. *Kali chlorici* 0·50—2·00,**

*Aq. destil.* 80·00,

*Syrup rubid.* 20·00.

DS. Co 2 godz. łyżeczkę.



**61.** *Deti cort. chinae* e 5'00 ad 100'00,

*Natri salicyl.* 2'00,

*Syrup sacchari* 20'00.

DS. Co 2 godz. łyżeczkę.

**62.** *Pilocarpin muriatic.* 0'01,

*Pepsin* 0'20,

*Acid. muriat. dil. gtts.* V.

*Aq. dest.* 80'00,

*Syrup simpl.* 20'00.

DS. Co godz. łyżeczkę (po każdej łyżeczce wina mocne).

**63.** *Ol. Terebinth. rectif.* 8'00,

*Pulv. gum. ar. q. s.*

*Aq. dest.* 120'00,

*Syrup simpl.* 20'00.

DS. Co 3 godz. łyżeczkę (po pięć mlekkiem).

**64.** *Camphor.* 0'30,

*Mixt. gumm.* 80'00,

*Syrup sacchari* 20'00.

DS. Co godz. łyżeczkę, (zwłaszcza w formie septycznej).

**65.** *Aether. acet.* 5'00,

*Ol. cinamom.* 1'50.

DS. Co 2 godz. 3—5 kropli.

Arak co  $\frac{1}{2}$  godz. łyżeczkę aż do upojenia

**66.** *Kali chlorici* 5'00,

*Trae myrrhae* 15'00,

*Acid. carbol. gtts.* V.

*Mel despum.* 20'00,

*Aq. dest.* 150'00.

DS. Co  $\frac{1}{2}$  godz po 15 kropli.

*Leczenie miejscowe:* Okłady z lodu na szyję (w woreczkach gumowych), pić wodę z lodu z dodatkiem wina czerwonego, lody owocowe. Później przy rozpadzie błon lub zgorzeli przejść do ciepłych okładów i kataplazmów. Inni radzą od początku ciepłe okłady i kataplazmy co  $\frac{1}{4}$  do  $\frac{1}{2}$  godz. zmieniać, pokarmy ciepłe, płukania ciepłe.

*Płukania:*

*Aq. calcis, Acid. salicyl.* 1'00,

*Ac. boricum* 2'00, *Kali chloric.* 2'00,

*Sublimat.* 1'00, *Thymol*  $\frac{1}{2}$  0'00,

*Menthol*  $\frac{1}{2}$  0'00.

*Pędzlowania:*

**67.** *Solut. acid. citr.* e 10'00: 50'00,

*Resorcin* 3'00. *Glycerin* 30'00.

S. Co 2 godz. pędzlować.

**68.** *Acidi salicyl.* 0'50—1'00,

*Spir. vini q. s.*

*Glycerin.* 40'00,

*Infus. fol. Eucalypti* 60'00.

DS. Co g. zwilżać watą zamoczoną w tym płynie, miejsca bł. zajęte.

**69.** *Chinolin* 5'00 3 r. dz. zwilżać.

**70.** *Papayotin* 5'00 co 3 godz.

**71.** *Acidi carbol. cryst.*

*Acid. citric. cryst.*

*Trae jodi āā.* 3—5'00,

*Franz-Cognac* 100'00.

MDS. Co 2 godz. pędzlować.

**72.** *Ferri sesquichl.*

*Glycerin.* āā. 10'00.

DS. Pędzlowanie 3 razy dz.

*Wdychiwania (Inhalacye):*

*Para wodna*

*Acid. carbol.* 2:500.

*Kali chloric.* 1'00.

*Aq. calcis āā. c. Aq. dest.*

*Acid. lacticum* 1'00.

*Sublimat* 0'02:200'00.

*Resorcin* 1'00. *Glycerin* 1:4.

*Wdmuchiwanie:*

*Cukier proszkowany* — obficie i często.

*Sól kuchenna* (grubo nakładać).

*Kali chloricum.*

*Menthol* 1'00. *Sacchari pulv.* 20.

2—4 razy dziennie.

*Flor. Sulph., Chin. sulf. āā.* 0'20.

2 razy dziennie.

*Jodoform* co 3 godziny.

**73.** *Natr. sozojodolici* 10'00,

*Flor. sulphur.* 12'00.

Mfp. S. Do wdmuchiwań do ust i do nosa.

**Angina Ludovici.**

W pierwszym okresie należy zastosować zimne okłady, worek



z lodem lub przyrząd chłodzący Leitera. W następnych dniach okłady wysychające z płynu Burowa:

**74.** *Alum. crud.* 40°00,  
*Plumb. acet.* 70°00,  
*Aqu. dest.* 600°00.

Filtra. S. do okładów.

W razie znacznego napięcia lub utrudnionego oddychania głębokie i liczne nacięcia.

Do tracheotomii należy być każdej chwili przygotowanym.

**Angina pectoris vide Ste-nocardia.**

**Angioma.**

W przypadkach, w których ubytek po operacji powstały da się w zupełności zeszyć, można guz w całości wyciąć i drogą rychłozrostu przyspieszyć wyleczenie. W przeciwnym razie najlepiej nakłuć guz w kilku miejscach palnikiem termokautera lub galwanokautera. Z innych sposobów rzadziej używanych, czasami odpowiedniem jest wstrzykiwanie kilku kropli zgęszczonego kwasu karbolowego lub sześcioclorku żelaza (na pół z wodą), przyczem najlepiej nowotwór przedtem na czas operacji podwiązać, by zapobiedz dostaniu się tych płynów w ogólny obieg krwi. Czasami można również z dobrym skutkiem próbować elektrolizy. Małe guzy można pędzlować dymiącym kwasem azotowym. Wszystkie te sposoby należy kilka razy w odstępach kilkudniowych lub kilkutygodniowych powtarzać. W niektórych przypadkach nadaje się bardzo dobrze podwiązka zwykła lub elastyczna. Mniej odpowiedniem jest szczerpienie krowianki na tych miejscach, lub stosowanie maści i past żrących.

**Anthrax. Carbunculus.**

Wczesne, głębokie a liczne nacięcia, sięgające aż do tkanki zdrowej. Rany powstałe należy wytamponować gazą jodoformową, zwłaszcza bezpośrednio po operacji, gdyż krwotok bywa dość często wcale znaczny. Na gazę należy przyłożyć watę zamaczaną w roztynie octanu glinowego i pokryć takową ceratką nieprzemakalną. Wino i cognac należy podawać w znacznych ilościach, ewentualnie także:

**75.** *Coffein. citr.* 1°00,  
*Aq. Cinnamomi* 150°00.  
S. Co 2 godziny łyżkę.

Celem znieczulenia części schorzałej podczas nacięcia, najlepiej ją zamrozić rozpylaczem Richardsona, napełnionym albo eterem siarczanym albo lepiej:

*Hydramyl. Etherem* (I. Robbins. et Comp.).

**Aphthae.**

Pędzlowanie 1% roztworem kali chloricum, 1/2% roztworem acid. tannici, 5% Boraxem.

**76.** *Succi citri.*  
*Syrup. rub. Id.* āā. 10°00.  
S. Do pędzlowań.

**77.** *Argenti nitrici* 1°00,  
*Aq. dest.* 50°00.  
MDS. Do pędzlowania.

*Wewnętrznie:*

**78.** *Kali chlorici* 1°00,  
*Aq. dest.* 80°00,  
*Syrup rubid.* 20°00.  
MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Uporczywie trzymające się płamy lapolisować. Obok tego zimne napoje, podawanie kawałków lodu, unikanie gorących potraw.

## Apoplexia cerebri.

Chorego położyć w łóżku, okład lodowy na głowę, jeżeli osoba krwista, dobrze odżywna i jest się obecnym prawie na początku udaru, to krew puścić najwyżej 500 gram. lub pijawki za uszami postawić. Nadto dać zaraz lewatywę z octu, mydła, lub soli, chorego rozcierać, synapizma na łydki i piersi. Jeżeli tętno słabe i zapad jest, to podać wino, kawę czarną, kamforę, eter podskórnio. Gdy udar minął, to choremu nie pozwalać wstawać z łóżka, okład lodowy dalej mieć na głowie, stolec regulować, wody gorzkie Hunyadi, Janos, Morszyńska, dyetę płynną niepodniecającą, a ze środków wewnętrznych digitalis lub Tinct. Strophanti dla uspokojenia akcji serca.

W kilka tygodni po ataku, gdy reakcja zapalna minie, podawać kali jodatum, elektryzować kończyny porażone, masować, ruchy bierne wykonywać i działać profilaktycznie, usuwając główną przyczynę udaru (najczęściej zmiany w sercu i tętnicach).

- 79.** *Camphor. tritae* 1'00,  
*Aether sulphur.* 5'00.  
 S. Do wstrzykiwań.  
 (Jeżeli tętno b. słabe).

## Arthritis.

Przedewszystkiem leczenie dyetetyczne. Ograniczenie się co do ilości i jakości pokarmów. Wolno jeść mięso chude, o ile możliwości białe tylko, mleko, jarzyn sporo, unikać tłuszczów i mącznych potraw, niemniej napojów wyskokowych. Do picia szczawiy, lub zwykła woda z dodatkiem kwasu. Wskazany jest ruch na świeżem powietrzu, wycieczki w góry, gimnastyka. Ze środków wewnętrznych po-

lecają: Tinctura lub Vinum Colchici po 10—20 kropli 3—4 razy na dzień, Natrium salicylicum lub Antipyrina 2—3 grm. p. die.

W razie silnych bólów wcierać maść z narkotykami, na wewnątrz morfinę lub podskórnio.

Następnie picie wód Giesshübler, Bilińska, Vichy, Kissingen, Ems, Neuenahr, Obersalzbrunn, Dürkheim, Homburg, otyłym zaś osobom można polecić Marienbad, Karlsbad.

- 80.** *Chloroform* 10'00,  
*Aq. Colonien.* 20'00,  
*Tr. Aconiti* 40'00.  
 DS. Do nacierania.
- 81.** *Extr. Belladon.* 2'00,  
*Lanolini* 20'00.  
 Mf Ung. DS. Weieranie.
- 82.** *Lithii jodat.* 0'25,  
*Extr. et pulv. gent. āā. q. s.*  
*f. pil.* 20.  
 S. 3—4 pig. dziennie.
- 83.** *Lithii carbonici* 0'10,  
*Sacchari* 0'20,  
*Mfp. d. tal. dos.* 20.  
 S. 3 pr. dziennie.
- 84.** *Piperazin* po 0'25 na dawkę, dziennie 1—3 gramm (najlepiej w wodzie sodowej).
- 85.** *Salol*  
*Aether āā.* 4'00,  
*Collodii* 30'00.  
 S. Pędzlować miejsca bolesne.

## Ascaris lumbricoides.

Zabraniać pokarmów mącznych, natomiast, mleko, mięso.

- 86.** *Santonin* 0'15 (—0'20),  
*Ol. ricini* 50'00.  
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.
- 87.** *Santoni* 0'03,  
*Calomel.* 0'05,  
*Pulv. rad. rhei* 0'15,  
*Sacchari* 0'20,  
*Mfp. dtur tal. dos.* Nr. 6.  
 S. Rano i wieczór proszek.

- 88.** *Pulv. sem. cinnae* 4'00,  
*Pulv. rad. Jalap.*  
*Sacchari āā.* 2'00,  
*Mfp. divid. in dos.* Nr. 4.  
 DS. Co  $\frac{1}{2}$  godz. proszek.

Po użyciu tych środków, do-  
 brze jeszcze dawać duże lewa-  
 tywy z wody, lub Sublimatu  
 (1:2000).

*Thymol* 0'10—0'30 *pro dosi.*

- 89.** *Jodoform* 0'03,  
*Natri bicarb.* 0'25,  
*Mfp. dtur. tal. dos.* Nr. 5.  
 S. 3 razy dz. proszek.  
 (Na drugi dzień *Ol. ricini*).

## Ascites.

W pierwszym rzędzie leczenie  
 przyczyn (płuca, serce, wątroba).  
 Jeżeli skutkiem A. nadmierne  
 napięcie brzucha, duszność, wy-  
 konać punkcję. Leczenie oprócz  
 uwzględnienia przyczyn, polega  
 na środkach moczopędnych, na-  
 potnych i czyszczących.

- 90.** *Infus digital. e* 1'00,  
*ad* 120'00,  
*Kali acetici*  
*Trae Strophanti āā.* 5'00,  
*Syrup splc.* 20'00.  
 MDS. Co 2 godz. łyżkę.  
 (Przy wadach serca).

- 91.** *Coffeini natrobenzoici* 0'20,  
*Sacchari* 0'50,  
*Mfp. dtur. tal. dos.* 20.  
 S. Co 3 godz. proszek.  
 (j. w.).

- 92.** *Infus hbae Adonis vernal e*  
*5'00 ad* 180'00,  
*Syrup cort. aur.* 20'00.  
 MDS. Co 3 godz. łyżkę.

- 93.** *Infus Convallar. majal.*  
*e* 5'00 *ad* 180'00,  
*Syrup cort. aur.* 20'00.  
 MDS. Co 3 godz. łyżkę  
 lub *Tra Convall. maj.* 3 r. dz.  
 po 10 kropli.

- 94.** *Dct. hb. Equis. e* 15'00,  
*ad* 180'00,  
*Roob Juniperi* 20'00.  
 S. Co 2 godz. łyżkę.

- \*94.** *Diuretin* 5'00,  
*Aq. destil.* 100'00,  
*Syrup aurant.* 15'00.  
 MDS. Co 2 godz. łyżkę.  
 Ciepłe kąpiele na 38° C. do  
 40° C. poczem zawijanie  
 w koce na 2 godziny.  
 Przy *Cirrhos. hepat.*, sztuczna  
 sól karlsbadzka.

- 95.** *Natri sulphurici* 50'00,  
*Natri chlorati* 3'00,  
*Natri bicarb.* 6'00.  
*Mfp.* DS. Rano i wieczór ły-  
 żeczkę w szklance ciepłej  
 wody.

- 96.** *Calomel* 0'10,  
*Pulv. fol. digit.* 0'05,  
*Sacchari* 0'50,  
*Mfp. d. tal. dos.* 10.  
 S. 3 pr. dz. (przez tydzień).  
 (Równocześnie do płukania  
*Kali chloric.*).

- 97.** *Gi. Gutti.*  
*Bulb. Scill.*  
*Stibii sulf. aur.*  
*Hb. digit.*  
*Extr. pimpinel. āā.* 1'50,  
*f. pil.* Nr. 60.  
 DS. 3 r. dz. po 2 pig.

## Asphyxia.

Usunięcie przyczyn powodu-  
 jących, wyjęcie ciał obcych  
 z dróg oddechowych, sztuczne  
 oddychanie, drażnienie skóry,  
 skrapianie zimną wodą i silne  
 wycieranie ciała.

## Asthma bronchiale.

Podczas samego napadu, cho-  
 rego rozebrać, (zwłaszcza zdjęć  
 stanik lub gorset), umieścić go  
 w przestronnym pokoju, gdzie  
 dobre świeże powietrze. Naj-  
 prędzej działają narcotica, podać  
 więc na wewnątrz albo Chloral-



hydrat 2·00 na raz, lub wstrzyknąć morfinę. Mniej pewnie działa morfina na wewnątrz. Polecić choremu podczas napadu mocną czarną kawę wypić, gorące okłady lub synapizma na klatkę piersiową i łydki. Kilka kropli Amylnitritu do wachania, lub Pyridyn na spodeczek wylać i tem oddychać. Polecają też Jodkalium w dawkach 1—3·00 na dzień, lub Extr. Quebracho. Jeżeli narcoticum nie może być podane a wśród napadu słyhać liczne rżenia i świsty i furczenia, to podać należy emeticum n. p. apomorfine podskórnie lub na wewnątrz. W ciężkich napadach można się uciec do narkozy chloroformowej. Po przejściu napadu leczyć chorobę główną i pozostały zwykłe po napadzie nieżyt oskrzelowy, odpowiednimi środkami.

**98.** *Extr. fluid. Quebr.* 25·00.

DS. 2—3 łyżeczki dziennie.

**99.** *Vini stibiati.*

*Tinct. lobel. infl. āā.* 5·00.

*Morph. mur.* 0·10.

DS. 3 r. na dz. po 15 kropli.

**100.** *Kali jodati* 10·00,

*Tinct. Stramm.* 8·00,

*Extr. liquir.* 4·00,

*Syrup Scill.* 30·00,

*Aq. dest.* 250·00.

S. 3 r. dz. łyżkę w szklance wody.

**101.** *Amylnitrit.* 5·00,

*Ol. foenicul.* 10·00.

S. W napadzie 2—5 kropli nałożyć na chustkę i wdychać.

**102.** *Natri nitrosi* 2·00,

*Aq. dest.* 120·00.

DS. 4 r. na dz. łyżeczkę.

**103.** *Kali jodati*

*Tinct. lobel. infl. āā.* 10·00,

*Extr. opii* 0·10,

*Aq. destil.* 180·00.

DS. Co 2 godz.  $\frac{1}{2}$  łyżki.

**104.** *Extr. Bellad.*

*Pulv. Belladon.* āā. 0·30,

*f. pill. Nr.* 30.

Na wieczór 1—2 do pigulek.

Radzą też w początku napadu, pędzlować w głębi nosa:

**105.** *Cocain* 1·00,

*Aq. dest.* 20·00.

**106.** *Naphthalin* 1·00,

*Sacchari lactis* 10·00.

Mfp. DS. W razie rozpoczyn.

kaszlu co 2 godz. na koniecu noża użyć.

## Atelectasis pulmonum.

U noworodków ciepła kąpiel zimne polewanie i nacieranie ciała. Dzieci takie należy często nosić, budzić ze snu, i co godzinę karmić. Obok świeżego powietrza, ogrzewać (gorącemi flaszkami w pościeli). U starszych uwzględnić przyczynę: osłabienie po wyczerpujących chorobach, biegunkach, krzywicy, ugniot przez wysięk w opłucnej, nieżyt w drobnych oskrzelach. W tym ostatnim przypadku, środki wymiotne, wino, cognac, łyżeczka herbaty z paru kropłami rumu.

**107.** *Liquor. ammon. anis.* 1·00,

*Aq. destil.* 50·00,

*Syrup Sacchari* 15·00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

**108.** *Aetheris sulphur.* 10·00.

DS. Jedną lub 2 krople we wodzie.

## Balanoposthitis.

I. Bez równoczesnej phimozy: Moczzenie pręcia 2—3 razy dziennie w wodzie zwykłej nie bardzo zimnej, lub zmywanie wata zamoczoną w roztworze  $\frac{1}{2}\%$  azotanu srebrowego,  $2\%$  kwasu borowego,  $1\%$  kwasu karbolowego lub 3—10 $\%$  resorcyiny, poczem obsusza się żołądź i napletek wata i zakłada się suchą wate



pod napletek. W razie obecności erozji kauteryzuje się je laseczką lapisu lub roztworem tegoż (1:2). Dobrze też działa zasypywanie dermatolu.

II. Przy równoczesnej phimozie: Wstrzykiwanie pod napletek strzykawką z końcem pałeczkowatym  $\frac{1}{2}\%$  roztworu azotanu srebrowego, 2% kwasu borowego, 5—10% roztworu resorcyinu. Gdy napletek sinoczerwony, twardy, a z ujścia jego wydziela się ciecz cuchnąca tj. w razie rozpoczynającej się zgorzeli, przecięcie napletka na sondzie rówkowanej, lub circumcizio. Celem wzmocnienia cienkiej blaszki wewnętrznej napletka i żołądździ i zapobieżenia często powtarzającej się balanoposthitis posypywanie proszkiem:

**109.** *Tannini puri* 5'00,

*Talci veneti* 25'00.

Mfp. DS. Posypka.

**Blenorrhoea neonatorum** zob.

**Conj. blenorrh. neon.**

**Blenorrhoea sacci lacrymal.**

Po przecięciu lub dylatacyi dolnego punkcikulużowego wprowadzanie systematyczne co dzień przez 6—8 tygodni sondy Bowmanna zaczynając od Nr. I. lub 2-go i dojść do Nr. 4-go.

**Blenorrhoea urethrae.**

A. U męczyzn.

a) *B. acuta anterior.*

Hygiena i dyeta: unikanie męczących ruchów czynnych (bieganie, gimnastyka, taniec, nużące przechadzki) i biernych (jazda wozowa lub konna). Unieruchomienie części płciowych zapomocą suspensoryum. Zabronić spółkowania, przebywania w towarzystwie kobiet, czytania książek pobudzających fantazyę

pod względem płciowym. Zwiększoną pobudliwość płciową, objawiającą się erekcyami i polucyami, w nocy osobliwie występującymi, uśmierza się twar-dem postaniem i lekkim przykryciem, uregulowaniem stolca i podawaniem leków pobudliwość płciową obniżających. (Patrz: Chorda). Pokarmy podawać w mniejszej ilości łatwo strawne, zaparcia stolca niewywołujące, unikać pokarmów pieprznych, silnie słonych i kwaśnych. Zabronić napojów wysokowych i kwas węglowy zawierających. Zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo przeniesienia wydzieliny tryprowej do oka. W celu uniknięcia zanieczyszczenia bielizny, zakładanie waty do napletka.

*Leczenie miejscowe* środkami balsamicznymi i ściągającymi stosować tylko wtedy, gdy rzerzączka części przodowej cewki, jest niepowikłana, tj. gdy niema równoczesnej rzerzączki części tylnej cewki, zapalenia ciał jamistych, gruczołów Cowpera, krokowego, przyjądrzy, lub pęcherza, inaczej bowiem komplikacye te się pogarszają.

*Leczenie* środkami balsamicznymi na wewnątrz podawanymi można tylko wtedy zaraz w początku rzerzączki zacząć, gdy takowa nie jest bardzo ostrą. Wstrzykiwania zaś można dopiero wtedy robić, gdy sprawa rzerzączkowa przeszła szczyt, tj. wydzielina traci barwę zieloną, jest mniej gęstą, mleczną. W okresie ostrym przestaje się na leczeniu symptomatycznym. Środki balsamiczne najlepiej podawać w kapsułkach.

**110.** *Capsularum elasticar. tenentium Bals. Copaiv.* 0'50.  
N. 20.

S. 3—6 kapsułek dziennie.

- 111.** *Capsul. elastic. tenent.*  
*Ol. Santali* 0'50. Nr. 20.  
 S. 3—6 kapsułek dziennie.
- 112.** *Balsami Copaive* 30'00.  
 S. 2 r. dz. po 20 kropli.
- 113.** *Bals. Copaiv.* 30'00,  
*Spir. nitri* 7'50.  
*Trae Opii* 1'50.  
 MDS. 2—4 r. dz. po 20 kropli.
- 114.** *Bals. Copaiv.* 12'00,  
*Vitelli ovi tria.*  
*tere c. aq. font.* 150'00,  
*Aq. Cinamom* 30'00,  
*Syrup Cinamom* 15'00.  
 S. Co 3 godz. łyżkę.

Wstrzykiwania robią się po oddaniu moczu 3—5 razy dziennie, płyn wstrzyknięty zatrzymuje się w cewce 2—4 minut.

- 115.** *Zinci sulphur.* 0'60—1'00,  
*Aq. dest.*  
*Aq. rosar.* āā. 100'00,  
*Aq. lauroc.* 2'00.  
 DS. Zewnętrznie.

W okresie końcowym używa się:

- 116.** *Cupri sulphur.* 0'05—0'10,  
*Aq. destil.* 100'00.  
 MDS. Zewnętrznie.  
 lub środki z osadem:
- 117.** *Zinci sulphur.* 1'00,  
*Acetatis plumbi bas.* 2'00,  
*Aq. rosar.* 200'00,  
*Trae Catechu.*  
*Trae Sydenhami* āā. 2'00.  
 MDS. Zewnętrznie.
- 118.** *Bismuthi subnitr.* 4'00,  
*Aq. dest.* 200'00.  
 MDS. Zewnętrznie.

Inne środki używane do iniekcji:

- 119.** *Thallinum sulphur.* 1'50—  
 2'00: 100'00.
- 120.** *Kali hypermang.* 0'02—  
 0'04: 100'00.
- 121.** *Zinc. sulphocarb.* 0'40—  
 1'00: 100'00.

- 122.** *Acid. carbol.* } āā. 0'20:  
*Alumen* } 100'00.

- 123.** *Argent. nitricum* 0'05—  
 0'15: 100'00.

- 124.** *Zinc. Sozodolicum* 1<sup>o</sup>/<sub>10</sub>.

Gdy choroba mimo wstrzykiwań się przewleka z powodu anaemii lub kaheksyi, podaje się żelazo z arsenikiem, wodę Gubera, Levico lub Roncegno, lub wysyła się chorego do kąpiel żelazistych lub morskich.

*Leczenie symptomatyczne w ostrych rzerzączce.*

Erekcya i bezsenność (p. Chorda) Oedema, lymphangioitis: dyeta ścisła, okłady zimne, wcieranie szarej maści. Przy utrudnionem oddawaniu moczu lub zupełnem wstrzymaniu: narcotica, ciepła kąpiel lub zanurzenie członka w zimnej wodzie, w ostatecznym razie kateter elastyczny. Dla zmniejszenia bólu przy urynowaniu:

- 125.** *Extr. Hyosc.*  
*Extr. cannab. ind.* āā. 0'02,  
*Sacchari* 0'30,  
*Mfp. tal. dos.* Nr. 12.  
 S. 3 pr. dziennie.

lub:

- 126.** *Dct. semin. lini* 500'00,  
*Syr. Diacodii* 10'00.  
 S. Co 2 godz. łyżkę.  
 lub według Fourniera:

- 127.** *Natri bicarb.* 5'00,  
*Sacch.* 30'00,  
*Succi citri gtt.* 2.  
 S. W litrze wody rozpuścić i w jednym dniu wypić.

b) *Blennorrh. acuta posterior.*

Zachowanie się jak wyżej. W okresie ostrym lecz. symptom. a więc przy haematuryi i parciu na mocz: spokój, dyeta mleczna, sprowadzać wolny stolec, kąpiele letnie, iniekc. morfin.,

czopki z extr. Bellad., Det. sem. lini, gdy haematur. nie ustaje:

**128.** *Liquor. ferri sesquichlor* 2'00,

*Aq. dest.* 200'00,

*Syr. simpl.* 15'00.

S. Co 2 godz. łyżkę.

**129.** *Extr. secal. corn.* 0'10,

*Sacchari* 0'30,

*Mfp. tal. dos.* 10.

S. Co 3 godz. proszek.

Dysurią usuwa się czopkami z extr. Bellad., injekc. morfin., w ostateczności kateter elastycz.

Gdy okres ostry minie, parcie się zmniejsza, podać ol. Santali lub bals. Copaive, gdy chory nie znosi, Natr. Salicyl 2—3'00 pro die. Przy bólu w okolicy ledźwiowej a braku białko-moezu:

**130.** *Terebinth. venetae*

*Ol. Therebinth. gallic. āā.* gtts. IV.

*Dtur. in capsul. gelatin.*

*tal. dos.* 20.

S. 2—3 kaps. dziennie.

Gdy miną objawy podrażnienia: wstrzykiwanie; najlepiej według Diday'a: Kateter Nelatona przy napelnionym pęcherzu wprowadza się tak daleko, by mocz zaczął odpływać takowym, w tej chwili cofa się kateter o tyle, by mocz przestał odpływać tj. by okienko kat. znajdowało się w części krokowej — teraz wstrzykuje się strzykawką 100 gram. zawierającą przez kateter, posuwając go ostatecznie ku ujściu cewki, następujące rozczyyny:

**131.** *Acidi carbol.* 1'00,

*Aq. dest.* 500'00.

lub:

**132.** *Kali hypermang.* 0'20,

*Aq. destil.* 500'00.

lub:

**133.** *Alum crudi.*

*Zinci sulphur.*

*Acid. carbol. āā.* 1'00,

*Aq. dest.* 500'00.

lub:

**134.** *Argent. nitric.* 0'20,

*Aq. dest.* 500'00.

Irygacye powyższe robi się z początku co 3 dzień, później co 2 przy pełnym pęcherzu, by płyn użyty w moczu się rozcieńczył i pęcherza nie drażnił.

c) *Blennorrh. chron. urethrae.*

I. Forma. Mocz mętny z nitkami tryprowemi (obok ograniczonych miejsc zapalnych bł. śl. cewki, znaczna przestrzeń tejże w stanie przekrwienia biernego),

1) W części przodowej cewki.

Przestrzykiwań zaniechać, do wewnątrz ol. Santali lub

**135.** *Pulv. Cubebar.*

*Bals. Copaive āā.* 3'00,

*Extr. gentian. q. s. f. pil.*

*Nr.* 30.

S. 6—8 sztuk dziennie.

Przekonawszy się, że zmętnienie moczu nie pochodzi z podrażnienia długotrwałemi wstrz. poleca się dalej rozczyzny:

**136.** *Zinci sulphur.*

*Acid. carbol.*

*Alum. crudi āā.* 0'30,

*Aq. dest.* 100'00.

lub:

*Argenti nitr.* (0'10:100'00), *Cupr. sulph.* (0'10:100).

2) W części tylnej cewki.

Irygacye metodą Diday'a lub kateterem irygacyjnym Ulzmana powyższemi rozczyznami.

II. Forma. Mocz czysty z nitkami tryprowemi (ograniczone



powierzchowne zapalenie bł. śl.), tu niezbędne zbadanie endoskopem

1) w części przodowej cewki, (najczęściej pars bulbosa). Wkraplanie rozczyńców argenti nitrici (przy wybujałościach lub wrzodach) lub cupr. sulphur. (przy ziarnistościach trachomatycznych) 1:30 zapomocą kateteru Guyona lub aparatu do pędzlowań Ultzmana lub irygacyjne metodą Diday'a Creolinae (1:500) Kali hyperm. (1:2000). Schwenger poleca: przy pomocy endoskopu zaaplikować 25% rozczynek resorcyliny w glicerynie. Po nader silnej reakcyi trwającej 4—5 dni przyżegać miejsca chorobowo zmienione 20% rozczynek acidi trichloroacetici.

2) Gdy i tylna część zajęta:

**137.** *Jodoformii* 0'05,

*Tannini.*

*Zinci sulph.* 0'02,

*Cupri sulph.* 0'01,

*Arg. nitr.* 0'005,

*Gelatin alb. q. s. f. supposit.*

*long. 5 ctm. crass. 0'50 ctm.*

*Nr. 10.*

Czopki te w oliwie umoczone wprowadza się do cewki, przesuwając wzdłuż takowej tak daleko, dopóki się jeszcze w międzykroczu od zewnątrz, wyczuć dadzą. Najlepszy skutek otrzyma się przez wkraplanie kateterem Guyona arg. nitric. 0'10:10'00 lub używa się powyżej podanego sposobu Schwengera.

III. Forma. Upośledzenie rozciągliwości cewki, hypertrophia capitis gallinag., prostatorrhoea i neurasthenia sexualis.

Gdy naciek w bł. śl. lub podśluzowej jeszcze wiotki, wywiera się ucisk przez wprowadzanie ciężkich sond metalowych coraz grubszych aż do Nr. 28—30 Chariera, naprzemian z wkraplaniem zapomocą kateteru Guyo-

na rozczyńców arg. nitr. lub cupr. sulph. Gdy naciek zmienił się już w tkankę łączną wprowadza się dilatatory. Przy hypertroph. cap. gallig. prostatorrhoea dobre usługi oddaje psychrofor.

B. Rzerzączka u kobiet.

1) Pochwy.

W pierwszych 7 dniach ostrego zapalenia, nie wprowadzać do pochwy wziernika, chora ma pozostać w łóżku, splukiwać letnią wodą ropę ze sromu, a między wargi sromne zakładać watę Brunsza, na dolną część brzucha i srom zimne okłady.

Po tygodniu gdy bł. śl. pochwy mniej drażliwa, przepłukiwać pochwę kwasem borowym 20% letnim, 2—4 r. dziennie zapomocą kanki macicznej. Skoro wrażliwość bł. śl. o tyle się zmniejszy, że można wprowadzić wziernik, przepłukuje się pochwę sublimatem 1:1000, a następnie pędzluje rozczynek arg. nitrici 1:8 i wprowadza suche tampony z waty Brunsza. Naza jutrz pochwę przepłukać sublimatem, przyczem strupy białe z azotanu srebr. powstałe, się oddzielają. Przepłukiwanie sublimatem odbywa się 8—10 dni 2 r. dziennie. Gdyby obrzmienie bł. śl. pochwy i wydzielanie ropy nie ustawało, kauteryzuje się powtórnie azotanem srebra 1:8.

Do przepłuk. pochwy użyć można zamiast sublimatu:

**138.** *Sulph. zinci* 30'00,

*Acid. borici* 20'00,

*Alum. cr.* 50'00.

S. Łyzeczkę do litra wody.

Można tego rozczyńcu używać obok sublimatu. Po każdym przestrzyknięciu zakłada się tampony z waty suchej, by ścianę pochwy od siebie oddalić. Tam-



pony te mogą jednak być napojone środkami ściągającymi:

**139.** *Acidi tannici* 5·00,

*Glycerin.* 100·00.

DS. Zewnętrznie.

lub posypane proszkiem:

**140.** *Alumin. cr.*

*Amyli Orizae* āā. 20·00.

Mfp. S. Zewnętrznie.

2) Rzerzączka cewki moczowej:

W ostrym okresie leczenie symptomatyczne. Po ustaniu przykrych objawów podmiotowych: wewnątrznie balsamica i iniekcye z kali hypermang. lub zincum sulphur. (pęcherz mocz. niepowinien być próżny). W dalszym okresie pędzlowanie cewki tinct. jodową, roztworem arg. nitric. 2—5‰.

### Blepharadenitis.

Po dokładnem oddaleniu wszystkich strupków (vaseliną i ciepłą wodą) należy na noc smarować przy zamkniętych powiekach wzdłuż całej szpary powiekowej maść z żółtego, białego (zob. hordeolum) lub czerwonego praecipitatu. Ilość maści jak najmniejsza, wcieranie dokładne, czas kuracyi 4—8 tyg. W przypadkach większych wrzodzików na brzegu powiek, przytuszowanie także cum lapide mitigato z następnem zobojetnieniem roztworem soli kuchennej lub też przypalania galwanokauterem. Przytem leczenie przeciwżółtawe.

**141.** *Praecip. rubri* 0·20,

*Vaselin. flav.* 5·00.

Mfu. S. Wetrzeć w powieki na noc.

Przeciw Blepharitis squamosa radzi Gradle:

**142.** *Flor. sulphur.*

*Resorcin* āā. 0·10,

*Vaselin. flav.* 6·00.

Mfu. S. jak wyżej.

*Kalendarz lekarski. 1893.*

### Blepharospasmus.

Będąc najczęściej jednym z objawów cierpienia spojówki i rogówki (Kerato Conj. phlyctenulosa, ulcera corneae, trachoma etc.) przedewszystkiem leczenie przyczynowe, które musi być zastosowaniem do głównej choroby. Oprócz tego smarowanie maści belladonowej na czoło i zapuszczanie kokainy do worka spojówkowego (jeśli naturalnie wrzodów rogówkowych niema), obok zielonego daszka lub ciemnych konserwów; zmniejszają znacznie dolegliwości:

**143.** *Extracti belladonnae* 2·00,

*Ung. cinerei* 15·00.

Mf. u. S. Wielkości ziarna grochu wcierać w czoło co 2 g.

**144.** *Cocaini mur.* 0·20,

*Aquae destilat* 10·00,

*Sublimati corrosivi* 0·001.

MDS. Kokain do ocz.

Zakraplać.

### Bronhiectasia.

Świeże i dobre powietrze, jeżeli można na wsi lub w górach. Odżywianie dobre chorego, odpoczynek od zajęć, unikanie kurzu i dymu.

Leczenie nieżyty oskrzelowe. Jeżeli suchy nieżyt, dawać środki wykrztuśne, apomorphin senega, ipecacuanh. stib. sulph. aurant. z dodatkiem morfiny, Jeżeli wydzielina b. obfita, to środki ściągające, jak tanina, alun, plumb. acet. na wewnątrz lub do wzięcia, albo też środki balsamiczne, ol. terebinth.

**145.** *Bals. peruv.* 5·00,

*Aq. dest.* 120·00,

*Syrup amygdalini,*

*Mucill. g. arab.* āā. 10·00.

DS. Co 2 godziny łyżkę.

**146.** *Balsam. toluani* 5'00,  
*Gum. mimos.* 3'00,  
*Aq. dest.* 150'00,  
*Syr. balsamici* 20'00.  
 MDS. Co 2 godziny łyżkę.

**147.** *Terpinol* 3'00,  
*Extr. et pulv. liquir. q. s.*  
*Utf. pil. N.* 30.  
 S. 4—5 na dzień.

**148.** *Terpinhydratis* 3'00,  
*Extr. et pulv. liquir. q. s.*  
*f. pil. Nr.* 30.  
 S. 3 r. dz. po 1—3 pig.

Wreszcie pobyt nad morzem,  
 lub w miejscach klimatycznych.

## Bronchitis acuta.

Wskazane jest przedewszyst-  
 kiem utrzymanie jednostajnej  
 ciepłoty ciała, u starców leżenie  
 w łóżku, szczególnie wobec Bron-  
 chit. capillar. oraz środki odwo-  
 dzące na klatkę piersiową (bańki  
 suche). Wewnętrznie środki roz-  
 dzielające, wykrztuśne, wobec  
 silnego kaszlu suchego, środki  
 odurzające, wody mineralne al-  
 kaliczne. — Szczawnicka, Giess-  
 hübel, Bilińska, Selterska, Em-  
 ska.

**149.** *Natri bicarb.* 5'00,  
*Morph. mur.* 0'10,  
*Mfp. div. in dos.* XII.  
 DS. 3 proszki dziennie.

**150.** *Inf. rad. Ipec.* 0'50:200'00,  
*Syr. cort. aurant.* 15'00.  
 MDS. Co godzina łyżkę.

**151.** *Inf. Seneg. e* 6'00:200'00,  
*Syr. simpl.* 20'00.  
 DS. Co godzina łyżkę.

**152.** *Vini stibiati* 15'00.  
 DS. 3 razy dnia po 10 kropli.

**153.** *Natri bicarbon.* 5'00,  
*Sulph. aur. antimon.* 0'24,  
*Morph. mur.* 0'10,  
*Mfp. div. in dos.* XII.  
 DS. 3 proszki dziennie.

**154.** *Morph. mur.*  
*Apomorphin mur.* āā. 0'10,  
*Aqu. dest.* 15'00,  
*MD. in vitr. nigr.*  
 S. 3—4 r. dnia po 10 kropli.

\***154.** *Apocodein mur.* 0'10,  
*Aq. lauroc.* 10'00.  
 MDS. Po 10 kropli.

**155.** *Pulv. Doveri,*  
*Sacch. albi āā.* 3'00,  
*Mfp. div. in dos.* XII.  
 DS. 3 proszki dziennie.

**156.** *Natri benzoici* 10'00,  
*Trae aconiti gtts.* 20,  
*Aqu. amygd. amar.* 8'00,  
*Syrup codeini,*  
*Syrup de Tolu āā.* 30'00,  
*Aqu. dest.* 110'00.  
 DS. Co 2 godz. łyżkę.

**157.** *Antifebrin* 0'25 *pro dosi.*  
 Co 2 godziny proszek.  
 Tłumi B. bardzo szybko.

*B. chronica.* Dobrze powietrze,  
 unikanie dymu, kurzu, pożywna  
 dyeta, środki lekko przeczysz-  
 czające. Jeżeli można, wysłać  
 na zimę do cieplejszego klimatu,  
 w lecie pobyt na wsi lub zdro-  
 jowiskach. Inhalacye soli (2%)  
 z dodatkiem Ol. terpent. Ol. pini  
 pumilionis. Picie wód Szcza-  
 wnickich, Giesshübler, Selters.,  
 Ems. Expectorantia: Ipeka, Apo-  
 morphin. Przy Bronchoblenor-  
 rhoea: Ol. Terebinth. dziennie  
 dwa razy po 5—10 kropli z mle-  
 kiem, lub w kapsułkach. W ra-  
 zie duszności bańki suche, sy-  
 napsmy.

Dzieciom z nieżytem oskrzeli  
 bez gorączki, woda Szczawnicka  
 lub Selters. z mlekiem, przy  
 częstym kaszlu:

**158.** *Inf. ipecac e* 0'10 *ad* 80'00,  
*Ammon. muriat.* 1'00,  
*Aq. lauroc. gtts.* X.  
*Syrup simpl.* 15'00.  
 DS. Co godz. łyżeczkę.

Nieżyty O. na tle krzywicy  
 lub zożzów, wymagają leczenia

tranem, żelazem i jodem. Inhalacja z wód alkalicznych, pobyt w miejscach lesistych i górzystych, lub nad morzem. W razie n. O. z gorączką, położyć dz. do łóżka, środki wykrztuśne.

Jeżeli wykrztuszanie skąpe, Natr. jodat. (0:50:100 w naparze ipoki). Senega (e 5:00:100:00). Wdychiwania pary. Jeżeli wydzielina obfita, dodać do Senegi Liquor amm. anis. W razie ustania wykrztuszania, sinicy: flor. benzoës, wino mocne, Cognac, ciepłe kąpiele z zimnemi polewaniami. Dzieci małe często nosić na ręku.

### Bronchopneumonia u dzieci.

Środki wykrztuśne, kompresy z wystawionej wody co 6 godzin. W razie potrzeby leki podniecające.

**159.** *Inf. ipec. e 0:20 ad 60:00,*  
*Liquor. ammon. anis 1:00,*  
*Syrup altheae 20:00.*

MDS. Co godz. łyżeczkę.

**160.** *Inf. ipec. e 0:20 ad 100:00,*  
*Natri Salic. 1:00,*  
*Syrup althea. 20:00.*

DS. Co godz. łyżeczkę.

Zreszta leczenie podane pod Bronchitis.

### Bubo vide Adenitis inguinal.

### Carcinoma mammae.

Wczesne wycięcie całego sutka i wyjęcie gruczołów pod pachą, a w razie ich nieobecności usunięcie całego tłuszczu pod pachą.

W przypadkach nie nadających się już do operacji, można próbować wstrzykiwań miąższowych do guza:

**161.** *Pyocyanini coerulei. 0:1—0:5,*  
*Aqu. dest. 50:00.*

S. 1—5 strzykawek wstrzykn.

W przypadkach owrzodziałych celem odwonienia najlepiej opłu-

kiwać roztworem słabym nadmagnezianu potasowego lub kreoliny:

**162.** *Kal. hypermang. 1:00,*  
*Aq. dest. 50:00.*

S. Kilka kropli do szklanki wody.

**163.** *Creolini 80:00.*

S. Kilka kropli do szklanki wody.

Na wewnątrz można podawać:

**164.** *Vin. Condurango 200:00.*

S. 1—2 łyżeczek przed jedzeniem.

### Carcinoma uteri.

W początkach cierpienia: wycięcie macicy częściowe, a najlepiej całkowite. W przypadkach w których zaś znajdujemy nowotworowy naciek w więzłach szerokich, leczenie objawowe: utrzymanie czystości przez wstrzykiwania odrażające:

**165.** *Kali chloricum 1:100.*

**166.** *Kali hypermang. 10:00,*  
*Aq. dest. 150:00.*

DS. Pół łyżki na litr wody.

**167.** *Acidi carbol. 20:00—30:00,*  
*Aq. dest. 1000:00.*

DS. Do wstrzykiwań.

Gdy plamy krwawe:

**168.** *Acidi pyrolign. crudi 300:00.*

DS. 3—5 łyżek na litr wody do wstrzykiwań.

**169.** *Creolini 20:00.*

DS. 10 kropli na litr wody.

**170.** *Ferri sesquichl. sol. 10:00,*  
*Aq. destil. 1000:00.*

DS. Do wstrzykiwań.

Nadto gdy to nie wystarcza, zakładanie gazy jodoformowej do pochwy.

W przypadkach krwotoków, tamponowanie pochwy.

Gdy znaczniejsze wybijalności i częste krwawienie: wyskrobanie nowotworu i przypieczenie



cum ferro candente, thermokauterem i t. d. albo środkami chemicznymi silnie żracemi.

Wreszcie przeciw bółom należy podawać środki kojące: morfinę, opium i t. d. Baczyć na dobre odżywianie, środki gorzkie pobudzające apetyt.

## Carcinoma ventriculi.

W przypadkach nie nadających się do zabiegu operacyjnego leczenie jest przypadkowe, zmierzające do podtrzymania sił chorego, zapomocą lekko strawnej a pożywnej dyety, oraz usuwania bólów przez podawanie środków odurzających. Prócz tego wskazanem jest podawanie kwasu solnego, którego żołądek rakowato zwyrodniały najczęściej nie wydziela, oraz podawanie przetworów Condurango, przeciw objawom dyspeptycznym. W razie towarzyszącego rozszerzenia żołądka lub krwotoków (vide: Dilatatio ventriculi, — haematemesis).

**171.** *Acid. hydrochlor. 3'00,*  
*Pepsini german. solub de*  
*Rostock 2'00,*  
*Aq. dest. 200'00,*  
*Syr. simpl. 15'00.*

DS. Po każdym jedzeniu 2 łyżki zażywać.

**172.** *Tinct. nuc. vom.*  
*Acidi hydrochl. āā. 10'00.*

DS. Po każdym jedzeniu 15 kropli w szklance wody.

**173.** *Cort. Condurango 15'00,*  
*Maceraper XII. hor. c. 400'00,*  
*Aq. dest. postea coque ad reman. 200'00,*

*dein adde:*

*Acid. hydrochlor. 3'00,*  
*Syr. simpl. 15'00.*

DS. 3 łyżki dziennie.

**174.** *Vini Condurango 100'00.*

DS. 3 łyżeczki dziennie.

W razie wymiotów:

**175.** *Cocaini muriat. 0'20,*  
*Aq. dest. 10'00.*

DS. W razie wymiotów 10 kropli zażywać.

W razie bólów:

**176.** *Morphii mur. 0'10,*  
*Aq. dest. 10'00.*

MDS. W razie bólów 10 kropli zażywać.

**177.** *Codeini 0'20,*  
*Sacch. albi 3'00,*  
*Mfp. div. in dos. X.*

DS. W razie bólu jeden proszek zażywać.

## Cardialgia.

Znaleźć przyczynę bólu i takową starać się usunąć. Najczęściej: *ulcus ventriculi*, *carcinoma ventriculi*, *chlorosis*, i u *hysteryczek*, *neurastheników* lub jako *crises gastriques*.

W razie napadu ciepły okład na żołądek, synapizm na dołek podsercowy, wstrzyknięcie podskórne morfiny, narcotica jak: opium z *bismuth. subnitricum*, *Cocaina 0'01—0'02 p. dosi*, *Beladonna*, *Chloroform* i tp. Nadto uregulowanie dyety.

**178.** *Tinct. opii croc. 5'00,*  
*Tinct. castor. 10'00,*  
*Tinct. valer. aeth. 15'00.*

MDS. 3 r. dz. po 10 kropli.

**179.** *Morphii mur. 0'005,*  
*Bismut. subnitr. 0'30,*  
*Mfp. dtur. tal. dos. Nr. 10.*

S. W razie bólu co 2 godziny proszek.

**180.** *Tinct. Strychni,*  
*Tinct. Opii āā. 5'00.*

DS. Co godzinę po 10 kropli w razie silnego bólu.

**181.** *Argenti nitrici 0'10,*  
*Sacchari et tragacant. āā. q.*  
*s. f. pill. Nr. 10.*

S. 2—3 pig. dziennie.



**182.** *Atropin sulphur.* 0·01,  
Solv. in aq. destil. q. s.  
Extr. et pulv. liquor q. s. f.  
pil. Nr. 10.

S. 1—2 pig. dziennie.

**183.** *Chloroformii* 1·00,  
*Trae valer. aether.* 10·00.

S. Co godz. 10 kropli.

**184.** *Bismut valerian.*  
*Bismut subnitr.* āā. 2·00,  
*Extr. nuc. vom.* 0·50,  
*Extr. gentian. q. s. f. pil.* 50.  
*Obduc. gelat.*

S. 2—3 pig. na czezy żołądek.

Prąd stały z anodą na dołek  
podsercowy, lub też przerywany  
na 6—10 minut. Przeplukiwanie  
żołądka ciepłą wodą na 38—40°.

### **Cardiopalmus, Hyperkinesis cordis.**

Usunięcie przyczyny, najczę-  
ściej stan ogólnie nerwowy, osła-  
biony, lub zatrucie kawą, her-  
batą i tytoniem. Nadto leczenie  
blednicy, niedokrewności i ogól-  
nego osłabienia zwykłymi środ-  
kami. Podczas napadu przy sil-  
nej akcji serca, okład lodowy  
na serce, spokój, wstrzymanie  
się od wszelkich podniecających  
napitków, natomiast przy sł-  
abem działaniu serca, podać wi-  
no, cognac, czarną kawę, her-  
batę, nadto:

**185.** *Coffein citrici* 0·25,  
*Dtur. tal. dos.* N. 4.

S. W razie napadu 1 proszek.

**186.** *Sparteini sulph.* 0·05,  
*Sacchari* 0·30,  
*Mfp. d. tal. dos.* tres.

S. W napadzie 1—2 pr.

**187.** *Theobromin* 0·10,  
*Sacchari* 0·20,  
*Mfp. dtur. tal. dos.* 10.

S. 4—5 pr. dziennie.

**188.** *Trae strophanti,*  
*Trae digital.* āā. 5·00.

DS. Podczas napadu 10—15  
kropli raz lub dwa dziennie.

**189.** *Trochisci nitroglyc.* 0·001.  
S. W napadzie pół pastylki  
lub całą zażyć.

Osobom zaś nerwowym:

*Kali bromat.* 1—2 gram. na raz  
lub też:

**190.** *Trae Valerian. aeth.* 10·00.  
S. 3 r. dz. po 15—20 kropli.

Podskórne wstrzykiw. morfiny  
 $\frac{1}{2}$ —1 etgrm.

### **Catarrhus intestinorum acu- tus.**

Wskazane jest leżenie w łóż-  
ku, ścisła dyeta, okład ciepły  
na brzuch i środek przeczysz-  
czający. W razie silnych bólów,  
leki odurzające; w razie gdyby  
po kilku wypróżnieniach po  
środku czyszczącym biegunka  
nie ustąpiła, przetwory makow-  
ca, także leki zawierające i ściąg-  
ające.

*Cat. intest. chron.*

Leczenie powinno być przy-  
czynowe, uważać należy na  
dyetę, która powinna być lekko  
strawna, na uregulowanie stolca,  
unikanie zaziębień (opaska fla-  
nelowa na brzuch). Woda Karls-  
badzka, w razie obstypacji środ-  
ki lekko czyszczące, lewatywy  
codziennie. Vidē: (Obstipatio  
alvi).

**191.** *Saloli* 0·25,  
*Laud. puri* 0·02,  
*Mfp. div. in dos.* 10.  
S. 3 proszki dziennie.

**192.** *Decoct. rad. Salep* 200·00,  
*Laudani puri* 0·05,  
*Syr. Diacodii* 20·00.  
MDS. Co godz. łyżkę.

**193.** *Mixturae gummos.* 150·00,  
*Trae Opii simpl. gutt.* 20.  
S. Co godz. łyżkę.

**194.** *Cotoini puri* 1'00,  
*Emuls. amygdal.* 60'00.  
 S. Co  $\frac{1}{2}$  godz. 2 łyżki zażyć.  
 (Środek b. drogi).

**195.** *Extr. Opii* 0'02,  
*Tannini* 0'10,  
*Naphtalinae* 0'25,  
*Mfp. d. t. d.* XII.  
 DS. 2—3 proszków dziennie.

**196.** *Pulv. Doveri* 1'00,  
*Extr. Colombo,*  
*Sacch. albi* āā. 2'00,  
*Mfp. div. in dos.* X.  
 DS. Co 2 godz. proszek zażyć.

### C. i. ac. u dzieci.

Dyeta jak przy Dyspepsyi. Bezwarunkowo nie dawać mleka, natomiast woda z białkiem, kawa żołądźkowa, zwracać uwagę na pragnienie, podawać płynny często po łyżeczce np. wodę z rumem, wystawą wodę sodową i Spir. aether. zwłaszcza, gdy są oznaki zapadu. Unikać lewatyw. Jeżeli nieżyt k. z niestrawności Calomel (0'03) pepsyna c. ac. mur.

Jeżeli nieżyt przy normalnem trawieniu się pojawi, można z ostrożnością dać Opiata, oseskom 1—3 kropli dziennie.

**197.** *Trae Coto gtts.* V.  
*Aq. dest.* 50'00,  
*Trae Opii gtts. duas*  
*Syrup* 10'00.  
 DS. Co 2 godz. łyżeczkę.

**198.** *Infus. herb. Melissa* e 5'00  
*ad* 100'00,  
*Resorcin* 0'30,  
*Trae laud. gtts. duas*  
*Syr. Sacch.* 15'00.  
 MDS. Co godz. łyżeczkę.

Ze środków ściągających Trae: Catehu, Kino, Ratanh. (1—2'00: 50'00, Trae Opii gtts. II co godz. łyżeczkę). Bismut Salicyl 0'10 pro dosi w połączeniu z Pulv. Doveri 0'01, Resorcin (0'20: 100'00), Natr. benz. (1'00:100),

Thymol (0'15:100'00 Cognaci gtts. 10). Jeżeli upadek sił występuje, ilość moczu się zmniejsza, kończyny zimne, odstawić leki a pobudzać środkami wy-skokowymi, eter, (podskórnie 1'00).

### Cat. int. chron.

Dzieciom sztucznie żywionym podawać rozcieńczone mleko kozie, odgotowane i ostudzone (3 łyżki mleka, 2 wody, 1 wody wapiennej) taką porcyę co 2 g. lub połowę co godzina, śmietanę Biederta, starszym rosół mocne, Cacao, kawę żołądźkową, herbatę z liści orzecha. Wzbronić tłuszczów, jarzyn. Pokarmy dawać w małej ilości często. W celu zmniejszenia wzdęcia i pobudzenia do lepszego krążenia, okłady Priesnitza.

**199.** *Aq. foeniculi* 75'00,  
*Bismut subnitr.* 2'00,  
*Aq. calcis* 6'00,  
*Syr. flor. aurant.* 15'00.  
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

**200.** *Infus. rad. colombo*  
*e* 0'50:75'00,  
*Bismut subnitr.* 2'00,  
*Syr. flor. aurant.* 15'00.  
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

**201.** *Fol. Jugland.* 100'00,  
*Vini burgund.* 500'00,  
*Macera per 48 horas, adde*  
*Syr. splc.* 30'00.  
 S. Co 3 godz. 1—2 łyżeczki.

**202.** *Chinin tannici* 0'05—0'10,  
*Pulv. Doveri* 0'01—0'02,  
*Sacchari* 0'15.  
*Mfp. tal. dos.* N. 10. S. 3 pr.  
 dziennie.

**203.** *Bismut. salic.* 0'05—0'10,  
*Pulv. Doveri* 0'02,  
*Sacchari* 0'15,  
*Mfp. dt. tal. dos.* 10.  
 S. 3 pr. dz.

Przeciw anaemii woda pyrophosphoran. żelazista.

**204.** *Tannin.* 0'20,  
*Aq. dest.* 80'00,  
*Vini. Tokay.* 15'00,  
*Glycerin.* 10'00,  
*Trac. Opii gttss. tres.*  
 S. Co 3 godz. łyżeczkę.  
 (Miész. Gerhardt).

Starsze dzieci mogą używać wody Karlsbadzkiej na ciepło (Sprudel), wina chinowego i przetworów żelaza.

**Catarrhus pharyngis** zobacz  
**Pharyngitis.**

**Catarrhus ventriculi acut.**

Ostry nieżyt żołądka tylko wtedy nadaje się lekowaniu, gdy domyślamy się, że w żołądku jest jeszcze treść, która takowy wywołała, dawniej stosowano w takim razie środki wymiotne, a potem przeczyszczające, dziś stosowniej robić przepłukanie żołądka, poczem chory najmniej 24 do 48 godzin musi zachowywać ścisłą dyetę. W razie gdy przypuszczamy, że treści w żołądku niema, wystarcza ścisła dyeta, i tylko gdy cierpieniu temu żołądka towarzyszy ta sama zmiana w jelitach, wskazane są środki przeczyszczające. Zresztą leczenie jest czysto przypadkowe, gdy silne bóle w okolicy żołądka występują, wskazane są środki odurzające, w razie pragnienia: kwaski, woda sodowa, Giesshübelska etc.

Jako środki wymiotne.

**205.** *Pulv. rad. Ipecac.* 2'00,  
*Div. in dos. VI.*

DS. Co kwadrans proszek aż do wystąpienia wymiotów.

**206.** *Tartari stibiati* 0'05,  
*Aqu. dest.* 50'00.

W 2-ch porcjach w przeciągu 10-ciu minut zażyć.

**207.** *Apomorphini mur.* 0'10,  
*Aqu. dest.* 10'00.

DS. Podskór.  $\frac{1}{2}$ —1 strzykaw.

**Catarrhus ventriculi chronicus.**

1. (*Acidus*).

Dyeta pożywna lekko strawna, z wykluczeniem potraw korzennych, kwaśnych, tłuszczów, jarzyn, napoi wysokowych i CO<sub>2</sub> zawierających. Wewnętrznie wskazane są środki alkaliczne, woda Karlsbadzka, przepłukiwania żołądka rozcżynami soli alkalicznych, lub wodą Karlsbadzką, w razie silniejszych bólów w dołku podsercowym środki odurzające.

*Cat. ventr. chronicus* 2) (*mu-cosus*).

Wskazana jest dyeta lekko drażniąca, a więc nieco napoj. wysokowych, kwasków organicznych, mięso w możliwym rozdrobnieniu, najlepiej więc siekane. Wewnętrznie środki gorzkie i kwas solny.

Ad. 1.

**208.** *Sal. therm. Carolin factic.*  
 100'00.

S. Na czczo łyżeczkę w  $\frac{1}{2}$  szklanki ciepłej wody.

**209.** *Sal. therm. Carolin originale olla una.*

S. Co dzień na czczo łyżeczkę w  $\frac{1}{2}$  szklanki ciepłej wody zażyć.

**210.** *Natri bicarb.* 15'00,  
*Magn. carbon.* 10'00,  
*Calcar. carbon.* 5'00,  
*MD. in scatula.*

S. 3 razy dnia na koniec noża zażyć.

W razie bólów:

**211.** *Morph. mur.* 0'10,  
*Aquae laurocer.* 10'00,  
*MD. in vitr. nigro.*

S. W razie bólu 10 kr. zażyć.



## Ad. 2.

**212. Trac Amar.**

*Acid. hydrochl. dil. āā. 15'00.*  
MDS. Po każdym jedzeniu 20  
kropli w łyżce wody zażyć.

**213. Acid. hydrochl. 3'00,**  
*Pepsin solub. german. de Ro-*  
*stock 2'00,*

*Aqu. dest. 200'00,*  
*Syr. cort. aurant. 15'00.*  
MDS. Po każdym jedzeniu 2  
łyżki zażyć.

**Catarrhus vesicae.**

W przypadkach ostrych, wi-  
nien chory leżeć w łóżku, na  
brzuch stosujemy okłady wysy-  
chające, dyeta ścisła przeważnie  
mleczna. Napoje wysokokowe na-  
leży zabronić zupełnie, nato-  
miast tylko podawać wodę so-  
dową, bilińską, giesshübelską,  
Vichy, Kissingen, Rohitsch, or-  
szadę lub odwar siemienia lnia-  
nego.

**214. Dct. sem. lini e 10'00 ad**  
*200'00,*

*Syr. simpl. 20'00,*  
*Tct. opii gtts. XX.*  
S. Jako napój.

W razie znacznych bólów na-  
leży zastosować środki narko-  
tyczne.

**215. Extr. Cannab. indic.**

„ *Hyosciam āā. 0'40,*  
*Sacch. alb. 5'00,*  
*Mf. Pulv. div. in dos. N. X.*  
S. 3—4 proszki dziennie.

**216. Opii puri 0'20,**

*Butyr Cacao q. s. f. l. a.*  
*supposit N. X.*  
S. 2—3 czopków dziennie.

**217. Morph. mur. 0'10,**

*Butyr Cacao q. s. f. l. a.*  
*supposit N. X.*  
S. 2—4 czopków dziennie.

**218. Morph. mur. 1'00,**

*Glycerin 5'00,*  
*Aqu. dest. 15'00.*  
S. Do wstrzykiwań.

W przypadkach przyostrych i  
przewlekłych:

**219. Dct. fol. uvae ursi e**  
*20'00 ad 200'00,*

*Natr. bicarb. 3'00,*  
*Syr. simp. 20'00.*  
S. Co 2 godz. łyżkę.

**220. Arbutin 5'00,**

*Div. in dos. N. X.*  
S. 3 proszki dziennie.

**221. Natr. salicyl. 5'00,**

*Div. in dos. N. X.*  
S. 3—4 proszków dziennie.

**222. Salol.**

*Sacch. alb. āā. 5'00,*  
*Mfpulv. div. in dos. N. X.*  
S. 2—4 proszków dziennie.

**223. Ac. tannic. 0'5—1'0,**

*Sacch. alb. 4'00,*  
*Mfpulv. div. in dos. N. X.*  
S. 2—4 proszków dziennie.

Jeżeli mocz alkaliczny lub  
obojętny:

**224. Ac. benzoic. 3'00,**

*Aqu. dest. 150'00.*  
S. Po zakłuceniu na 2 razy  
wypić.

**225. Ac. muriat. 0'50,**

*Aqu. dest. 100'00.*  
S. 3 razy dnia po łyżce.

**226. Ac. benzoic. 0'30,**

*Eleosach. foeniculi 5'00,*  
*Mfp. div. in dos. N. X.*  
S. 3—6 proszków dziennie.

**227. Ac. phosphor. 5'00,**

*Syr. rub. ideii 50'00.*  
S. łyżkę do szklanki wody.

**228. Acid. Salicyl. 8'00,**

*Liquor. ammon. acet. 60'00,*  
*Aq. dest. 80'00.*

MDS. 3—4 razy dz. po łyżce  
w wodzie ocukrzanej.

W przypadkach uporeczywych  
przestrzykiwania pęcherza let-  
niemi rozczyznami:

**229. Ac. boric. 30'00,**

*Aqu. dest. 1000'00.*  
S. S. n.



- 230.** *Ac. carbol.* 5'00,  
*Aqu. dest.* 1000'00.  
S. S. n.
- 231.** *Resorcin* 10'00,  
*Aq. dest.* 1000'00.  
S. S. n.
- 232.** *Argent. nitr.* 0'5—2'00,  
*Aqu. dest.* 1000'00.  
S. S. n.
- 233.** *Acid. salicyl.* 3'00,  
*Aq. dest.* 1000'00.  
S. S. n.
- 234.** *Ac. boric.* 30'00,  
*Jodoform* 10'00,  
*Aqu. dest.* 1000'00.  
S. przed wstrzyknięciem za-  
klucić.
- 235.** *Zinc. sulph.* 0'5—1'—5,  
*Aqu. dest.* 1000'00.  
S. S. n.

W przypadkach nader uporczywych i opierających się wszystkim podanym dotąd środkom, należy przystąpić do drenowania pęcherza przez wykonanie urethrotomii zewnętrznej. W razie zatrzymania lub niepełnego wydalania moczu wypada założyć cewnik.

### Chalazeon.

Nożykiem kończystym przeciąć od wewnątrz tj. od spojówki w kierunku prostym do wolnego brzegu powieki, następnie treść, palcami dokładnie wycisnąć. Ścisła antyseptyka. Należy więc wypłukać worek spojówkowy przedtem kwasem borowym lub sublimatem.

- 236.** *Acidi borici* 6'00,  
*Aqu. dest. ferv.* 200'00.  
DS. Woda borowa do oka.
- 237.** *Sublimati corrosivi* 0'02,  
*Aqu. dest.* 100'00.  
DS. Woda oczna sublimatowa.  
*Hordeolum.* Ciepłe wilgotne okłady (n. p. z bułki maczanej w mleku) a następnie incisia

i wypuszczenie ropy. W celu zapobiegnięcia recydywom smarowanie na noc w brzeg powiekowy wolny, następującej maści:

- 238.** *Praecip. flavi* 0'20,  
*Vasel. fl.* 4'00.  
DS. Maść na powieki na noc.
- 239.** *Praecip. albi* 0'20,  
*Vasel. fl.* 4'00.  
DS. Maść na powieki na noc.

### Chloasma.

Występujące w ciąży ustępuje po ukończeniu tejże i nie jest przedmiotem leczenia — zresztą p. Ephelides.

### Chlorosis.

Przedewszystkiem usunięcie istniejącej przyczyny bladaczki. Pożywienie powinno być b. pożywne, ale łatwo trawiące się. Świeże powietrze, mierny ale systematyczny ruch. Należyte wysypianie się, nieprzeciążanie chorych ani fizyczną ani umysłową pracą. Szczególną mieć uwagę na zaburzenia żołądkowe i jeżeli takowe istnieją, przede-wszystkiem starać się usunąć.

- 240.** *Tinct. malat. ferri,*  
" *Chin.comp.* āā. 25'00.  
DS. 2—3 łyżeczek na dzień.
- 241.** *Ferri sulfur. pur.*  
*Kalii carbon.* āā. 15'00,  
*Gi. Tragacanth. q. s. ut. f.*  
*pill. N.* 120.  
*Consp. pulv. cinam.*  
DS. 3 r. na dzień 2—5 pig.  
(Blauda pigułki).
- 242.** *Ferri sulfur. sicc.* 6'00,  
*Kali carbon. sic.* 5'00,  
*P. althaeae* 3'00,  
*Mel. crud. q. s. ut. f. pil.*  
*N.* 120.  
DS. 3 r. na dzień po 2 pig.  
(Pigułki Valetti).

**243. Ferri carbon. sacch.**

*Sacch. albi,*  
*Natri bicarb. āā. 3'00,*  
*Myrrh. pulv.*  
*Pulv. rad. rhei āā. 2'00,*  
*Mfp. D. ad Scatul.*

S. 2—3 r. na dzień na koniec noża.

**244. Ferri oxydati sacch. 10'00,**

*Pulv. rad. Gent. 5'00,*  
*Extr. Gent. q. s. ut. f. pil.*  
*N. 100.*

S. 3 r. po 2 pigulek następnie 3—4 do 10.

**245. Ferri reducti 10'00,**

*Magn. carbon.*  
*Succ. liquir. āā. 4'00,*  
*Glyc. q. s. ut. f. pil.*  
*N. 100.*

S. 3 r. po 2—4 pig. dziennie po jedzeniu.

**246. Ferri lactici,**

*Sacch. albi,*  
*Eleosacch. cinamom. āā. 0'20,*  
*Mfp. D. tal. dos. N. XX. in*  
*charta cerat.*

S. 3 proszki dz. po jedzeniu.

**247. Pyrophosph. ferri et sodae,**

*Sacch. albi āā. 0'20,*  
*Mfp. D. tal. dos. N. XX.*

S. 3—4 proszki na dzień.

**248. Liqu. ferri album. 50'00.**

DS. 3 r. po łyżeczce od kawy.

**249. Chinini ferro-citrici 1'00,**

*solve in*  
*Vin. malagens. 200'00.*

DS. 3—4 łyżek dziennie.

Obok tego przetwory arsenikalne jak Sol. Fovlera, woda Gubera, Levico, Roncegno 2—3 łyżeczki na dzień, następnie i 2—3 łyżek. Wody żelaziste, Żegiestów, Krynica, Elster, Francensbad i t. p. kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa).

**Cholelithiasis.**

Leczenie 1-mo samej choroby, 2-do napadu kolki wątrobowej.

*Ad 1.* Uregulowanie dyety, ścisła uwaga na oddawanie stolca, z dyety wykluczyć należy przedewszystkiem tłuszcze i kwasy, oraz napoje wysokokowe, Prócz tego środki rozpuszczające złoży żółciowe, a tu należą wody mineralne (Karlsbad, Ems, Vichy etc.) i środek Duranda.

*Ad 2.* Podczas napadu okład ciepły na okolicę wątroby, podskórne wstrzykiwania środków odurzających.

**250. Aether. sulph. 15'00,**

*Ol. Terebinth. rectific. 10'00.*

DS. 3 r. dnia po 15—20 kropel.  
 (Środek Duranda).

**251. Extr. belladon. 0'10,**

*Aq. dest. 20'00.*

MDS. W napadzie co  $\frac{1}{2}$  godz. po 15 kropli.

**252. Morph. mur. 0'10,**

*Aqu. dest.*

*Glycerini āā. 5'00.*

MDS. Do podskórnych wstrzykiwań, w jednej strzykawce 0'01 morfiny.

**253. Natri Salicyl. 0'50,**

*Extr. bellad. 0'01,*  
*Mfp. dtur. tal. dos. N. 10.*

S. 4 proszki dziennie w wodzie sodowej.

Polecają też glicerynę w dawce 20—30 grm. w razie napadu. W dawce 5—15 grm. w wodzie alkalicznej kilka razy dziennie dla zabezp. od napadu

lub

**254. Ol. olivar. optim. 200'00,**

*Cognaci 20'00,*  
*Vitelli ov. Nr. 2,*  
*Menthol. 0'20.*

DS. W przeciągu godziny na 2 razy użyć.

**Cholera.**

W pierwszym okresie choroby wskazane są środki przeczyszczające, a z tych przedewszyst-

kiem Calomel, który ma też mieć znaczenie antyseptyczne dla treści jelitowej. Po kilku obfitych wypróżnieniach, wywołanych środkiem czyszczącym, należy podawać przetwory mawkowca. W przypadku, gdzie są już wymioty, rozwolnienie, odrazu przejść do przetworów mawkowca, chorego w łóżku ułożyć, okłady ogrzewające, środki podniecające: herbata z rumem, cognakiem i t. p. Ciepła kąpiel również wskazana. Następnie przejść do enteroclysmy według Cantaniego: w wodzie przegotowanej o ciepocie 30—40° C. rozpuszcza się tanninę 10:00:1000:00; lejkiem Hegara wlewa się do kiszek 1—2 litrów z wysokości 2 metrów. Powtarzać co kilka godzin. Jeżeli pomimo tego następuje zapad (stad. algidum) stosować hypodermoklyzę z wody destylowanej i sterylizowanej (wodę trzeba w tym celu 1/2 godziny gotować w kolbce zatkanej korkiem z waty). Na 2 litry takiej wody daje się 6:00 Natri carbon. i 8:00 Natri chlorati ogrzewa do 40° C. (zachować ostrożność co do antyseptyki). Zresztą leczenie przypadowe; rozcierania: wyskokiem spir. camphoratus; przeciw kurezom inj. morfiny (1—2 ctgr.) w razie wymiotów: wino szampańskie, zimna woda sodowa kwaśna, kawa czarna, polykanie lodu, Cocaina. W razie zapadu, środki podniecające, inj. podsk. eteru, ol. camphor. Desinfekcja stołców i wymiocin.

Krople Botkina:

*Trae chinæ comp.* 25:00,

*Chinin mur.* 1:00,

*Acid. mur.* 1:50,

*Trae Opii* 6:00,

— *Valer. aeth.* 12:00,

— *nuc. vom.* 1:50,

*Ol. menth.* 0:50.

DS. Co godz. 15 kropli.

**255.** *Tinct. opii croc.* 6:00,

*Vini ipecac.* 4:00.

*Trae Valerian. aeth.* 12:00,

*Ol. menthae pip.* 1:00.

DS. 15 kr. w herbacie z mięty.

**256.** *Camphor.* 1:00,

*Aether. acet.* 15:00,

*Trae opii* 3:00.

DS. Co 1/2 godz. 10 kropli.

Dujardin Beaumetz radzi 1) aby chorego ogrzać napojami, kawą, herbatą z rumem i t. p. 2) przeciw bieguncce:

**257.** *Acidi lactici* 10:00,

*Syr. simpl.* 20:00,

*Tinct. cort. aur.* 2:00.

Całość wlać do litra wody i co kwadrans 3 łyżki podać. 3) Przeciw wymiotom pigułki lodowe lub:

**258.** *Tinct. valerian.* 5:00,

*Laudan. Sydenham.* 1:00,

*Liquor Hoffmann* 5:00,

*Aq. menth. pip. gtts.* V.

MDS. Po 25 kropli, ile razy przychodzi skłonność do wymiotów lub parcia na stolec.

Buequoy poleca przeciw bieguncce:

**259.** *Tinci. cannellae* 10:00,

*Bismut. subnit.* 4:00,

*Laudan. Sydenham.* 0:75,

*Mixt. gummos.* 100:00.

MDS. Co 2 godz. łyżkę

## Cholera infantum.

Zapobieganie: w lecie przestrzegać czystości i świeżości mleka; nie odłączać dzieci w lecie (czerwiec, lipiec, sierpień).

W chwili wybuchu choroby: przedewszystkiem nie dawać żadnego pokarmu, nawet piersi aż do ustąpienia wymiotów. Natomiast: chłodną wodę, źródlaną lub sodową, z kilku kroplami Cognacu często (co 10 minut) po łyżeczkę. Wino, nie zawsze dzieci dobrze znoszą.



**260. Liquor ammon. anis.***Spir. aetheris* āā. 7'00.MDS. Co  $\frac{1}{2}$  godz. 3—5 kropel  
(w wodzie ocukrzanej).**261. Cognaci 10'00,***Aqu. dest.* 180'00,*Syrup sacch.* 10'00.MDS. Co  $\frac{1}{2}$  godz. łyżeczkę.

Czarna kawa, herbata z rumem lub cognakiem, szampan co  $\frac{1}{2}$  godz. łyżeczkę, pigułki lodowe. Jeżeli niebezpieczeństwo groźne i objawy zapadu występują: kąpiele z gorczycą (50'0 mąki gorczycowej do woreczka, wycisnąć w kąpieli), silne nacieranie, dopóki się skóra nie zaczerwieni, później wytarcie i ogrzana pościel. Kąpiel powtórzyć, gdy dziecko zaczyna na nowo stygnąć. Dalej podskórne wstrzykiwania eteru (1—2 strzykawek na 12 godzin).

**262. Flores benzoës 0'50,***Spir. aetheris,**Trae aromat* āā. 5'00.

DS. Co godz. 3—5 kropli.

**263. Acidî benzoici 1'00,***Camphor.* 0'30,*Spir. aether.**Aqu. dest.* āā. 5'00.MDS.  $\frac{1}{2}$  strzyk. na raz.

Jeżeli choroba powstała w dalszym ciągu niestrawności, nieżyty kiszek, wówczas podawać leki ściągające, opium, kreozot.

**264. Calomel. 0'01—0'03,***Sacchari* 0'20,*Mfp. dtur. tal. dos. N.* 10.

S. Rano i wieczór proszek.

**265. Tinct. Colombo***Tinct. Cascarillae* āā. 20'00.S. Co godz. 10—20—30 kropli  
w herbacie podać.**266. Trae ratanhae 1'00,***Aq. dest.* 50'00,*Spir. aether. gtts.* X.*Kreosoti'gttam unam.*

MDS. Co godz. łyżeczkę.

Gdy zaś przyczyną choroby jest nagromadzenie fermentów i choroba wśród zupełnego zdrowia wybuchła, natenczas stosować:

**267. Creosoti gtts. duas***Aquae cinamomi* 90'00.*Syrup* 20'00.

DS. Co 3 godz. łyżeczkę,

**268. Natri benzoici 5'00,***Aqu. dest.* 90'00,*Syrup. simpl.* 10'00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

**269. Resorcini 0'10,***Infus. chamomill.* 60'00,*Trae opii gtts. duas.**Syrup. simpl.* 10'00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Gdy po usunięciu groźnych objawów, pozostanie biegunka, powoli wracać do pokarmów. Zob. *Catarrhus intestin.*

**Chorda.**

1) Dyeta mleczna. 2) Uregulowanie stolca. 3) Zimne okłady i kąpiele systematycznie przeprowadzane, gdyż chwilowo użyte, działają raczej rozdrażniająco: *Antiphrodisiaca*."

**270. Camphor. rasae 0'20,***Mixt. gummosae* 100'00.

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

**271. Lupulini puri 0'10,***Sacchari* 0'30,*Mfp. dtur. tal. dos. N.* 10.

DS. 3 proszki dziennie.

**272. Lupulini puri 0'10,***Camphor. rasae* 0'01,*Extr. Lupuli q. s. ut. f. pill.**dtr. tal. dos. N.* XII.

DS. 6 pigułek dziennie.

**273. Lupulini puri 0'10,***Morph. mur.* 0'005,*Sacchari albi* 0'30.*Mfp. dtur. tal. dos. N.* 10.

DS. 3 proszki dziennie.



**274.** *Camphorae* 2'00,  
*Opii* 0'20,  
*Extr. et pulv. Gentian. q. s.*  
*f. pill. N. 20.*

S. Wieczór w przeciągu go-  
 dziny 4 pig. użyć.

**275.** *Natri bromati* 1'00—1'50,  
*Camphorae rasae,*  
*Lupulini* āā. 0'10,  
*Mfp. dtr. tal. dos. N. 10.*  
 DS. Rano i wieczór proszek.

**276.** *Antipyrini* 0'50,  
*Dtr. tal. dos. N. VI.*  
 DS. 3 proszki dziennie.

Gdy to wszystko bezskuteczne,  
 dajemy iniekcye morfinowe  
 (0'01—0'02 pro dosi) lub:

**277.** *Chloral hydrati* 5'00,  
*Aqu. dest.* 100'00,  
*Syrup cort. aurant.* 10'00.  
 MDS. Łyżkę stołową na noc.

## Chorea minor.

Dobre odżywianie, pobyt na  
 świeżem powietrzu, gimnastyka  
 lecznicza, chociaż w cięższych  
 przypadkach w samym początku,  
 lepiej dzieci trzymać w łóżku.  
 Zabronić nauki, dozwolić dużo  
 spać. Jeżeli na tle niedokrew-  
 ności, blednicy, reumatyzmu:  
 podawać przetwory chininy i  
 żelaza, w ostatnim przypadku,  
 przetwory Salicylu. Kąpiele let-  
 nie, siarczane, kąpiele borowi-  
 nowe (Mattoniego sól borowi-  
 nowa) (24—26°) prąd stały. Roz-  
 pylanie eteru na kręgosłup.  
 W cięższych przypadkach, w celu  
 uspokojenia można podawać  
 chloral, Urethan, Sulfonal, aby  
 wywołać dłuższy sen.

**278.** *Solut. arsen. Fowleri,*  
*Trae ferri pomati* āā. 5'00.  
 DS. 3 r. dnia po 2—3 kropli  
 po jedzeniu. Można postąpić  
 do 5-ciu kropli.

Wody arsenowe: Gubera 2—3  
 łyżek, Levico i t. d.

**279.** *Chloral. hydrat.* 4'00,  
*Natri bromati* 2'00,  
*Aqu. dest.*  
*Syr. aurant. āā.* 25'00.  
 MDS. 3 r. dz. łyżeczkę.

**280.** *Kali jodati* 2'50,  
*Aq. dest.* 150'00.  
 DS. 3 r. dz. łyżkę.

**281.** *Natri bromati* 0'20,  
*Chinini ferrocitrici* 0'10,  
*Sacch.* 0'20,  
*Mfp. Dtr. tal. dos. N. XV.*  
 DS. 3 pr. dziennie.

**282.** *Sulfonali* 0'25—0'50,  
*Dtur. tal. dos. N. V.*  
 S. Na noc proszek.

Prócz tych środków, zachwa-  
 lano w ostatnich czasach anti-  
 pyrynę po 2—3 gramów dziennie  
 (0'50 pro dosi) nie widziałem  
 jednak nigdy skutku.

**283.** *Propylamini* 1'00,  
*Aqu. menth. pip.* 50'00,  
*Syrup simpl.* 20'00.  
 MDS. 3 r. dz. łyżeczkę.  
 (Przez 3—4 dni).

**284.** *Exalgin* 1'00,  
*Solve in spir. menth. pip.*  
 5'00  
*Aquae tiliae* 120'00,  
*Syrup aurant.* 30'00.  
 MDS. 3 r. dz. łyżeczkę.

## Chorioiditis.

### 1. *Exudativa plastica:*

Ciemny pokój, lub konserwy  
 dymne, zaniechanie pracy na  
 dłuższy czas, środki czyszczące  
 (sól morszynska, Hunyady), sy-  
 stematycznie przeprowadzone  
 weierania Unguenti cinerei po  
 2—3'0. Następowo Natrum vel  
 kalium jodatum interne, przez  
 6—8 tygodni; w razie mętów  
 ciała szklanego, iniekcye pod-  
 skórne pilicarpini.

**285.** *Ung. hydrarg. cin.* 30'00,  
*Div. in part. aequ. N. X.*

DS. Jedną paczkę na raz użyć do wcierań.

Przyczem koniecznem jest płukanie ust rozczyntem:

**286.** *Kali chlorici* 10'00,  
*Dent. tal. dos. N. X.*

DS. Jedną paczkę rozpuścić w  $\frac{1}{2}$  litra gorącej wody, a po wystygnięciu całą ilość wypłukać w jednej dobie.

W razie ślinotoku i obrzmienia dziąseł, delikatne pędzlowanie tychże:

**287.** *Tinct. Gallarum* 15'00.  
DS. 2 r. dz. pędzl. dziąsła.

**288.** *Natri iodati* 8'00,  
*Aqu. dest.* 200'00,  
*D. in vitr. nigro.*

DS. Rano i wiecz. łyżkę stoł.

**289.** *Pilocarpini mur.* 0'20,  
*Aqu. dest.* 10'00.

MDS. Do wstrzykiwań podskórnych.

Rozpoczynać od  $\frac{1}{4}$  strzykawki = 0'005 i powoli dojść do pełnej = 0'02, jeżeli chory dobrze poprzednie dawki znosił.

## 2. *Chorioiditis serosa:*

Bardzo podobna w swych objawach klinicznych do jaskry zapalnej: leczenie zob. jaskrę.

3. *Chorioiditis suppurativa* leczenie zob. panophthalmitis.

## Cirrhosis hepatis.

Leczenie polega na podawaniu środków lekko czyszczących, najlepiej solnych, uregulowanie diety, z której napoje wysokie wykluczyć należy. Skuteczne bywa przeprowadzenie kuracji karlsbadzkiej lub marynbadzkiej.

Przeciw nagromadzaniu się płynu w jamie brzusznej, środki moczopędne, gdy te nie są do-

stateczne i wobec indicatio vitalis, nakłócie powłok brzusznych i wypuszczenie płynu.

Jako moczopędne:

**290.** *Calomelanos* 0'10,  
*Sacch. albi* 0'30,  
*Mfp. Dtur. tal. dos. N. XV.*

DS. 5 proszków dziennie.

(Przyczem jednak należy zwrócić baczną uwagę na dziąsła).

**291.** *Theobromini natrosalicyl.*  
*(vel Diuretin)* 0'50,  
*D. tal. dos. N. XV.*

DS. 5 proszków dziennie.

**292.** *Inf. fol. Digit.* 1'00:200'00,  
*Liqu. Kali acet.* 20'00,  
*Trae cort. aurant.* 25'00.

MDS. Co godz. łyżkę.

**293.** *Inf. Juniperi* 15'00:200'00,  
*Syr. simpl.* 15'00.

DS. Co godz. łyżkę.

**294.** *Kali iodati* 10'00,  
*Aq. dest.* 200'00.

MDS. 2 łyżki dziennie.

## Colica flatulenta.

Uwzględnić powody: niestrawność, niezbyt żołądka, zaburzenia nerwowe, hysteria, zaziębienie, zapalenie błony brzusznej, i t. d. i według tychże, stosować leczenie.

Ciepłe okłady na brzuch, masowanie brzucha, mięta pieprzowa, rumianek, herbata gorąca: *Trae laudani* 5—10 kropli co parę godzin; wstrzyknięcie morfiny, środki przeczyszcz., lewatywy.

**295.** *Aq. chloroform. saturatae,*  
*Aqu. Tiliae āā.* 50'00.

MDS. Co godz. łyżkę.

**296.** *Chloroform* 1'50,  
*Trae Valerian. aeth.* 10'00,  
*Morphii mur.* 0'05.

MDS. Co godz. 10 kropli.

- 297.** *Ol. chamomill. gtts. 5,*  
*Aetheris 5'00,*  
*Trae chamomill. 20'00.*  
 MDS. Co godz. 10 kropli.

U dzieci w pierwszych tygodniach życia, zazwyczaj z powodu niestrawności, u starszych z nieżyty kiszek, zatrzymania stolca, na tle zimnicy, hysteryi, czerwliwości (Helminthiasis).

W pierwszym przypadku uregulować karmienie, nieuspokajać dziecka pokarmem.

W napadzie: wilgotne ciepłe okłady na brzuch, smarowanie ciepłą oliwą, lub maściami aromatycznymi. Wprowadzić do kiszki stolcowej trestkę od lewatywy lub kateter (powyżej sphincter internus). Lewatywy z ciepłej wody z oliwą. Rumianek lub herbata z miętą, łyżeczkami. Starszym dzieciom przykładać płatki nakrapiane rumem, synapizma.

- 298.** *Calomel. 0'01—0'03,*  
*Sacchari 0'20,*  
*Mfp. dtur. tal. dos. N. V.*  
 S. Co godz. proszek.

- 299.** *Natri benzoici 0'20,*  
*Aqu. dest.*  
*Aqu. foenicul. āā. 30'00,*  
*Trae laudani gtts. duas.*  
*Syrup simpl. 15'00.*

MDS. Co godz. łyżeczkę.

- 300.** *Chloral hydrat v. Urethan*  
*0'50,*

*Aqu. dest. 80'00,*  
*Mucilag. gum. arab. 20'00.*

MDS. Na 2 lewatywy.

(W razie długotrwałych boleści lub wystąpienia drgawek).

*Trae bellad. gtts. X.*

*Aq. lauroc. 10'00.*

MDS. 10—20 kropli co godz.

(Na tle nerwowem).

**Colica saturnina** zob. zatrucie ołowiem.

## Collapsus.

- 301.** *Acidi benzoici 1'50,*  
*Spir. vin. rectif. 12'00.*

MDS. Wstrzykawkę pełną na raz.

## Combustio.

W lekkich oparzeniach, posypywać pudrem, okłady z wody Goularda, Liquor Burowi, zanurzenie w mydlinach. Ból uśmierza się tryskaniem wody selterskiej z syfona, pędzlowaniem 20% roztworem Cocainy.

Przy oparzeniach drugiego stopnia, przekłuć pęcherze, okłady:

- 302.** *Aq. calcis.*

*Ol. lini āā. 50'00.*

S. Przykładać na szmatkach.

- 303.** *Jodoformii 5'00,*

*Vasellini,*

*Lanolini āā. 25'00.*

Mf. unguentum.

DS. Nałożyć maści na grubość noża i okryć papierem gumowym. Codziennie opatrunek zmieniać lub:

- 304.** *Jodoformii 1'00,*

*Acid. borici,*

*Antipyrin āā. 5'00,*

*Vaselin 50'00.*

Mfung. S. jak wyżej.

Posypywanie dermatolem, lub:

- 305.** *Europheni 3'00,*

*Ol. olivar. 7'00,*

*Vaselin. 60'00,*

*Lanolini 30'00.*

Mfung. S. Maść.

- 306.** *Aristoli 3'00,*

*Ol. olivar. 20'00,*

*Lanolini q. s. ad 100'00.*

S. Maść.

Oparzenia trzeciego stopnia, wymagają uwagi na swobodny odpływ ropy. Opatrunek jodoformowy.

Rozległe oparzenie łagodzi się stałą kąpielą 25—30° R. ciepłą



wodę zmienia się 2—3 razy dziennie.

Jeżeli po odpadnięciu strupa, ziarnina wybujała, lapisować, lub dać 1% maść lapisową, a w celu usunięcia bólu, zapędzować poprzednio Cocainą.

Na rany dobrą ziarniną pokryte stósować maści:

**307.** *Acidi borici*,  
*Cerae albae* āā. 10:00,  
*Paraffini*  
*Ol. amygd. dulc.* āā. 20:00.

**308.** *Acidi carbol.* 1:00,  
*Ol. olivar.* 25:00.  
*Cretae alb. q. s. ut f. pasta mollis.*

W razie upadku sił przy rozległych oparzeniach: wino, *Liquor ammon. anis.* 5—10 kropli, wstrzyknięcie eteru.

## Comedones

Wyciskać palcami lub zapomocą kluczyka od zegarka. W razie rozdrażnienia skóry, okłady z wody zimnej lub ołowiowej, zmywać środkami alkalicznymi, np. *Spir. sapo Kalin.* smarowanie przetworami siarki. Pomimo zadrażnienia skóry, nie należy pudru używać, gdyż łatwo tworzą się nowe.

**309.** *Natri carbonici* 5:00,  
*Aq. rosar.* 100:00,  
*Glycerin* 50:00,  
*Extr. mill. flor. gtt.* 10.  
DS. Do zmywania twarzy.

**310.** *Kali carbonici* 10:00,  
*Aq. dest.* 100:00,  
*Ol. aeth. cinam. gtt.* duas.  
*Ol. aeth. rosar. gtt.* unam.  
S. Do zmywania twarzy.

## Commotio cerebri.

Spokój, zimne okłady na głowę. W razie bezprzytomności, skrapiania wodą, nacierania, synapizmy, lewatywy z octem. Później środki przeczyszczające.

W razie zatrzymania moczu, doprowadzić cewnikiem. Dalsze leczenie według objawów.

## Condylomata acuminata.

Najpewniejszym środkiem jest usunięcie drogą operacyjną. Kłykciny szypułkowe odcina się krzywymi nożyczkami, bezszypułkowe wyskrobuje się ostrą łyżeczką.

Krwotok ztąd powstały mniej-szy, tamuje się przyżeganiem laseczką azotanu srebrowego, osuszywszy poprzednio z krwi watą Brunsą, krwotok większy, tamuje się Pacquelinem. Inne sposoby następujące:

**311.** *Acid. nitr. fumantis* 10:00.  
DS. Zwilżać kłykciny zapomocą przecika drewnianego.

**312.** *Acid. bichloroacetici* 10:00.  
DS. ut. supra.

**313.** *Ferri sesquichlorati soluti*  
20:00.

DS. Do pędzlowania.

**314.** *Plumbi oxydati* 0:25.  
33% *Sol. Kali caust.* 7:50.

MDS. Zapomocą lasecz. szklanej napuścić, zetrzeć watą powstałą przy tem z tkanki kłykciny żółtą masę, i jodoform zasypać.

**315.** *Pulv. frondum Sabinae*,  
*Aluminis usti*,  
*Cupr. sulph. subt. pulv.*  
āā. 5:00.

Mfp. Do zasypywania.

**316.** *Resorcini* 5:00—10:00,  
(20—40%).

*Glycerini*,  
*Vasellini flavi* āā. 12:50.

Mf. Pasta. S. Raz dziennie smarować.

## Condylomata subcutanea.

1. Wygniecenie przy pomocy paznogi palców wielkich.

2. Wyskrobienie ostrą łyżeczką i przyłożenie waty Brunsą na miejsca krwawiące.



3. W razie większej liczby obok siebie gęsto ułożonych kłykein, okład z mydła szarego.

### **Congelatio.**

W świeżych przypadkach nacieranie śniegiem lub zimną wodą, dopóki odmrożona część ciała, do właściwej ciepłoty nie wróci. Przestrzegać wprowadzenia do miejsc ogrzanych. Podać napoje wysokokowe. Pęcherze otworzyć i przyżęgać łapiem lub opatrzyć:

**317.** *Argenti nitrici 0·30,*

*Lanolini,*

*Vaselin āā. 15·00.*

S. Maść do opatrunku.

Jeżeli tkanka skóry obumarła, opatrunek jodoformowy, maść borowa, okłady z wody Goularda lub:

**318.** *Alum crudi 1·00,*

*Plumb. acet. bas. sol. 5·00,*

*Aqu. dest. 100·00.*

DS. Do okładów.

Odmroziny. zob. Perniones.

### **Conjunctivitis blennorrhoeica acuta (gonorrhoea).**

Groźne cierpienie, niebezpieczeństwo zniszczenia rogówki wielkie. Przedewszystkiem zabezpieczyć dotąd zdrowe oko, przez następujący opatrunek. Zapomocą 4 mm. szerokich paszków kitajki angielskiej lub Empl. animale, zalepić szczelnie szparę powiekową, łącząc górną powiekę z dolną, pionowo przylepianymi szczelnie do siebie przystającymi paskami. Następnie zagłębienia oczodołu szczególnie okolice woreczka łzowego wysłać watą Brunsza, całość zaś pokryć odpowiednio dużym owalnym kawałkiem płótna, który przylepia się na około zapomocą colodionu do brzegów oczodołu i powleczone grubą warstwą

tęgoż, daje pewną osłonę przed dostaniem się wydzieliny z chorego do zdrowego oka. Opatrunek ten należy co dzień zmienić.

Dopóki jest I-szy okres infiltracyi (powieki silnie obrzmiałe, przy dotknięciu twarde, skóra na tychże, ścina, napięta, połyskująca, wydzielina ze szpary powiekowej skąpa, brudnowodnista, spojówka szarawo czerwona naciekła) jedynie silne przepłukiwanie (co  $\frac{1}{2}$  godz.) worka spojówkowego, roztworem sublimatu lub boru, ciągłe okłady lodowe na oko, pijawki (4—5) na skroni i purgantia są wskazane obok leżenia w łóżku i zaciemnionej pokoju.

W okresie II-gim (barwa skóry powiekowej żywsza, napięcie tejże ustąpiło miejsca licznym fałdom w tejże, spojówka więcej soczysta i czerwona, wydzielina obfita ropna) natenczas wolno dopiero przejść do tuszowania spojówki 2—3% roztworem lapisu; raz na dobę wystarczy, powtórzyć wcześniej nie wolno, aż strup z poprzedniego lapisu w zupełności, oddalił się. Przytem dalsze częste przemywanie borem lub sublimatem. Lodowe okłady głównie przez 2 godziny po kauteryzowaniu. Leczenie to stosować do zupełnego wyleczenia. W razie zajęcia rogówki 1% atropin. (zob. Iritis) 2 razy dziennie obok powyższego leczenia, skrupulatne obmywanie rąk lekarza w 5% karbolu.

**319.** *Argenti nitr. cryst. 1·50,*

*Aqu. dest. 50·00.*

DS. Lapis 3% do rąk lekarza.

Pędzelek.

**320.** *Acidi carbol. cryst. 10·00,*

*Aqu. dest. 200·00.*

MDS. Karbol 5% do mycia rąk lekarza.

## Conjunctivitis blennorrhoea neonatorum.

Początkowo b. ogłędne i lekkie tuszowanie spojówek powiekowych 1% roztworem argenti nitrici; z chwilą jednak, gdy wydzielina staje się obfitszą i więcej ropną, a spojówka więcej rozpulchnioną, należy tuszować energicznie 2—2½% roztw. arg. nitr. — zwykle starczy raz dziennie. Jeżeli jednak po ostatnim tuszowaniu strup jeszcze nie oddzielił się, należy wstrzymać się z tuszowaniem lub wykonać to b. ogłędnie, omijając miejsca, gdzie się strup znajduje. Po każdym tuszowaniu przez 2 godziny okłady lodowe na oczy. Od samego początku choroby pilne (co ½ godz.) przepłukiwanie worka spojówkowego 3% roztworem kw. borowego, w celu dokładnego usunięcia wydzieliny. Z chwilą ustępowania objawów zapalnych, łapisować coraz słabiej, w końcu przejść do jednego ze zwykłych Collyriów. Komplikacja ze strony rogówki nie zmienia powyższego postępowania. Baczyć pilnie na odżywianie dziecka.

Zapobiegawczo należy przed samym porodem przepłukać pochwę rodzącej kw. borowym, dziecku zaraz po urodzeniu zapuścić po jednej kropli 1% roztw. kwasu łapisu do obu ocz i nie obmywać powiek i twarzy wodą w pierwszej kąpieli, lecz szmatką zmaczaną w wodzie borowej.

## Conjunctivitis blennorrhoea chronica.

Leczenie stosować w zupełności według wskazówek przy: *Conjunctivitis trachomatosa*.

## Conjunctivitis catarrhalis.

W przypadkach lżejszych podostrych i chronicznych, zapusz-

czanie 3 razy dziennie Collyrium przez 4—5 tygodni, zmieniając toż po 2 tygodniach na inne, oko bowiem łatwo przyzwyczaja się i lekarstwo działać przestaje. W przypadkach ostrych i silniejszych chronicznych: tuszowanie spojówki powiekowej przez kilkanaście dni roztworem 1% łapisu, a potem Collyrium. Obmywanie powiek ciepłą wodą rano i wieczór, unikanie kurzu, dymu, silnego gorąca, zakazanie pracy wieczornej, regularny tryb życia, przebywanie na świeżym powietrzu. Wrzód rogówkowy kataralny nie przeciwskazuje użycia łapisu.

**321.** *Acidi borici* 1:50,

*Aqu. dest.* 50°00,

*Zinci sulphur.* 0:20.

MDS. 3 raz. dzien. zapuszczać na dolną powiekę 2 krople. Zakraplacz.

**322.** *Argenti nitr. cryst.* 0:25,

*Aqu. dest.* 25°00,

*D. in v. n.*

DS. Łapis 1% do rąk lekarza. Pędzelek.

**323.** *Sublimati corrosivi* 0:01,

*Aqu. dest.* 50°00,

*Traç. Opil crocat. gtts.* 3.

MDS. 3 r. dz. zapuszczać.

**324.** *Collyrii adstr. lutei* 15°00,

*Aqu. dest.* āā. 5°00,

*D. in v. n.*

S. 3 r. dz. zapuszczać.

## Conjunctivitis crouposa.

Przebieg zazwyczaj lekki, komplikacje rogówkowe rzadko występują. Przepłukiwanie częste worka spojówkowego kwasem borowym; w razie silniejszego obrzmienia powiek zimne okłady. Po oddzieleniu się błon z nastaniem drugiego okresu, przejść do lekkiego łapisowania 1—2% roztworem Arg. nitrici; w końcu jedno ze zwykłych Collyriów

na katar ocz. Zapuszczanie Collyrium z kw. borowego i cynku (zob. Conj. catarrhalis).

**325.** *Acidi borici 6'00,*

*Aq. dest. 200'00.*

DS. Woda oczna.

Zakraplacz.

### **Conjunctivitis diphtheritica.**

Najważniejsze cierpienie oczne, niszczące zwykle zajęte oko. U nas bardzo rzadkie. Zwykle równocześnie z dyfteryą gardła i nosa.

Szczelne zamknięcie odpowiednią opaską oka zdrowego (vide Conjunct. blennorrhoeica); przemywanie częste oka chorego roztworem sublimatu lub kwasu borowego, zasypywanie jodoformem i smarowanie powiek wazelina, lodowe okłady i zapuszczanie 3 razy dziennie atropinu (zob. Iritis).

Skoro błona śluzowa z nacieków dyfterytycznych się uwolni ostrożne tuszowanie 1% lapisem raz dziennie. Liczne blizny spojówkowe wymagają po ustąpieniu choroby, następowego leczenia.

**326.** *Jodoformii subtiliss. pulv. 10'00.*

DS. Proszek oczny.

Pędzelek.

**327.** *Argenti nitr. cryst. 0'25,*

*Aqu. dest. 25'00,*

*D. in v. n.*

DS. Do pędzlowania ocz do rąk lekarza.

Pędzelek.

**328.** *Sublimati corrosivi 0'02,*

*Aqu. dest. 100'00.*

DS. Woda oczna sublimatowa.

**329.** *Acidi borici 3'00,*

*Aqu. dest. 300'00.*

DS. Woda oczna borowa.

Zakraplacz.

**330.** *Vaselinæ flavae 15'00.*

DS. Maść do smarow. powiek.

### **Conjunctivitis follicularis.**

Na pierwszy rzut oka podobna do jaglicy, różni się jednak swą lokalizacją: usadowienie bowiem follikułów, znajduje się przeważnie w dolnym załamku spojówki dolnej powieki, jaglicy zaś głównie na powiece górnej.

Leczenie miejscowe w lżejszych przypadkach polega na zapuszczaniu do worka spojówkowego 3 razy dziennie Collyrium plumbi acetici, w cięższych przypadkach, tuszowanie silniejszym roztworem powyższego środka. Kuracya 5—6 tygodni.

Podstawa żółtowa wymaga również uwzględnienia (zobacz Conjunct. phlyctenulosa).

**331.** *Plumbi acet. basici perf. neutr. 0'25,*

*Aqu. dest. 25'00,*

*Filtra exactissime.*

DS. 3 r. dz. po 3 krople do obu ocz zapuszczać.

(Lekarstwo ma być przeźroczyste jak woda i silnie zatytowane. Po tygodniu świeże powtórzyć).

**332.** *Plumbi acet. basici perf. neutr. 0'50,*

*Aqu. dest. 25'00.*

DS. Do pędzlowania ocz, do rąk lekarza.

Pędzelek.

(Po zatuszowaniu należy dokładnie spłukać lekarstwo ze spojówki wodą).

### **Conjunctivitis scrophulosa (pustulosa).**

W przypadkach zwykłych, zasypywanie raz dziennie w małej ilości (lepiej z mało niż za dużo) kalomelu (pro oculis), lub wprowadzanie maści z hydrarg. praecip. fl. v. album. (zob. hordeolum) pędzelkiem do worka spojówkowego z następowym massowaniem palcem przez po-



wieki, dotąd, dopóki spojówka powiekowa nie utraci chorobowego przekrwienia (zaczerwienienia).

W razie komplikacji z katar-em, (silne zalepianie się powiek rano, liczne nitki śluzowe w za-łamku dolnym, rozpulchnienie spojówki widoczne), lapisowanie 1% roztworem lapisu raz dzien-nie, a później dopiero Calomel. W razie komplikacji ze strony rogówki należy ostrożnie za-sypywać calomel, jeżeli jednak oko zaczerwienia się silniej, lub też phlyctena dotąd szarawa, przybiera zabarwienie więcej żółtawe lub też powiększa się, zaniechać natychmiast dalszego zasypywania i leczyć dalej, jak zwykły wrzód rogówki (zobacz Keratitis suppurativa).

Po zabliznieniu wrzodu ro-gówkowego przejść do kalomelu.

Keratitis phlyctenulosa malig-na, wymaga również leczenia takiego, jak wrzody rogówkowe ropne.

Przytem nie zaniedbać lecze-nia przeciwożłowego: Dużo świeżego powietrza, unikanie wilgotnego, dusznego, ciemnego mieszkania, dobre odżywianie (mleko, mięso, jaja, mało mącz-nych pokarmów, pedantyczna czystość ciała i głowy, harto-wanie racjonalne dziecka, zimno zmywania wodą, gimnastyka). W porze zimowej tran rybi we-wnętrznie, w lecie wysyłanie do zakładów kąpielowych (Rab-ka, Rymanów, Iwonicz).

Podezas używania wody za-wierającej jod, środków rtęcio-wych używać nie można. Rów-nież dopóki zapalenie ocz nie jest usuniętem, kąpiele pełne, wstrzymać należy na razie. W razie światłowstrętu zobacz Blepharospasmus.

### 333. Calomel. v. h. p. et sub. pulv 10:90.

DS. Proszek oczny do rąk le-karza.

Pędzelek.

## Conjunctivitis trachomatosa (aegyptica, Trachoma)

Choroba bardzo u nas częsta, szczególnie między ludnością żydowską i klas ubogich, wy-maga wiele cierpliwości tak ze strony lekarza, jak i chorego do zupełnego wyleczenia. Wy-stępuje głównie w formie ostrej i chronicznej.

Ostra forma wymaga codzien-nego tuszowania spojówek po-wiekowych 2% roztworem lapi-su; skoro zaś objawy zapalne (obrzemienie powiek, znaczna wydzielina, silne zaczerwienie-nie i obrzwanie spojówek) w znacznej części ustępują, przejść należy do tuszowania codziennego cum cupro sulphu-rico in substantia. Siny kamyk powinien być należycie wygła-dzonym.

Chroniczna forma wymaga od początku tuszowania sinym ka-mieniem, chyba że nadmierna sekrecya śluzu, czasowo lapisu wymaga.

Obok powyższego leczenia, należy choremu przepisać subli-mat 1:5000:00 lub też 1% roz-czyn Creoliny, aby kilka razy dziennie zapuszczał po kilka kropel do worka spojówkowego. W razie wrzodów rogówkowych, lepiej jest tuszować lapisem, a po zabliznieniu się tychże: Cu-prum sulphuricum.

Pannus nie wpływa zupeł-nie na wybór lapisu lub cuprum, decyduje tylko w tej mierze wyż przytoczona okoliczność.

W przypadkach, w których znaczniejsza jest ilość ziarn ja-glicowych, przyspiesza się zna-



cznie leczenie, wygniatając (na jednym posiedzeniu lub też kilka dni z rzędu) ziarna jaglicowe; rękoczyn ten najdogodniej jest wykonać palcami: Po odwinieciu odpowiedniej powieki wprowadza się jeden wielki palec pod fałd powiekowy, drugim zaś wielkim palcem, uciska się z góry; naturalnie zabieg ten wykonywa się powierzchwniami paznogi.

Skrupulatna czystość oczu, unikanie wpływów szkodliwych (zob. Conj. catarrh.) objaśnienie chorego, że choroba łatwo innym udzielić się może; powinien więc mieć osobny ręcznik i pościel do spania.

W razie zajęcia tylko jednego oka, baczna uwaga, aby na drugie choroby nie przenieść. Kuracya trwa czasem rok i dłużej.

Po zupełnem usunięciu objawów chorobowych, przepisać rozczyn Cuprum sulph. do domu, i przedstawianie się lekarzowi raz na miesiąc przez czas dłuższy.

**334.** *Argenti nitrici cryst.* 0'50,  
*Aqu. dest.* 25'00.

S. Lapis 2% do rąk lekarza.  
Pędzelek.

**335.** *Cupri sulph.* 1'00,  
*Glycerini* 15'00.

S. Raz dziennie zapuszczać po 2 krople do oka chorego.  
Zakraplacz.

## Contusio.

W pierwszych dniach po uderzeniu, zimne okłady (worek z lodem) i spokój; potem należy częściej chorą masować a po dokonaniem masowania najlepiej owinąć bandażem flanelowym.

**Convulsiones vide Eclampsia.**

## Coryza.

**336.** *Acid. carbol. pur.* 5'00,  
*Ammon. liq.* 5'00,  
*Aq. dest.* 15'00,  
*Alcohol* 10'00.

MDS. Puścić kilka kropli na bibułę i wachać.

**337.** *Bismut. subnitric.*  
*Benzoin pulv.* āā. 6'00,  
*Acid. boric. pulv.* 4'00,  
*Menthol.* 0'20.

Mfp. S. Do zażywania.

## Coxitis.

W początkach cierpienia należy zalecić absolutny spokój: pacjent powinien leżeć bez przerwy na wznak na twardym materacu. W okresach późniejszych choroby, w których występuje skłonność do patognomicznego ustawienia kończyny, wypada założyć opatrunek naciągający z przylepca. Jak długo sprawa zapalna trwa, nie wolno na kończynę chorą następować; jeżeli się tedy pozwoli choremu chodzić, to tylko o kulach, z podwyższonym obcasem i podeszwą po stronie zdrowej, lub w aparacie Taylora. Kontrakтуры pozostałe po zapaleniu stawu biodrowego, można usunąć albo forsownie (zabieg o tyle niebezpieczny, że często spowodować ponowne zaostrzenie się całej sprawy), lub zwolna w aparacie naciągającym. W przypadkach opierających się leczeniu konserwatywnemu, wykonujemy resekcję stawu biodrowego. Rozumie się samo przez się, że podczas całego leczenia energicznie także należy działać przeciwko ogólnemu zakażeniu zółzowemu przez dobre odżywienie, świeże powietrze, kąpiele jodowe i t. d.

**Cystitis vide catarrh. vesicae.**

## Dacryocystitis.

W pierwszych dwóch dniach, założenie silnie uciskającej opaski może chorobę powstrzymać, przyczem bardzo uważać należy, aby oko nie uległo równoczesnemu uciskowi. Skoro jednak uczuwać się daje już choćby niewyraźna fluktuacja, należy przejść od razu do ciepłych wilgotnych okładów, a skoro fluktuacja jest wyraźną, wykonać przecięcie woreczka i wypuścić ropę. Po należytem przestrzykaniu borem lub sublimatem wprowadzić cieniutki zwitek gazy przez ranę do woreczka a koniec jej wystający na zewnątrz, przylepić do skóry poniżej otworu kitajką angielską, nie zalepiając ranki. Procedurę tę co dzień powtórzyć, aż do zupełnego wykleśnięcia całej okolicy woreczka.

Następnie dopiero przejść do wprowadzenia sondy Bowmanna przez punkt łzowy, (zob. Bleunorrh. sacci lacrim.) nie wprowadzając już gazy, ranka zaś sama się zagoi.

## Decubitus.

Największy nacisk należy położyć na profilaxę. We wszystkich przypadkach chorób obłożnych, dłuższy czas trwających, należy się postarać o to, by chorzy leżeli na materacach, na których prześcieradło najmniejszych nie śmie robić fałdów. Jeżeli to tylko jest możliwem, należy choremu zalecać zmianę położenia kilka razy na dzień. Jeżeli mimo przestrzegania tych ostrożności wystąpi na okolicy kości krzyżowej zaczerwienienie, to należy tę część ciała kilka razy w ciągu dnia zmywać octem, sokiem z cytryny lub jakimś przetworem wysokowym (wódka francuską), chorego zaś

ułożyć na materacu wodnym. Jeżeli wystąpią otarcia lub głębsze rany, należy przyłożyć albo opatrunek jodoformowy albo jedną z podanych poniżej maści lub posypek. Skoro się wrzód oczyści, przykładamy maść lapi-sowa. W przypadkach rozległych odleżyn, najlepiej ułożyć chorego na stałe w kąpieli wodnej:

### 338. *Ac. boric.*

*Ol. olivar.*

*Cerae. alb. āā. 15'00,*

*Ung. simpl. 100'00.*

Mfung. S. Maść.

### 339. *Zinc. oxyd. 10'00,*

*Ung. simpl. 100'00.*

Mfung. S. Maść.

### 340. *Ac. boric.*

*Zinc. oxyd. āā. 5'00,*

*Ung. simpl. 100'00.*

Mfung. S. Maść.

### 341. *Emplastr. cerussae 100'00.*

S. Plaster.

### 342. *Plumb. tannic. 10'00,*

*Ung. simpl. 30'00.*

Mfung. S. Maść.

### 343. *Ac. tannic. 2'00,*

*Plumb. acet. bas. 10'00,*

*Ung. simpl. 50'00.*

Mfung. S. Maść.

### 344. *Camphor.*

*Spir. vin. āā. 2'00,*

*Mucill. gum. arab. 6'00,*

*Vin. generos. 90'00.*

S. Do zmywania rany.

### 345. *Argent. oleinici 50'00.*

S. Do posypywania.

### 346. *Argent. nitric. 1'00,*

*Bals. peruv. 10'00,*

*Ung. simpl. 100'00.*

Mfung. S. Maść.

**Defluvium capillorum vide Alopecia.**

## Delirium tremens.

Unikać leczenia osłabiającego, upustów krwi, dyeta pożywna,

oraz nie wielkie ilości piwa lub wina. Uspokoić chorego środkami nasennymi: opium, chloral, (kaftan tyłko w celu ochrony, przeciw uszkodzeniom, zwłaszcza po operacjach).

Chloral można podawać po 3, 4 do 5 gram. jeżeli niema wady serca. Jeżeli chloral nie działa, lub wada serca istnieje: Tra. opii w lewatywie, lub Extr. opii 0'03 podskórnio.

**347.** Amylenhydrat. 6'00,  
Aqu. dest. 60'00,  
(Morph. mur. 0'02).  
Extr. liquor. 10'00.

DS. Na noc połowę użyć.

**348.** Paraldehydi 4'00,  
Aqu. dest. 80'00,  
Rum,  
Syrup simpl. āā. 10'00.

DS. Połowę na raz użyć.

**349.** Tinct. capsici 5'00,  
Aqu. dest. 180'00,  
Syrup aurant. 20'00.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

## Diabetes insipidus.

Pożywna dyeta, mierne użycie napojów.

**350.** Infus Valerianae 5'00,  
ad 100'00,  
Natri bromati 1'00,  
Syrup 15'00.

MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

**351.** Codeini phosphor. 0'10,  
Syr. simpl. 30'00.

MDS. 3 razy dz. łyżeczkę.  
(Dla dziecka 10 lat).

## Diabetes mellitus.

Tylko pożywienie złożone z mięsa, jaj i mleka, to ostatnie jeżeli procent cukru nie wysoki. Tłuszcze nie są zabronione.

Chleba najwyżej 100—150 grm. na dzień, z jarzyn wolno szpinak, sałatę, zielony groszek i fasolkę, kalafiory, szparagi, kapustę; z mącznych jedynie tro-

chę ryżu. Do picia: kawa, herbata osłodzona sacchariną, która nawet w większych ilościach nie szkodzi, kwaskowate wina, wódka, cognac, woda.

Z lekarstw najlepiej jeszcze działa woda Karlsbadzka, potem Vichy, Neuenahr, spore dawki opium do 1'0—2'0 pro die.

*Acid. lacticum* 5'00—10'00  
pro die.

*Acid. carbol.* według Ebsteina:

**352.** *Acid. carbol.* 5'00,  
Aqu. dest. 150'00,  
Aqu. menth. pip. 50'00.

DS. 3—4 łyżeczki na dzień.

**353.** Antipyrina 2—3'00 pro die  
Benzosol 0'25.  
S. 5—6 proszków dziennie.

**354.** Jodoformii  
Extr. lactucae sativ. āā. 1'00,  
Cumarin 0'10,  
M. ut f. pill. N. XX.  
S. 2—3 pigułki na dzień.

**355.** *Pilocarpini* mur. 0'20,  
Aqu. dest. 10'00.  
DS. Podskórnio  $\frac{1}{2}$ —1 strzyk.  
Do osłodzenia płynów używa się pigułek z saccharyny.

**356.** *Saccharini* 3'00,  
Natri carb. sicc. 2'00,  
Manniti 50'00,  
f. pill. N. 100.  
S. Pigułkę na  $\frac{1}{2}$ —1 szklankę płynu.

W razie coma diabeticum środki podniecające, wstrzykiwanie eteru, ciepła kąpiel ze zlewaniem głowy zimną wodą.

## Dilatatio ventriculi.

W przypadkach, gdzie przyczyną cierpienia jest zwężenie odźwiernika czysto bliznowate, czy nowotworowe, wskazany jest zabieg operacyjny.

Chwilową poprawę osiągnąć można przez systematycznie,



dłuższy czas stosowane przepłukiwania żołądka, raz lub 2 razy dziennie rozczynek kw. boro-wego lub salicyl. resoreyny, lub w razie oddziaływ. kwaśnego rozczynek sody.

W razie bólów wskazane są środki odurzające i to lepiej pod-skórnie niż wewnętrznie, gdyż w wypełnionym i rozszerzonym żołądku trudno ulegają wessaniu.

W razie, gdy przyczyną cierpienia jest zwiroteczenie ścian żo-łądka, należy przepisać dyetę pożywną, w małych ilościach a często podawaną z wykluczeniem o ile możliwości płynów; co dzień na czczo uwolnić żołądek zapo-mocą aspiratora żołądkowego od zalegającej treści, a w razie to-warzyszącego nieżytu żołądka, takowy stosownie leczyć.

Skutecznie też działają za-biegi wodolecznicze, mięsienie i prąd indukcyjny, w okolicę żołądka stosowane.

W celu wzmocnienia mięśni żołądka: ipecacuanha 0·02—0·05 w przeciągu 24 godz., raz w pół godziny po jedzeniu, drugą daw-kę (0·01) po całej godzinie.

Przy zaparciu stolca: przed jedzeniem dwie łyżeczki: Sul-phat Magnes., aa. p. aeq. Lewa-tywy z gliceryny. Jeżeli po je-dzeniu występują bóleści, poleca się 2—4 łyżek wody chloroformowej. Przeciw wzdęciu: kreda, węgiel, magnesia w bardzo ma-łych ilościach.

**Diphtheritis vide Angina diphtheritica.**

**Dysenteria.**

W czasie epidemii unikać, nie-stosownego pożywienia. Ścisłe odłączać chorych, a zwłaszcza desinfekcja wypróżnień. Chorzy powinni leżeć w łóżku, miesz-kanie przewietrzać.

Dyeta ścisła, kleik, rosół, mle-ko. Słabszym można dozwolnić bulion z jajem, wyciągów mię-snych, wina. Dzieciom mleko z wodą wapienną, kawa żołą-dziowa, herbata — osłabionym z rumem, wino burgundzkie z kleikiem, starsze dzieci mogą dostawać winnej polewki.

Wszystkie pokarmy należy po-dawać nieco ogrzane.

Dzieci przy piersi będące do-stają pokarm regularnie, lecz wszelkie dodatki usunąć.

Leczenie rozpocząć należy od środków przeczyszczających, Calomel. Ol. ricini, dorosłym 2—4 łyżek dziennie, dzieciom w emul-syi, lub: Infus rhei.

Później środki ściągające, miej-scowe przepłukiwania kiszek le-tnieci rozczynekami. Starcia około odbytnicy troskliwie oczyszczać i zasypywać pudrem salicylo-wym.

Codziennie kąpiel ciepła. do-rośli jedną dziennie, starsze dzie-ci 2, ssawcy najmniej 3. Ciepłota kąpeli 27° przez 5—10 minut. Okłady wysychające, katapla-zmy, zawijania ciepłe sprawiają ulgę.

Podane tutaj recepty odnoszą się do dzieci, dorosłym dawki większe.

**357.** Ol. ricini 30·00,  
Inf. fol. menth. 60·00,  
Gum. arab. 5·00,  
Succi citri 10·00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

**358.** Calomelanos 0·01—0·05,  
Sacchari 2·00,  
Mfp. dtr. tal. dos N. V.  
S. Co godz. proszek.

Jeżeli stolce nie zawierają już kału, można podawać opium ze środkami ściągającymi, jednak po paru dniach znowu środek przeczyszczający.



**359.** *Acidi Salicyl* 10'00,  
*Opii pulv.* 0'20,  
*Mfp. div. in dos. N. XX.*  
 S. 3—4 proszki dziennie (do-  
 rośłym).

**360.** *Natri Salicyl* 2'50,  
*Laudani* 0'05,  
*Mfp. div. in dos. N. X.*  
 DS. 3 pr. dzien. (dzieciom).

**361.** *Natri Salicyl* 5'00,  
*Aqu. dest.* 80'00,  
*Trae laud. gtts.* V.  
*Syrup simpl.* 20'00.  
 MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

**362.** *Liquor. alum acet.* 30'00,  
*Aqu. dest.* 60'00,  
*Syrup simpl.* 15'00.  
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Do lewatyw używa się: sól  
 kuchenna (0'5 $\frac{0}{0}$ ), *Acid. salicyl.*  
 (0'5 $\frac{0}{0}$ ), *Thymol* (0'10 $\frac{0}{0}$ ).

**363.** *Liquor. alum acet.*  
*Aqu. dest. āā.* 100'00.  
 DS. Na 2 lewatywy.

Po lewatywach jakoteż w ra-  
 zie silnego parcia dać czopki:

**364.** *Butyri Cacao* 0'50,  
*Trae opii guttam*  
*Mf. supposit.*  
 S. 2—3 r. dziennie.

**365.** *Extr. bellad.* 0'10,  
*Morphii mur.* 0'05,  
*Butyr Cacao q. s. f. sup.*  
*N. V.*  
 S. 1—2 czopków dziennie (do-  
 rośłym).

W przypadkach przewlekłych  
 podawać dalej lewatywy i środki  
 lekko ściągające.

W razie zapadu: Cognac, wi-  
 no, kamfora, eter.

W okresie zdrowienia przecho-  
 dzić zwolna do pokarmów: jaja,  
 skrobane mięso itd.

**366.** *Bismut. Salicyl* 1'00,  
*Pulv. Doveri* 0'20,  
*Sacchari* 2'00,  
*Mfp. div. in dos. N. 10.*  
 DS. 3 pr. dziennie.

**367.** *Chinini tannici*  
*Bismuti salicyl. āā.* 1'00,  
*Laudani* 0'10,  
*Mfp. div. in dos. N. X.*  
 S. 3 pr. dziennie.

## Dysmenorrhoea.

U panien: unikać ruchu bez-  
 pośrednio przed i podczas pery-  
 odu, zaziębienia, szkodliwych  
 wpływów moralnych. Regulować  
 dyetę. Jeżeli chora niedokrewna  
 lub skrofuliczna, odpowiednie  
 leczenie stanu chorobowego o-  
 gólnego. Leczenie kąpielowe:  
 Iwonicz, Rabka, Krynica ką-  
 piele borowinowe, (Mattoniego  
 sól borowinowa).

Podczas boleści spokój, suche  
 ciepło na okolicę podbrzusza,  
 środki kojące jak: lewatywa  
 z *Tra. opii simpl.* (15 kropli na  
 lewatywę) albo *Chloral hydrat*  
 (1'0 na lewatywę). Czopki do  
 kiszki stolcowej, zawierające o-  
 pium lub morphium, wstrzyknię-  
 cie morphiny pod skórę, u osób  
 silnych, krwistych po jednej pi-  
 jawce na wewnętrznej powierzch-  
 ni obu ud.

W cięższych przypadkach na-  
 leży zbadać dokładnie miejsco-  
 wo narząd płciowy, przez od-  
 bytnicę, albo jeżeli możebne  
 przez pochwę i leczyć, jak u o-  
 sób zamężnych.

Najczęstszą przyczyną bole-  
 snego miesiączkowania, bywa  
 niedrożność przewodu szyi ma-  
 cicy.

Niedrożność pochodzić może  
 ze zmiany położenia macicy jak  
 np. zagięcia tejże, z wrodzonej  
 wąskości przewodu, z krętego  
 przebiegu tegoż.

W tych razach u mężatek za-  
 zwyczaj napotykamy równocze-  
 śnie nieplodność.

W przypadkach takich wska-  
 zanem jest leczenie mechaniczne,  
 polegające na wyrównywaniu  
 zagięcia macicy, na rozszerzaniu

przewodu szyi maciey sposobem tępym, wprowadzeniu zgłębnika lub rozszerzaczy na ten cel zbudowanych do jamy maciey. Jeżeli te sposoby nie prowadzą do celu, wskazanem jest rozszerzenie maciey sposobem krwawym (Hysterostomatoma).

W ostatnim czasie polecają:

Elektryzowanie według metody Apostolego.

**368.** *Extr. hydrast. canad. fluid.*  
2 razy dziennie po 25 kropli  
na 8 dni przed regularnością.

**369.** *Chloral hydrat.* 8'00,  
*Kali brom.* 16'00,  
*Aqu. camphor.* 200'00.

S. Co 2 lub 4 godz. łyżeczkę.

## Dyspepsia nervosa.

Cierpienie to najczęściej stoi w związku z czynnościowem, nadmiernem wydzielaniem soku żołądkowego, lub z niedomogą wydzielniczą żołądka.

Stosownie do tego w 1-szym przypadku wskazane są środki alkaliczne, w 2-gim kwas solny i środki gorzkie.

W innych razach zboczenia w wydzielaniu soku żołądkowego niema, tylko błona śluzowa żołądka jest nadezuła, a w tych przypadkach należy przed jedzeniem podawać środki znieczulające (cocaina) i zapomocą przepłukiwań żołądka zmniejszać przeczulicę błony śluzowej, można też podawać przetwory bromowe.

Prócz tego należy zwrócić uwagę na ogólny stan chorego, u anemicznych wskazane są środki żelaziste (Krynica, Żegiestów. Francensbad i t. d.) u neurasteników i hysteryczek skutecznem bywa leczenie wodolecznicze.

**370.** *Natri bicarbon.*

*Magn. carbon.*

*Kali carbon.* āā. 5'00,

*Pulv. rad. Rhei* 7'00,

*MD. in scatula.*

S. 3 razy dnia na koniec noża zażyć.

**371.** *Sal. therm. Carolin* 100'00.

DS. Co dzień rano łyżeczkę w pół szklanki ciepłej wody.

**372.** *Strontium brom.* 2—3'00.

Po obiedzie i po kolacyi.

W razach niedomogi wydzielniczej:

**373.** *Acid. hydrochl.* 3'00,

*Pepsini German solub de*

*Rostock* 2'00,

*Aqu. dest.* 150'00,

*Syr. simpl.* 15'00.

MDS. Po każdym jedzeniu 2 łyżki zażyć.

**374.** *Acid. hydrochl. dilut.*

*Trae absinthi āā.* 15'00.

DS. Po każdym jedzeniu 20 kropli w łyżce wody zażyć.

U anemicznych z niedomogą wydzielniczą:

**375.** *Trae ferri pomati* 25'00,

*Trae Rhei vinosae*

*Trae amarae āā.* 15'00.

MDS. 3 razy dnia po łyżeczkę zażyć.

**376.** *Ferri carb. sacchar.* 5'00,

*Extr. nucis vomicae* 0'50,

*Pulv. et extr. Rhei āā. q. s.*

*ut f. pill. N. 100.*

DS. 3 razy dnia po 2 pigułki zażyć.

## Dyspepsia u dzieci.

Regularne karmienie osesków, jeżeli przyczyną mleko krowie, wrócić do piersi, lub w miejsce tegoż kleik jęczmienny, owsiany, woda cukrzona z białkiem, rosół cielęcy.

Z poprawą stoleców zwiększać ilość mleka. Jeżeli są odbijania,

czuć kwas z ust, wymioty, stolce serowate: Calomel (0·01—0·03) lub Natrum benzoic. (3%) co 2 godziny łyżeczkę.

W razie wzdęcia bolesnego, wprowadzić kankę lub kateter do odbytnicy. Jeżeli wymioty nie serowate, cuchnące, wskazują na brak kwasów: Acid mur. (0·30:50·0) lub:

**377.** *Pepsin* 1·00,  
*Ac. muriat. gtts. tres.*  
*Aqu. dest.* 90·00,  
*Syr. simpl.* 15·00.

S. Przed pokarmem łyżeczkę.

**378.** *Pepsin* 10·00,  
*Vini Xerens.* 300·00,  
*Acidi mur.* 1·00,  
*Sacch.* 20·00.

MDS. Co 4 godz. łyżeczkę.

W razie nagromadzenia się kału w jelitach. Ol. ricini.

Przy Intertrigo towarzyszącym zmywanie wodą mydlaną.

**379.** *Magnes ustae* 5·00,  
*Talci praepar.* 20·00,  
*Acid. salicyl.* 0·20.

MDS. Do posypywań.

U starszych dzieci:

**380.** *Trae Colombo*  
*Trae cascarillae aa.* 5·00,  
*Trae bellad.* 2·00,  
*Trae opii gtts.* IV.

S. 5—10 kropli przed jedzeniem.

## Dyspepsia u suchotników.

Napoje wysokokowe w miernej ilości, środki gorzkie, kreozot, Strychnina, Rheum, Gentiana.

## Dyspnoe.

Wyszukanie przyczyny powodującej duszność i leczenie stosowne choroby głównej.

W razie większej duszności, otwarcie okna w pokoju, usadowienie chorego na łóżku, skropienie twarzy zimną wodą, natarcie czoła, twarzy wodą kołoforską lub eterem, podanie wina,

cognacu, czarnej kawy, wzięcie eteru, roztarcie nóg i rąk, synapizmu na piersi.

**381.** *Extr. alcoh. Quebracho*  
 10·00,

*Aqu. dest.* 200·00,  
*Succi citr.* 20·00.

Łyżkę podczas napadu.

## Eclampsia infantum.

Uwzględnić przyczyny: Początki chorób ostrych i zakaźnych, zimnica, wpływ przestarchu, użycie środków odurzających, przepalenie głowy, kolki brzuszne, niestrawność, robaki, choroby dróg moczowych (pielmonosis), koklusz, skurecz głosiń, ciała obce w nosie, zranienia.

Wśród samego napadu zimne okłady (woda z octem) na głowę co parę minut, lewatywy, gorczyczniki na kark i łydki, w razie długotrwałych drgawek wdychanie chloroformu (ostrożnie!) kilka kropel na chusteczkę trzymać pod nosem. Lewatywy z chloralu.

W razie powtarzających się napadów:

**382.** *Chloral hydratis* 1·00,  
*Natri bromati* 1·00,  
*Aqu. dest.* 60·00,  
*Syrup sacchari* 15·00.

MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.

**383.** *Chloral hydratis* 0·50,  
*Aqu. dest.* 80·00,  
*Mucilag. gum. ar.* 20·00.

MDS. Połowę do jednej lewatywy.

**384.** *Urethani*  
*Sacchari aa.* 0·20,  
*Mfp. dtur. tal. dos. N. V.*

S. Co 2 godziny proszek w łyżeczce wody.

Jeżeli stolec zaparty:

**385.** *Calomelanos* 0·30,  
*Sacchari* 2·00,  
*Mfp. div. in dos. N. X.*

DS. Co godzina proszek.



## Eclampsia puerperalis.

U ciężarnych okazujących cierpienie nerek, znaczniejsze obrzęki, podawać środki moczopędne (kali aceticum, Acidum Benzoicum) środki wypróżniające, środki napotne, mleczną dyeta.

*Podczas napadu* ułożenie w łóżku otoczonem materacami, aby chorą uchronić od obrażeń; przed wystąpieniem szczykościsku, wsunąć język do jamy ust i między szczęki wsunąć kawałek drzewa okrytego płótnem. Ruchów nie krępować. Znieczulić chorą silnemi dawkami narkotyków, morfin podskórnie 0·02—0·03 lub chloral w lewatywie (2·0). Gdy się chora budzi lub napad występuje, ponowić dawkę. Można użyć chloroformu do wdychania. Po napadzie kąpiel ciepłą 30° R., potem zawinąć w prześcieradło i koc, aby wywołać poty.

Podczas ciąży napady mogą ustać i ciąża być donoszona, dlatego tylko w razach, gdy powyższe leczenie niepomaga, napady występują zbyt często, albo grozi oedema pulmonum, wzniecenie porodu przedwczesnego (założenie świeczki elastycznej do macicy, niektórzy radzą przebicie pęcherza płodowego).

Jeżeli napady występują podczas porodu najlepiej chloroformować, można użyć i narkotyków jak wyżej i kombinować jedno z drugim. Podaje się narkotyk, a oprócz tego ilekrotnie występują objawy zwiastunowe napadu, chlorm. Unikać częstego badania wewnętrznego, aby nie drażnić chorej. Jeżeli są warunki do łagodnego ukończenia porodu to takowy ukończyć. Zabiegów gwałtownych, w celu rozwiązania rodzącej używać nie należy. Jeżeli napady wy-

stępują w położu postępowanie jak podczas ciąży.

**386.** *Chloral hydrat.* 5·0),  
*Aqu. dest.*

*Mucilag g. ar.* āā. 50·00.  
MS. Na 2 lewatywy.

## Eczema acutum.

W okresie rozwoju unikanie tarcia bielizny, gorąca, potu, wilgoci a więc: zmywań i kąpieli. Dla ochronienia od potu i tarcia najlepszym środkiem jest puder, do którego dla zapachu nie dodaje się olejków eterycznych, bo drażnią.

**387.** *Amyli Orizae* 50·00,  
*Pulv. alum. plumos.* 10·00,  
*Zinci oxydati*  
*Pulv. Ireos florent.* āā. 3·00.  
Mfp. DS. Puder.

**388.** *Zinci oxydati*  
*Magist. Bismut.* āā. 5·00,  
*Cerussae* 2·50,  
*Pulv. talci venet.* 5·00.  
Mfp. S. Puder.

Puder zmienia się tak często, ilekroć takowy zwilgotnieje i zagrzeje się.

Przy objawach silnego zapalenia (silne obrzmienie, sączenie z uczuciem bólu i napięcia) okłady zimne z:

**389.** *Plumbi acet. basici* 10·00,  
*Aqu. dest.* 500·00.

MDS. Do okładów lub okłady z liquor Burowi 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>—25<sup>0</sup>/<sub>0</sub> zmieniając takowe co 2 godziny lub Thymol 1:1000.

Najkorzystniej wszakże prawie zawsze ograniczyć się do samego pudru.

W *eczema acutum papulosum* wśród którego istnieje swędzenie powodujące drapanie i pogorszenie sprawy chorobowej pędzluje się:

**390.** *Acidi carbol* 0·50,  
*Spir. vini gallici* 100·00.  
MDS. Zewnętrznie.

**391.** *Acidi carbol* 1'00,  
*Spir. vini gallici* 150'00,  
*Spir. lavandulae*  
*" coloniensis* āā. 25'00,  
*Glycerini* 2'50.  
 MDS. Zewnętrznie.

**392.** *Olei Rusci* 50'00,  
*Aetheris sulphur.*  
*Spir. vini rectific.* āā. 75'00,  
*M. filtra adde olei lavandulae* 2'00.

MDS. (Tra Rusci) Zewnętrznie.

W stadium decrementi usuwa się strupy olejkiem migdałowym, lub oliwą. Na miejsca sączące daje się 2 razy dziennie maść rozciągniętą na płótnie (na twarz maskę płócienną) i przymocowuje opaskami flanelowymi.

Maści używa się:

**393.** *Unguent. Diachylon Hebrae* 50'00.  
 DS. Maść.

**394.** *Empl. Diachyl. simpl.*  
*Vaselini* āā. 25'00,  
*Liquefac. misce.*  
 S. Maść lub:

*Pasta Lassara:*

**395.** *Zinci oxydati*  
*Amyli tritici* āā. 25'00,  
*Vaselini puri* 50'00,  
*Acidi salicyl.* 1'00.

Mf. Pasta.

S. Maść.

Neisser poleca:

**396.** *Tumenoli* 2'00—5'00,  
*Flor. zinci*  
*Magist. bismut.* āā. 2'50,  
*Ung. lenientis*  
*Ung. simplic.* āā. 25'00.

Mfung. S. Maść lub:

**397.** *Dermatoli* 5'00,  
*Vaselin.* 50'00.  
 Mfung. S. Maść.

W stadium squamosum naciera się kilka razy dziennie szorstką, łamiącą się skórę tłuszczem i posypuje się pudrem.

**398.** *Unguenti emolientis* 20'00.  
 MS. Maść.

**399.** *Zinci oxydati* 1'00,  
*Unguenti simpl.* 40'00.  
 Mf. ung. DS. Maść. Lub Maść Wilsona:

**400.** *Benzoes pulverisati* 5'00,  
*Axung. porci* 160'00,  
*Digere cola adde*  
*Zinci oxyd.* 25'00.  
 Mfung. DS. Maść.

Najlepiej wszakże w tym okresie osobliwie w razie śwędzenia używać dziegciu z początku, dając powyższe maści na miejsca dziegiem zapędzowane, później używać samego dziegciu, lub

**401.** *Tumenoli* 5'00,  
*Aether. sulphur.*  
*Spir. rectifc.*  
*Aq. dest.* āā. 15'00.  
 MDS. Do pędzlowań.

## Eczema chronicum.

Wskazania:

1) Rozmięczenie i usunięcie strupów jakoteż zgrubiałego czasem modzelowatego przyskórka.  
 2) Zniesienie chronicznego przekrwienia.

Do rozmięczenia strupów i przyskórka używa się tranu, maści Hebry. Tłuszcze płynne należy kilka razy dziennie napuszczać, maści zaś na płatkach płótna nasmarowane opaskami flanelowymi, ściśle do części schorzałych przystosowane przykładć. Bardzo dobre usługi robi także Emplastrum saponato salicylicum 10%.

W celu usunięcia strupów rozmiękłych: zmywania szarem mydłem, spirytusem mydlanym, mydłem naftolowem. W razie znacznego zgrubienia przyskórka, środki te nie pomagają, używa się tedy okładów z mydła szarego na 24—48 godzin, lub

naciera się rozczyntem kali kaustycznej 1:2.

Skoro skóra pod wpływem tych środków stanie się podatną, gładką, nie sączącą, używa się dziegieci w celu usunięcia przekrwienia.

#### 402. Olei Rusci

„ *olivarum* āā. 25'00.

MDS. Zewnętrznie.

#### 403. Trae Rusci 100'00.

S. Zewnętrznie.

#### 404. Olei Rusci 20'00,

*Spiritus saponato Kalini*  
50'00,

*Glycerini* 10'00.

MDS. Zewnętrznie.

#### 405. Olei fagi 10'00,

*Glycerini* 5'00,

*Ung. emolientis* 50'00.

*Balsami peruviani* 2'00.

#### 406. Glycerini 40'00,

*Olei rosarum*

*Olei flor. aurant. āā. gtts. II.*

*Kali carbonici* 2'50.

MDS. Zewnętrznie.

lub maść cynkowa, lub z białego praecipitatu (1:40).

Eczema poszczególnych części ciała:

### Eczema capillitii.

Rozmiękczyć strupy tłuszczami (oliwa karbolowa 1% tran), zmywać w dzień c. spirytu. saponato kalino. W stadium squamosum pędzlowanie cum Tra. Rusci, w ostatku maść cynkowa, praecipitatu biała (1:40) lub pasta Lassara (Rp. 395).

### Eczema faciei impetiginosum.

Usuwać strupy jak wyżej, po ustaniu sączenia, dziegieć, maść praecipitatu, cynkowa lub Wilsona. Do dziurek nosowych tampony z gliceryną lub oliwą. ragady przyżęga się lapisem.

Przy eczema powiek:

#### 407. Praecip. rubri 0'15,

*Ung. emolientis* 10'00,

*Mf. unguentum.*

S. Maść.

E. sączące uporeczywe u dzieci ustępuje czasem po kilkorazowych 1/2-godzinnych okładach z argent. nitric. 1%.

Chroniczne eczema brzegu warg ustępuje nieraz dopiero po kilkakrotnem przypalaniu cum kali caustico 1:2, również eczema sutka i brodawki sutkowej.

### Eczema chron. scroti.

Unguentum Hebrae, empl. saponato salicylicum 10%. Zmywanie 2 razy dziennie mydłem szarem w kąpieli, gdy sączenie ustąpi, dziegieć.

### Eczema perinei et ani.

Unguentum Hebrae, maść borowa, przy ragadach w rectum czopki.

#### 408. Cocaini muriat. 0'02,

lub: { *Extr. Belladonnae* 0'02,  
          { *Extr. Opii aquosi* 0'02,

*Zinci oxydati* 0'15,

*Butyri Cacao* 1'50,

*Mf. Suppositorium dtr. tal.*  
dos. N. X.

DS. Czopki.

Przy swędzeniu ma znakomicie działać 4—10% maść tumenolowa.

#### 409. Tumenoli 3'00,

*Bism. subnitr.* 2'00,

*Lanolin*

*Vaselini* āā. 25'00.

Mfung. S. Maść.

Jeżeli eczema jest podtrzymywane lub spowodowane chorobami wewnętrznymi, należy takowe leczyć, a więc przy skrofulozie dawać tran, usunąć anemię, choroby żołądka etc.



## Eczema marginatum.

1) bez istniejącego zgrubienia przyskórka: Wcieranie zapomocą pędzla szczecinowatego przez 8—12 dni:

(Maść Wilkinsona):

### 410. Olei Rusci

*Lactis sulphur. āā. 25'00,*

*Sapo viridis*

*Axungiae porci āā. 50'00,*

*Pulv. cretae albae 5'00.*

Mf. unguent. DS. Maść.

### 411. Naphthol 2'50,

*Ungu. simpl. 50'00.*

Mf. unguent. DS. Maść.

### 412. Chrysarobini 5'00,

*Unguents simpl. 50'00.*

Mf. unguent. DS. Maść.

### 413. Naphthol-B 1'00,

*Spirit. vini rectific. 100'00.*

MDS. Zewnętrznie.

### 414. Sublimati corrosivi 1'00,

*Spirit. vini rectific. 100'00.*

MDS. Do pędzlowania.

Lub nacierania dziegciem, trą jodową.

2) Jeżeli istnieje zgrubienie przyskórka należy takowy zapomocą roztworu kali caustici 1:2, lub okładów z mydła szarego usunąć, a następnie, gdy się przyskórek odnowi, powyższe środki pędzlem wcierać.

## Emphysema pulmonum.

Przeważnie leczenie symptomatyczne.

Unikanie zaziębień, przemoczenia nóg, w ogóle wszystkiego, co może spowodować lub powiększyć nieżyt oskrzelowy. Główne zadanie leczyć nieżyt oskrzelowy przez pobyt na świeżym górskim powietrzu, picie wód w Ems, Reichenhall, Nauheim, Szczawnica; na wewnątrz Pulv. Doveri, Ammonium muriat, Tannina z morfiną, Stibium sul-

phurat. aurant. z morfiną, apomorfina, Inf. Ipecacuanhae lub radix Senegae, przetwory balsamiczne jak: Balsam peruw. to-lutanum, ol. terebinth. terpinol, terpinhydrat (3'00: na 30 pigułek, z tego 1—3 pigułek dziennie).

Leczenie w gabinetach pneumatycznych lub za pomocą przyrządów Waldenburga lub Geigla i Majera (Würzburg) lub Schnitzlera.

U ludzi otyłych można polecić picie wód Karlsbadzkich lub Kissingen. Przy osłabieniu akeji serca, podawać obok środków wykrztuśnych i nasercowe. Uważać na wypróżnienia, w razie braku tychże, podać odpowiednie środki.

Dyeta pożywna, ale nie wzdymająca.

### 415. Terpinoli 3'00;

*Extr. et pulv. liquir. q. s.*

*ut. f. pil. N. 30.*

S. 3—4 pig. dziennie.

### 416. Apomorphin hydrochl.

0'05,

*Morphii mur. 0'03,*

*Acidi mur. gtts. X.*

*Aqu. dest. 180'00,*

*Da in vitro nigro.*

S. Co 3 godziny łyżkę.

### 417. Stibii sulphur. aurantiaci

0'30,

*Morph. mur. 0'10,*

*Natri bicarb. 5'00,*

*Mfp. div. in dos. N. XV.*

S. 2—3 proszki dziennie.

### 418. Gutti

*Fol. digit.*

*Bulb. Scillae*

*Stibii sulphur. aurant.*

āā. 1'50,

*Extr. Pimpinellae q. s. ut. f.*

*pil. N. 60.*

DS. Co 2 godziny pigułek.

**419.** *Ol. terebinth.* 2'00,  
*Aqu. menth. pip.* 150'00,  
*Mucil. g. arab.* 30'00.  
 DS. Co 2—3 godz łyżkę.

## Endocarditis.

Właściwego leczenia niema i ogranicza się tylko do symptomatycznego.

Spokojne leżenie w łóżku, dyetą płynna, niepodniecająca. Na okolicę serca okłady zimne lub worek z lodem.

Na wewnątrz *cardiacą*, zwłaszcza *digitalis*, *strophantus*, w razie bólu mierne dawki morfiny.

Przy znacznem osłabieniu: kawa czarna z cognakiem, wino mocne, kamfora lub eter podskórnie wstrzyknięty. *Coffeina* lub *Theobromina* po 0'10 na dawkę, 1'00 pro die.

Przy gorączce wysokiej, mierne dawki antypyretyków, z obawy groźnego zapadu.

## Endometritis.

Ostry nieżyt: spokojne leżenie w łóżku, środki lekko wypróżniające, okłady wysychające na brzuch, wstrzykiwania letnie, (niezbyt silnym prądem) — zawierające środki desinfekcyjne: *Acidum boricum* (3:100) *Ac. carbolicum* (2:100) i t. d. W razie bólów, czopki cum *laudano* lub cum *morphio*.

Przewlekły nieżyt wymaga jużto leczenia ogólnego w przypadkach niedokrewności, żółtów i t. d., już też leczenia miejscowego.

W tym celu można używać wprowadzania środków żrących przypiekadłem Chiarego, albo za pomocą sondy owiniętej watą i napojonej n. p. cum *Tra jodi*, cum *liquore ferri sesquichl.* i t. d. Przepłukiwania macicy za pomocą cewnika Bozemann'a, *Ol. chausena*, i t. d. rozczyznami: kwasu borowego, karbolowego

jak wyżej. Schulzę radzi przedtem rozszerzyć macię sposobem tęym. Wprowadzenie rozczyznów silniejszych, jak kwas karbolowy 4<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, *Cuprum sulphuricum* 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub> zapomocą rurki Bandlera w jego wzierniku do jamy macię.

Dawniej wstrzykiwano rozczyzny do jamy macię strzykawkami Brauna, Madurowicza. Wprowadzenie do jamy macię precyków zawierających jodoform, tanninę i t. d. Wprowadzanie do jamy macię gazy jodoformowej w postaci długiego paska, którego jedna część wypełnia macię, druga zaś sterczy do pochwy.

Gdy te sposoby nie wystarczają, wyskrobanie jamy macię (*Abrasio mucosae*).

Owrzodzenia części pochwowej należy goić przyżeganiem zapomocą: nastoju jodowego, azotanu srebrowego w laseczce, *Cuprum sulphuricum* w kryształach, *Acidum nitricum fumans*, który się stosuje ostrożnie za pomocą precika szklanego albo asbestowego.

W przypadkach dawnych owrzodzeń z przerostem gruczołowym, najlepiej wyskrobać ostrą łyżeczką dno wrzodu i przypieć następnie, do czego użyć można *ferrum candens*, *thermocauter Paquelina*, *Galvanocauter*.

## Enuresis nocturna.

Uwzględnić powody: *Ascaridy*, *Oxyuris*. *Phimosi*, *pavor nocturnus*, zboczenia w odżywieniu, *Onania*.

Zimne obmywania, kąpiele nasiadowe chłodne od 5—20 minut, na wieczór, wstrzymywać od napojów. Polecać przez dzień wstrzymywać moc.

Polecają unikać spania na wznak, lub ułożenie pacjenta, aby była podwyższoną miednica.

Prąd stały, a mianowicie wprowadzić wazką elektrodę metalową (nasmarowaną oliwą) do odbytnicy (u dziewcząt do pochwy) drugą elektrodę zwilżoną na spojenie kości łonowych lub perineum, prąd słaby można zwolna wzmacniać — elektryzować przez 5 minut. Antipyrina po 0·50—1·00 na noc między 9 a 11 godziną przez 14 dni z rzędu.

**420.** *Atrophin sulphur.* 0·05,  
*Aqu. dest.* 30·00.

DS. Po tyle kropli ile dziecko ma lat, o 4 i 7 godzinie wieczorem.

**421.** *Extr. chinæ aqu. sic.* 5·00,  
*solve in*

*Aqu. dest.* 100·00,

*Natri bromati* 2·00,

*Trae bellad. gtts.* X.

*Syrup sacchari* 20·00.

MDS. 3 razy dziennie łyżkę.

**422.** *Extr. bellad.* 0·05,

*Extr. nuc. vomic.* 0·10,

*Sacchari* 2·00,

*Mfp. div. in dos. N. X.*

DS. Na noc jeden proszek.

**423.** *Strychnini nitrici* 0·001,

*Sacchari* 10·00,

*Mfp. div. in dos. aequal.*

*N. XX.*

S. Na noc proszek.

**424.** *Extr. fluid rhœis arom.* 10·00.

S. 5—10 kropli 2 razy dziennie podawać we wodzie.

W razie nadezłości pęcherza, podać na noc Chloral na wewnątrz lub też w lewatywie. Polecają też vesicatoryę przyłożyć na kark.

Skrofulicznych i źle odżywionych leczyć zarazem chininą i środkami żelazistemi.

## Enteritis follicularis.

Zmiana mamki. Odstawione dzieci wrócić do piersi. Smietana Biederta lub zupa Liebiga za

pokarm. Kleik jeczmienny, kawa żółędz., kakao.

Przepłukiwanie kiszki 1% woda słona, Liquorem alum. acetici aa. c. *Aq.* Toż i na wewnątrz.

**425.** *Liquor. alum. acet.* 30·00,

*Aqu. dest.* 50·00,

*Syrup* 20·00.

S. Co 2 godziny łyżeczkę.

*Bismut.* 0·10—0·20 pro dosi

3—4 r. dziennie

*Chinin tannic.* 0·05—0·10

pro dosi.

W razie bólesci i parcia *Extr. opii aq.* 0·01 pr. dosi, 3—4 r. dz., *Tra Opii* według wieku.

W razie krwawienia *Liquor ferri sesqui* 3—5 kropli kilka razy dz. Wśród zapadu herbata z cognakiem, wino czerwone, *liquor ammon. anis.*

## Ephelides (piegi).

Energiczne leczenie z silną reakcją, trwające tydzień, polega na okładach z rozczynu:

**426.** *Hydr. bichlorati* 1·00,

*Spir. vini rectif.*

*Aq. destil.* āā. 50·00.

MDS. *Venen.!* Do okładów.

Łagodniej działa natarcie szarego mydła i pozostawienie takiego na twarzy przez jeden dzień, przykrywając twarz flanelą namoczoną in *Spir. Sapon. Kalino.*

Nacieranie maścią:

**427.** *Lactis sulphur.* 3·00,

*Kali carbon.* 1·50—3·00,

*Ung. rosati* 30·00.

Mfung. S. Maść.

lub:

**428.** *Hydr. praecip. albi*

*Bismut. subnit.* āā. 2·00,

*Ol. olivar.* 1·00,

*Ung. glycerin.* 4·00.

Mfung. S. Maść.



## Epididymitis.

Pozostanie w łóżku, ułożenie wysokie scrotum, zapomocą ręcznika, lub poduszczeni trójkątnej, okłady z acetate plumbi basici 1%<sub>100</sub>, by uniknąć wyprysku, okłady zimne (lecz nie lodowe) środki przeczyszczające, na noc masć z extractum Belladonnae (1:25). Okłady robi się tak długo, dopóki ból trwa (4—10 dni), gdy ból ustąpi lub znacznie się zmniejszy, staramy się o usunięcie wypociny przykładając plaster:

**429.** *Emplastri hydrargyri*  
   *sapon. āā. 15.00.*  
*leni calore liquefac. ut fiat*  
*emplastr. extende supra lin-*  
*teum.*

Plaster taki nosi chory 4—5 dni i zdejmuję go w ciepłej kąpieli, przykładając nowy plaster. Po 2—3 tygodniach wypocina ustępuje i pozostaje tylko guzek stwardniały w dolnej części, w celu usunięcia tegoż zapisujemy:

**430.** *Kali jodati 2.00,*  
*Jodi puri 0.10,*  
*Lanolini 9.00,*  
*Olei olivar. 1.00.*  
*Mf. Unguentum.*  
 S. Maść.

Jeżeli chory w łóżku pozostać nie może, koniecznem jest, aby przynajmniej w nocy przez kilka godzin robił okłady zimne, na dzień zaś w celu umożliwienia chodzenia, zakłada się mu suspensorium Horanda.

## Epilepsia.

Przedewszystkiem starać się wykryć przyczynę padaczki i takową o ile można usunąć, zwłaszcza przy epilepsji odruchowej.

Chory nie powinien fizycznie lub umysłowo nętać się, unikać napojów wyskokowych, żyć higienicznie, uważać na regularny stolec, nie pić kawy, her-

baty, mało lub wcale nie palić, unikać wszelkich gwałtownych wzruszeń.

Podczas aury chory powinien położyć się do łóżka, lub na sofkę, porozpinać ubranie i podjąć napadą ktoś powinien być obecnym, ażeby chory wśród silnych drgawek nie wyleciał z łóżka i nie potłukł się. Nieraz udaje się napad usunąć, mając przygotowany Amylnitrit, kilka kropli na chustkę i parę razy tem oddechać. Czasem zaś kieliszek cognacu, wina, na razie może wstrzymać napad. Podczas bardzo silnego napadu można robić inhalacje chloroformowe.

Jako środki polecane przeciw epilepsji przedewszystkiem: kali bromatum po 2—5 do 10 i 15 grm. na dzień, lub mięszanki bromowe:

**431.** *Ammon. bromati,*  
*Natri brom.*  
*Kali brom. āā. 3.00—5.00,*  
*Aqu. dest. 200.00.*

DS. 2—3 łyżek dziennie, dalej Curara podskórnice (0.005).

**432.** *Curare 0.10,*  
*Aqu. dest. 10.00,*  
*Acid. muriat. gtt. unam.*  
 DS.  $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{2}$  strzykawki na raz.

Polecano też:

**433.** *Decoct. artemisiae*  
*e 15.00 ad 250.00,*  
*Kali bromati 10.00—20.00.*

Podawać też można Valerianę w proszku (0.50—2.00) pro die, albo jako infusum e 10—15.00 na 200.00. Belladonna w pigułkach np.:

**434.** *Extr. Belladon.*  
*Fol. Bellad. āā. 1.00,*  
*Extr. et pulv. liquir. q. s. ut*  
*f. pill. N. 100.*

S. Codzien 2—3 do 6—7 pigulek.

Następnie Zincum oxyd. od 0.05—0.20 p. dosi, w połączeniu

z innymi środkami, lub atropiną na wewnątrz:

**435.** *Zinci oxydati* 0·05,  
*Rad. Valer.* 2·00,  
*Extr. Hyoscyam.* 0·06,  
*Ol. Valerianae* 0·05,  
*Mfp. D. tal. dos. N. X.*  
*Da in charta cerata.*  
 S. 3 proszki na dzień.

**436.** *Atropini sulphur.* 0·01,  
*Aqu. dest.* 10·00.  
 DS. 2—3 razy na dzień po 10 kropli (uważać na żrenice!).

Dalej przetwory arsenikalne jak: Sol. Fowleri, woda Levico, Roncigno.

Przytem można zastosować procedury hydropatyczne i elektryzowanie, prądem stałym głowy n. sympaticus. Podczas status epilepticus można robić inhalacje chloroformowe lub eterowe.

**437.** *Aethyleni bromati*  
*Spir. vini rectific. aa.* 5·00,  
*Aqu. menth. pip. gtts.* 2.  
 S. 2—3 razy dziennie po 5—10 kropli w  $\frac{1}{3}$  szklanki mleka.

## Epistaxis.

Wstrzykiwanie zimnej wody z roczynami ałunu, taniny, octu, ferri sesquichlor. 1%. Soku ze świeżej cytryny itp. Przestrzykiwania bezustanne wodą gorącą najmniej + 53° C., aż do ustania krwotoku. Radzą też ręce i nogi zanurzyć w gorącej wodzie.

Ucisk zewnętrzny na skrzydło nosa, przyczem głowę chorego naprzód pochylić.

Tamponada nosa zapomocą rurki Belocqua. Do tamponady z przodu nosa, polecają zamazać czop z waty w olejku terpentynowym.

W uporeczywych krwotokach nosa podać można Ergotin 0·10 co  $\frac{1}{2}$  godziny.

## Epulis.

Guz cały wraz z schorzałą częścią szczęki należy usunąć ostrą łyżeczką, dno rany wypalić termokauterem i następnie całą jamę wytamponować gazą jodoformową. Usta należy pilnie płukać antyseptycznym rozczy-nem:

**438.** *Ac. borici* 15·00,  
*Aqu. dest.* 500·00.  
 S. Płukanie.

**439.** *Kali hypermang.* 1·00,  
*Aqu. dest.* 50·00.  
 S. Kilka kropli do szklanki wody.

## Erysipelas.

Leczenie ogólne niezem nie różni się od leczenia innych chorób gorączkowych. Przy leczeniu miejscowem, przedewszystkiem wysledzić punkt wyjścia róży, a więc przy róży twarzy, zbadać czy niema abscessu z powodu periodontitis i takowy przeciąć, osobiwie zaś dokładnie zbadać jamę nosa i jeżeli tamże znajdują się exkoryacje strupami pokryte, takowe rozmiękczyć przez wkładanie tamponów, napojonych oliwą karbolową 1%, wkładać waciki z maścią: Hydrarg. praecipit. flavi (0·15:15·00).

Miejsce uległe zapaleniu okłada się suchą watą, lub robi się okłady z Plumbum acet. basicum solut. 1%, 2% roztwór ichtyolu lub z płynu Burowa. Najpowszechniejszym środkiem jest maść kamforowa. Polecają również: Nacierania 4—5 r. dz. ol. therebint. rectific. zapomocą pędzla lub wacika po poprzedniem zmyciu alkoholem lub eterem miejsca schorzonego. Nacieranie dośrodkowo, by zarazka na skórę zdrową nie przenieść. Leczenie to przy białkomoczu nie może być użytym. Cavarri pędzuje

10% rozczynek alkoholowym Fuchsinu.

Lodowych okładów używa się tylko przy różę głowy, połączonej z majaczeniami i utratą przytomności.

#### 440. *Acidi tannici*

*Camphorae* āā. 2'00,

*Aether* 15'00.

MDS. Zewnętrznie.

Miejsca zajęte pędzlować co 3—4 godzin.

### Erythema multiforme et nodosum.

W przypadkach zwykłego erythema multiforme zaniechać wszelkiego leczenia. Przeciw swędzeniom przy Erythema urticatum et papulatum daje się okłady zimne, lub pędzuje się rozczynek:

#### 441. *Acidi salicylici* 1'00,

*Spir. vini gall.* 200'00.

MDS. Zewnętrznie. Następnie posypuje się pudrem.

W razie bólów stawowych, obrzmienia stawów, lub gorączki, pozostaje pacjent w łóżku, nawewnątrz zaś podaje się: Natrum salicylicum, Antipyrin, Chinin. Wielką ulgę robią w tych razach okłady z lodu, zimnej wody, plumbum acet. basicum solut. 1%. W razie gorączki, przypadków gastrycznych, daje się kwaski, antifebrilia, środki przeczyszczające i stosowną dyetę.

W razie częstych nawrotów u kobiet, badać czy nie ma jakich zboczeń w narządzie płciowym, leczyć istniejącą chlorosę i zboczenia w narządzie pokarmowym.

### Favus.

1) Usunięcie ciałek i strupów woszczynowych, przez polewanie przez 2—3 dni, kilka razy dziennie 1% oliwą karbolową i

zmywanie mydłem szarem lub spirytusem mydlanym.

2) Usunięcie grzybków znajdujących się w samym włosie przez epilację.

3) Zniszczenie grzybków znajdujących się w torebce włosowej środkami płynnymi, dostającymi się do torebki.

Metoda: Po wyciągnięciu włosów zmywa się rano i wieczór skórę głowy cum Spiritu saponato kalino. Następnie wciera się w  $\frac{1}{2}$  godziny po tem po osuszeniu skóry zapomocą pędzla szczecinowego.

#### 442. *Lactis sulphur.* 5'00,

*Trae Rusci*

*Spir. Lavandulae* āā. 50'00,

*Glycerini* 1'50.

MDS. Zewnętrznie.

By zapobiedz zsychnianiu się skóry, powstającemu po zmywaniu spirytusem mydlanym lub mydłem, wciera się w południe maść, do której dodaje się antiparasiticum.

#### 443. *Acidi salicyl.* 5'00,

*Vasellini flavi* 35'00,

*Olei naphae gtt. V.*

Mf. Ungu. S. Pomada.

Ponieważ druga i trzecia generacya odrastających włosów zawiera jeszcze grzybki, należy je wyrwać, zmywać głowę spirytusem mydlanym obetrzeć na sucho, wcierać następnie rozczyzn sublimatu (0'03—0'05:100) a nazajutrz rano wetrzeć powyższą pomadę.

### Febris intermittens zob. Intermittens.

### Fluor albus = Blenorhoea Vaginae = Catarrhus Vaginae.

Ostry nieżyt: spokojne leżenie w łóżku, lekko wypróżniające środki. Letnie wstrzy-



kiwania wodą przegotowaną z dodatkiem soli kuchennej, kwasu borowego 3:100, i t. d.

Przewlekły nieżyt:

Wstrzykiwania środkami ściągającymi 1—2—3 razy dziennie.

**444.** *Plumb. acet. b. purum* 2'00,  
*Dtur. dos. tal. decem.*

S. Proszek do litra wody do wstrzykiwań.

**445.** *Plumb. ac. b. sol.* 100'00.

DS. 2 łyżki na litr wody do wstrzykiwań.

**446.** *Sulph. Zinci*  
*Aluminis pulv. āā.*

DS.  $\frac{1}{2}$  łyżeczki na litr wody do wstrzykiwań.

*Sulph. Zinci* 1:100, wody,  
*Kali chlor.* 1:10), wody.

**447.** *Creolini* 15'00.

DS. 5—10 kropli na litr wody do wstrzykiwań.

**448.** *Acidi salicylici* 1'00,  
*Dtur. dos. tal. decem.*

S. Proszek do litra wody do wstrzykiwań.

**449.** *Acidi pyrolignosi crudi*  
300'00.

DS. Trzy łyżki do litra wody do wstrzykiwań.

Do wstrzykiwań należy do rozczynów używać wody przegotowanej. — Oprócz powyższych wstrzykiwań, gdy nie usuwają cierpienia, należy we wzelniku dobrze oczyścić pochwę i zapędzłować takową np. octem drzewnym, co można powtarzać co 3 dni kilkakrotnie, w tym celu można użyć i innych silniejszych rozczynów. Po zapędzłowaniu wypłukuje się pochwę wodą i zakłada tampony. Można także używać proszków: *Acidum salicylicum*, *Alumen*, *Zinc. sulph.* i t. d. samych na wacie, albo w połączeniu z *Amylum*.

Wreszcie zalecają: tampony napojone lekami:

**450.** *Kali jodati* 5'00,  
*Glycerini* 100'00.

DS. Do tamponów.

**451.** *Tannini puri* 3'00,  
*Glycerini* 100'00.

DS. Do tamponów.

## Foetor ex ore.

**452.** *Coff. tost.* 15'00,  
*Carbon. lign.* 5'00.

*Acid. borac.* 5'00,

*Sacchari* 13'00,

*Vanilin q. s.*

*Mf. pastillae pond* 0'75.

Trzymać w ustach dopóki się nie rozpuści.

**453.** *Saccharin*

*Natri bicarb.*

*Acid. salic. āā.* 5'00,

*Alcohol vini* 200'00.

DS. Łyżeczkę na szklanke wody do płukania.

**454.** *Thymol.* 0'50,

*Boracis* 1'00,

*Spir. vini* 2'00,

*Aqu. dest.* 1000'00.

S. Do płukania.

## Fungus umbilici.

Przyżegać lekko lapisem (codziennie) i posypywać pudrem (ac. salicyl. 0'20:50'00 amyli), lub też Catgutem lub jedwabiem podwiązać u podstawy.

## Furunculosis.

Zwrócić uwagę na możliwy diabetes. Kataplazmy ustawicznie stosowane, dopóki choćby mały guzek zostawał. Wczesne nacięcia, opatrunek jodoformomowy. Wśród obfitej furunculosis, ciepłe kąpiele, kąpiele ze sodą (1 klgrm.) kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa), dobre odżywianie, chinina, żelazo.

**455.** *Ichtyoli* 4'00,  
*Aqu. dest.* 15'00.

MDS. Co 3 godz. pędzlować.

Podskórne wstrzykiwanie 3<sup>0</sup>/<sub>10</sub>  
roczynu kwasu karbolowego 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
strzykawki.

**456.** *Acid. salicyl.* 7'50,  
*Empl. saponati* 60'00,  
*Empl. diachylon* 30'00.

DS. 2 razy dnia przykładać.

Furunculosis przewodu usznego zewnętrznego.

**457.** *Mentholi* 5'00,  
*Ol. olivar.* 25'00.

MDS. Raz na dzień wkładać na wacie.

**458.** *Acidi borici* 3'00,  
*Alcohol absol.* 25'00.

DS. Napuścić do ucha i 10 minut zostawić.

### Gangraena pulmonum.

Świeże powietrze, częste przewietrzanie pokoju. Chory powinien leżeć w łóżku na stronie chorej. Dyeta pożywna i podniecająca (przetwory wysokokowe), jeżeli niema przeciwwskazań.

Podawać na wewnątrz środki wykrztuśne i balsamiczne obok niewielkich dawek chininy, oraz robić częste wzięwania z ol. terrebinth 1,0—3,0 na 200 wody lub ol. pini pumilionis polonicae po 10—15 kropli na kieliszek wody do maszynki inhalacyjnej Siegla. Lub też kwas karbolowy 2<sup>0</sup>/<sub>10</sub> do wzięwań, ale w takim razie uważać na mocz, czy nie wystąpi zabarwienie ciemne. Również wzięwania z Thymolu 0'20 z dodatkiem kwasu borowego 3'0 na 100 wody.

Na wewnątrz podać n. p.:

**459.** *Terpinol.* 3'00,  
*Natr. benzoici* 2'00,  
*Sacch. albi q. s. ut f. pill.*  
N. 30.

S. Co 2 godziny pigułkę.

**460.** *Menthol.* 3'00,  
*Sacch. albi*  
*Gum. arab.* 5ā. 2'00,  
*Aqu. dest. q. s. ut. f. pil.*  
N. XX.

S. Co godzinę pigułkę.

Lub menthol podawać w kapsułkach wyrobu Zachradnika po 1'0 grm. z dodatkiem ol. olivar. 2'0.

Do spluwaczki przykrywanej szczelnie wlewać 5<sup>0</sup>/<sub>10</sub> kw. karbolowy lub 2<sup>0</sup>/<sub>10</sub>-ej kreoliny.

### Gingivitis.

Leczenie przyczyn (Periodontitis, Epulis, Stomatitis mercurialis, Stomacace). Częste płukanie ust.

**461.** *Kali hypermang.* 0'05,  
*Aqu. fontis* 200'00.  
DS. Płukanie.

**462.** *Tannini* 3'00,  
*Spirit. vini rectif.* 80'00,  
*Bals. Hoffman.* 20'00.  
MDS. Łyżeczkę na szklanke do płukania.

**463.** *Tinct. Ratanhae*  
*Tinct. Gallar.* āā. 10'00,  
*Tinct. opii* 1'00.  
MDS. Do pędzlowania.

### Glaucoma (Jaskra).

Zaczerwienienie spojówki gałkowej, któremu towarzyszy równoczesne rozszerzenie źrenicy (jeżeli możemy wykluczyć zapuszczenie atropiny) budzi wielkie podejrzenie o jaskrę.

Przy stwierdzonej jaskrze, zapuszczać roztwór Ezerynu lub Pilokarpinu, z początku, dopóki się objawy nie usmierzają, 5—6 razy dziennie a skoro napad zapalny zostanie choć w części usunięty, wykonanie Iridectomii.

Pilokarpina jest lepszą do dłuższego użycia, bo nie ulega

tak szybkemu rozkładowi, jak Eseryna.

Pamiętać należy, że zdarza się jaskra prosta (niezapalna) gdzie jedynym objawem jest podupadanie wzroku i ekskawyce tarczy nerwu wzrokowego.

Atropinu pod żadnym pozorem używać nie wolno, nawet tam, gdzie jest tylko podejrzenie o jaskrę.

**464.** *Pilocarp. muriat.* 0'20,

*Aqu. dest.* 10'00.

DS. Krople oczne.

Zakraplacz.

**465.** *Eserini sulphur.* 0'05,

*Aqu. dest.* 15'00,

*Dt. in v. n.*

DS. Krople oczne (szczelnie zatykać).

## Glossitis.

W przypadkach ostrych należy podawać lód w kawałkach do polykania, na szyję zimny okład.

W przypadkach groźnych wskazane są: liczne głębokie nacięcia i skaryfikacye. Z powodu możliwego ostrego obrzęku głosi, należy mieć narzędzia do tracheotomii pod ręką.

Ropnie przewlekłe, należy rychło otworzyć.

*Fisura linguae:*

**466.** *Acid. carbol.* 2'50,

*Trae jodi*

*Glycerini* āā. 12'50.

MDS. Do pędzlowania.

## Gonitis.

W pierwszym rzędzie należy leczyć przyczynę wywołującą zapalenie stawu, o ile takowa da się wykazać, a więc ogólny reumatyzm stawowy, choroby układu moczopłciowego i t. d. W okresie ostrym zaleca się absolutny spokój w łóżku, ewentualnie opatrunek ustalający. Na wewnątrz podajemy przetwory

kwasu salicylowego a zewnętrznie preparaty jodowe lub ihtyolowe.

W okresie przyostrem lub przewlekłym, opatrunek uciskający, massowanie, kąpiele ciepłe siarczane.

Zapalenie stawu kolanowego, natury gruźliczej, leczymy według ogólnych prawideł leczenia gruźlicy stawów (patrz Tumor albus).

**467.** *Trae jodi* 50'00.

S. Zewnętrznie.

**468.** *Trae jodi*

„ *gallarum* āā. 25'00.

S. Zewnętrznie.

**469.** *Kal. jodat.* 3'00,

*Jodi puri* 0'30,

*Ungu. simpl.* 30'00.

Mf. Ungu. S. Maść.

**470.** *Kali jodati* 5'00,

*Glycer. q. s. ad solut.*

*Sapon. virid.* 5'00.

Mf. Ungu. S. Maść.

**471.** *Natri sulphoichtioli*

*Vaselin* āā. 10'00.

S. Maść.

**472.** *Natr. sulphoichtiol.* 30'00,

*Ol. olivarium* 100'00.

S. Zewnętrznie.

**473.** *Natr. sulphoichtiol.* 10'00

—50'00,

*Aqu. dest.* 100'00.

S. Do okładów.

**474.** *Ammon. sulphoichtioli*

10'00,

*Chloroform* 3'00,

*Lanolin* 10'00.

Mf. Ung. S. Maść.

**475.** *Ammon. sulphoicht.* 10'00,

*Ac. salicyl.* 2'00,

*Collod.* 100'00,

*Ol. ricin.* 10'00.

S. Zewnętrznie.

## Haematemesis.

Przedewszystkiem należy uwzględnić przyczynę krwotoku.



Chory powinien jaknajspokojniej leżeć i wstrzymać się od przyjmowania pokarmów przynajmniej 24 godzin, a nieraz 1—2 tygodni.

Jeżeli osłabienie jest znaczne, lub chory od pokarmów wstrzymuje się dłużej, należy podawać odżywcze lewatywy.

Na okolicę żołądka okład lodowy, kawałki lodu do polykania i środki przeciw-krwotoczne, obok laudanum, cocainy lub morfiny.

W razie zapadu eter podskórnie lub ol. camphoratum.

Gdy wzmagająca się ostra niedokrewność wskazuje, że krwotok nie ustępuje, wstrzykiwania podskórne przetworów sporyszowych.

Po ustąpieniu krwotoków dłuższy czas spokojne leżenie w łóżku, dyeta płynna, mleko zimne łyżkami, a obok tego leczenie przyczynowe.

**476.** *Tannini puri* 0'50,

*Opil puri* 0'10,

*Sacchar. albi* 3'00,

*Mfp. div. in dos. N. V.*

S. Co 2 godziny proszek.

**477.** *Liqu. ferri sesquichlor. guttas* 10.

*Aqu. dest.* 200'00,

*Morph. mur.* 0'05,

*Syr. simpl.* 15'00.

MDS. Co godzina łyżkę.

**478.** *Extr. Secal. cornut* 2'00,

*Spir. dilut.*

*Glycerini aa.* 5'00.

DS.  $\frac{1}{4}$  do jednej strzykawki podskórnie.

## Haematocele retrouterina.

Bezwzględny spokój, leżenie w łóżku na wznak.

Badanie miejscowe ostrożne. W czasie wzrostu guza krwawego, worek lodowy na brzuch albo przyrząd chłodzący Leitera. Przeciw bólowi środki kojące,

przyczem należy zwracać uwagę na stan niedokrewności, najlepiej podawać w czopkach:

**479.** *Extr. opii aquosi* 0'10,

*But. Cacao q. s. ut f. l. artis supp. ad anum quinque.*

DS. W razie boleści czopek (3—4 dziennie).

Dyeta płynna pożywna, środki wypróżniające. Przeciw niedokrewności środki skrzepiające, wstrzykiwania podskórne eteru albo oleum camphoratum, lewatywy ze słonej wody w stosunku 0.60:1000.

Gorączka zwykle nie wysoka, nie wymaga w następnych dniach podawania środków.

Jeżeli w przypadku danym można rozpoznać jako przyczynę, pęknięcie ciąży zamacicznej, wskazanem jest usunięcie tejże sposobami operacyjnymi.

Skoro ustanie gorączka i guz niezbyt bolesny: leczenie pobudzające wessanie, jak przy „Perimetritis.“

Po ustąpieniu guza można pozwolić chorej powstać, gdy regularność przebiegu prawidłowo.

Następne miesiączki powinna się chora szanować.

## Haematuria.

Absolutny spokój, usunięcie przyczyny, o ile jest wiadomą. Zimne okłady na międzykrocze i nad spojeniem łonowem, (w razie krwotoków pęcherzowych lub cewkowych) lub na okolicę lędźwiową (w przypadkach krwotoków nerkowych). W przypadku gwałtownego krwotoku pęcherzowego, można stosować zimne lewatywy lub wprowadzić do odbytnicy mały kolpeurynter napełniony wodą lodową.

- 480.** *Inf. Secal. corn.*  
e. 3'00—8'00 ad 200,  
*Trae opii gtts. XX.*  
*Syr. simpl. 20'00.*  
S. Co godzinę po łyżce stołowej.
- 481.** *Extr. Secal. corn. 1'00,*  
*Sacchar. alb. 2'00,*  
*Mfpulv. div. in dos. N. V.*  
S. Co 3—4 godziny proszek.
- 482.** *Ergotin Bombelon*  
*pro injectione.*  
S.  $\frac{1}{4}$ —1 strzykawki wstrzyknąć.
- 483.** *Ergotin Denzel 25'00,*  
*Boracis 2'50,*  
*Aqu. dest. 72'50,*  
*Filtra!*  
S. Do iniekcji.
- 484.** *Ergotin Denzel 2'00,*  
*Aqu. dest. 180'00.*  
S. Po 2—3 łyżek zażywać.
- 485.** *Ferr. sesquichlorat. 2'00—*  
*4'00,*  
*Aqu. dest. 200'00,*  
*Syr. rubi idaci 20'00.*  
S. Co 2 godz. łyżkę stołową.
- 486.** *Ferr. sulph.*  
*Natr. bicarb. āā. 5'00,*  
*Extr. rad. acori q. s. f. l. a.*  
*pil. N. 50.*  
S. 5—10 pigułek dziennie.
- 487.** *Plumb. acet. 0'30,*  
*Opii pur. 0'10,*  
*Eleos. citri 5'00,*  
*Mfp. div. in dos. N. X.*  
S. 3—5 proszków dziennie.
- 488.** *Tannini puri 1'00,*  
*Opii pur. 0'20,*  
*Sacch. alb. 5'00,*  
*Mfpulv. div. in dos. N. X.*  
S. Co 3 godz. proszek.
- 489.** *Extr. hydrastis. canad.*  
*(Parke Davis e C<sup>o</sup>) 30'00.*  
S. 3 razy dnia po 20 kropli.
- 490.** *Hydrastininum mur. 1'00,*  
*Aqu. dest. 10'00—20'00.*  
S.  $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki wstrzyknąć.

## Haemoptoe.

Bezwzględny spokój, ułożenie chorego na wznak w łóżku, w pokoju o miernej ciepłocie, przykryć chorego lekko.

Nie pozwolić mu się ruszać i mówić — zwolna oddechać.

Pokarmy tylko płynne, zupełnie chłodne, (najlepiej mleko). Wstrzymywać się od kaszlu, a jeżeli kaszel trwa, to spore dawki morfiny 1—2 ctg. na raz. Chorego nie badać. Na piersi lód w worku gumowym lub pęcherzu, połykać małe kawałki lodu. Obok tego na wewnątrz: Plumb. aceticum z opium aa. 0'03 na dawkę, lub też Liqu. ferri sesquichl. 25 kropli na  $\frac{1}{2}$  szklanki wody, z tego łyżkami; lub też Extr. Secal. cornuti. Pulv. secal. corn. aa. 2'00 na 30 pigułek, z tego co 2 godz. pigułek.

W cięższych krwotokach wstrzyknąć ergotynę Bombelon  $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki na raz lub podać atropinę w dawce 0'0002 lub wstrzyknąć  $\frac{2}{4}$ — $\frac{1}{2}$  strzykawki z roztworem 0'01 : 10'0.

Przy podniesionej akcji serca, radzą Inf. digitalis, przez Leydena jednak przeciwwskazane.

**491.** *Extr. fluidi hydrast. canad. 10'00.*

S. Po 20—30 kropli, kilka razy dziennie

**492.** *Ergotin dialys. Bombelon 2'00,*

*Aqu. dest. 20'00,*

*Acid. carbol. gtts. tres.*

MDS. Do wstrzykiwań (1 strzykawka Prawatza zawiera 1 decigr.)

**493.** *Ergotin*

*Chinin. sulph. āā. 2'00,*

*Pulv. fol. digit.*

*Extr. hyosc. āā. 0'20,*

*Mf. pil. N. XX.*

S. Co 2 godziny pigułek.

## Haemorrhoids.

Należy się starać codziennie o należyte wypróżnienie przez podawanie środków lekko przeczyszczających, wodę karlsbadzką i t. p.

Gorące kąpiele nasiadowe, irygacje odbytnicy usuwają czasami cierpienie.

W niektórych znów razach, nadaje się bardzo sonda chłodząca.

Oprócz tego można próbować czopków z ergotyny, chrysorabinu, lewatyw ściągających, wstrzykiwań czystego kwasu karbolowego do guzów.

Jedynie pewnym środkiem jest tylko operacja. Guzy wypadnięte należyte odprowadzić do wnętrza, jeżeli jednak już przeszły w stan zapalny lub zgorzelinowy, najlepiej ograniczyć się do posypywania proszkiem jodoformowym i okładów z octanu glinowego.

Przeciwno uporezywemu swędzeniu najskuteczniejszą zmywania wysokiem.

**494.** *Pulv. liquir. comp.* 50'00.

S. Łyżeczkę wieczór zażyć.

**495.** *Sal. thermar. Carolinens.* 50'00.

S. Łyżeczkę w szklance letniej wody rozpuścić.

**496.** *Extr. secal. corn.* 2'00,  
*Butyr Cacao q. s. f. l. a.*  
*supposit. N. X.*

**497.** *Chrysarobin* 0'80,  
*Jodoformii* 0'30,  
*Extr. bellad.* 0'60,  
*Vaselin.* 15'00.

Mf. ungu. S. Maść.

**498.** *Chrysarobin* 0'08,  
*Jodoform* 0'02,  
*Extr. bellad.* 0'01,  
*Butyr Cacao* 2'00,  
*Glycerin. q. s. f. supposit.*  
*Dtr. tal. dos. N. X.*

**499.** *Calomel* 2'00,  
*Morphini* 0'15,  
*Bism. subnit.*  
*Vasellini aa.* 25'00,  
*Glycerini* 8'00.  
*M. f. ung.*  
S. Zewnętrznie.

**500.** *Cocain hydrochl.* 1'00,  
*Morphii sulph.* 0'20,  
*Atropin sulphur.* 0'10,  
*Tannin.* 0'20,  
*Vaselin* 30'00.

Mfung. S. Po wypróżnieniu posmarować.

## Helminthiasis.

Zob.: ascaris, oxyuris, taenia.

## Herpes.

H. Zoster. Pęcherzyki utrzymać aż do uschnięcia, posypując pudrem, nie robić nigdy okładów, bo te macerują przyskórek i odsłaniają warstwę skóry brodawkową. Na owróżdzenia b. bolesne przy herpes Zoster haemorrhagicus używa się maści z dodatkiem środków kojących.

**501.** *Cerae albae* 3'00,  
*Olei olivar.* 10'00,  
*Leni igne misce adde*  
*Extr. opii aquosi*  
( „ bellad. ) 0'15.  
Mf. ungn. S. Maść.

W celu usunięcia bólów neuralgicznych wśród stad. prodromorum i wśród przebiegu choroby, w bezsenności, daje się morfin na wewnątrz, iniekcye morfinowe, chloral; zewnętrznie plaster:

**502.** *Empl. de Meliloto* 25'00,  
*Extende supra lintum, consperge pulver Laudani* 2'00.  
S. Plaster.

Neuralgie po herpes zostające wymagają prócz środków kojących, także środków wewnętrznych: Chinin, Solutio Fovleri.



## Herpes labialis et progenitalis.

Pęcherzyki jak najtroskliwiej utrzymywać przez przysypywanie pudrem lub aristolem (Hekel).

## Herpes tonsurans.

Wskazania patrz: Favus.

## Herpes tonsurans capilitii.

Przez kilka dni zapuszcza się kilka razy dziennie miejsce schorzone oliwą karbolową 1%, zmywa się eum Spir. saponato kalino i wyrывa się włosy szczypczykami. Następnie naciera się skórę roztworem sublimatu (0.3—0.5:100) lub wciera się płyn:

**503.** *Lactis sulphur.* 5.00,  
*Trae Rusci*  
*Spirit. vini gallici* āā. 50.00,  
*Glycerini* 1.00.  
MDS. Zewnętrznie:

\***503.** *Anthraxobin* 10.00,  
*Ol. oliv.* 30.00,  
*Lanolin* 60.00.  
Mfung. S. Zewnętrznie.

## Herpes tonsurans tułowia.

W postaci pęcherzykowej lub chrostkowej nie wymaga leczenia, bo się sam organizm pozbywa grzybków.

## Herpes tonsurans maculosus.

Sposób Hebry:

Przez 6 dni naciera się 2 razy dziennie mydło szare, bez zmywania warstwy poprzedniej, przez następne 6 dni, pozostaje mydło na skórze, 12-go dnia chorey bierze kąpiel. Kaposi poleca wcierać przez 3 wieczory.

**504.** *Sapo viridis* 100.00,  
*Naphthol-B* 4.00.

Maść ta pozostaje na skórze 8 dni, 12-go dnia kąpiel. Środek ten poleca bardzo Prof. Rosner.

Można także używać maści Wilkinsona.

## 505. *Ol. Rusci*

*Lactis sulph.* āā. 25.00,

*Saponis viridi*

*Aringiae porci* āā. 50.00.

Mf ungu. S. Maść.

Maść tę wciera się przez 4 wieczory, pozostaje przez 4 dni a 9-go dnia daje się kąpiel.

## Hordeolum zob. Chalazeon.

## Hydrocephalus.

*H. acutus.* Zimne okłady, wcieranie szaruchy (po 2.0—4.0 dziennie na głowę i kark, wewnętrznie podać Calomel, (0.01—0.03 co godzinę).

Dzieciom silnym można postawić 2—4 pijawek.

W razie drgawek chloral (0.50—1.0 pro dosi). Synapizm na łydki i kark.

Leczenie krzywicy i zółtów.

*H. chronicus.* Leki moczopędne (Kali aceticum, Juniperus) leki przeczyszczające. Wypuszczenie wody (punkcja) nie wiele rokuje. Somma radzi leczyć działaniem słońca na głowę: codziennie 1/2 godziny do 50 minut.

## Hyperaemia cerebri.

Uwzględnić przyczyny i te usuwać: nadużycia trunków, przeciążenie pracą umysłową, ucisk na szyję, grę na instrumentach dętych, wady serca, rozedma płuc i t. p.

Zimne okłady na głowę, środki przeczyszczające, dyeta.

U dzieci: Pijawki za uszami, zimne okłady na głowę, środki przeczyszczające (Calomel, Rheum, Jalapa), lewatywy, pryszczadła na łydki. W razie drgawek lewatywy z chloralu (0.50—1.0).

## Hyperemesis gravidarum.

Zbadać dokładnie ciążarna w celu czy się nie da wykazać przyczynowe cierpienie: tyłopochylenie, tyłozgięcie ciężarnej macicy, lub inne zmiany narządu płciowego, lub innych organów jak nieżyt żołądka, białkomocz, i w takich razach leczenie przyczynowe.

W przypadkach, gdzie żadne zmiany wyraźne wykazać się nie dadzą, należy używać środków zrazu łagodniejszych, później coraz silniejszych, z tych, które bywają zalecane. Uregulowanie i zmiana dyety, picie śniadania w łóżku, jedzenie z rana pokarmów ostrych j. n. p. kawałek śledzia, albo picie cognaku zaraz po przebudzeniu. Dyeta mleczna, podawanie pokarmów chłodnych, woda sodowa, wody mineralne alkaliczne, polykanie kawałeczków lodu. Kawa mrożona, lody, wino szampańskie przy jedzeniu. Stomachica, pepsyna, kwas solny.

**506.** *Mag. Bismuth 1'50,*  
*Natri bicarb.*  
*Sacch. albi āā. 2'00,*  
*Mf. pulv. div. in dos. X.*  
DS. 3 razy dnia proszek.

**507.** *Kali bromati*  
*Natri bromati*  
*Ammon. bromati āā. 3'00,*  
*Aqu. dest. 200'00,*  
*D. in vitr. nigro.*

S. Rano i wieczorem po łyżce w wodzie sodowej.

**508.** *Cerium oxalicum.*  
1—2 pigułek (po 0'05) na dzień.

**509.** *Cerium valerianicum.*  
5 pigułek po 0'05 dziennie.

**510.** *Cocaini muriat 0'10,*  
*Aqu. dest. 100'00.*  
DS. Co  $\frac{1}{2}$  godz. pół łyżeczki.

**511.** *Cocaini muriatici 0'10,*  
*Aqu. dest. 10'00.*  
DS. 3—4 razy dziennie 10—15 kropli.

**512.** *Menthol 1'00,*  
*Spiritus vini 20'00,*  
*Aqu. dest. 150'00.*  
S. Co godzinę łyżkę.

**513.** *Aqu. laurocer. 10'00,*  
*D. in l. nigra.*  
S. Kilka razy dnia po 10 kropli na lodzie.

Narkotyki jak opium, morfin, chloral, jużto przez usta, jużtoż podskórnio lub w lewatywach.

Lodowe okłady, synapizma, rozpylanie eteru na okolicę żołądka.

W cięższych przypadkach odżywianie przez odbytnicę.

Gdy te środki nie prowadzą do celu, pomazywanie części pochwowej roztworem azotanu srebrowego (1:10) lub laseczką. Stosowanie na część pochwową belladonny lub cocainy.

Rozszerzenie palcem szyi macicy, w sposób aseptyczny, (zabieg ten ostrożnie, gdyż grozi poronieniem).

Gdy chora nie zatrzymuje zupełnie pokarmów i zachodzi obawa o życie, wskazanem jest, wzniesienie poronienia co jednak ex consilio winno być postanowione.

## Hyperidrosis.

*Axillae, genitalium, palmae manus* i lżejsze stopnie potu stóp, ustępują przy zmywaniach następującymi środkami:

**514.** *Tannini 1'00,*  
*Spirit. vini rectific. 250'00.*  
DS. Zewnętrznie.

**515.** *Sublimati corros. 1'00,*  
*Aqu. dest. 40'00.*  
DS. Zewnętrznie.

**516.** *Decoct. cort. Quercus*  
20'00 ad 500'00.

DS. Zewnętrznie.

**517.** *Kali hypermang.* 1'00,  
*Aqu. dest.* 400'00.

MDS. Zewnętrznie.

W niektórych przypadkach potów rąk i stóp, robi dobre usługi zmywanie rozczynem:

**518.** *Naphthol* 10'00,  
*Spir. vini gallici* 175'00,  
*Spir. coloniensis* 25'00.

MDS. Zewnętrznie.

Obok tych środków używa się pudru, który w miejsca stykające się z sobą z watą zakładamy.

**519.** *Acidi Salicyl.* 5'00,  
*Alum.* 2'00,  
*Acidi tannici* 3'00,  
*Amyli tritici* 90'00.

S. Pudrować stopy i posypywać obówie wewnątrz.

W wyższych stopniach potów stóp, najlepsze usługi oddaje maść Hebry, na wypranem starzem płótnie rozprowadzona. Płatek namaszczonego musi dokładnie przylegać do stopy, między palce daje się waciki z maścią, w ten sposób chory po wdzianiu skarpetki na wierzch, może bez dolegliwości oddawać się zwykłym zatrudnieniom.

Po 24 godzinach zmienia się maść, bez obmywania stóp, ściera się tylko dawną maść watą.

Leczenie takie trwa 10—14 dni. Po upływie tego czasu używa się pudru.

Ze środków wewnętrznych używanych przeciw potom są następujące:

**520.** *Agaricini* 0'005,  
*Extr. et pulv. Acori q. s. ut f. pil. dtr. tal. dos. N. XII.*  
DS. 3 pigułki dziennie.

**521.** *Atropini sulph.* 0'007,  
*Extr. et pulv. Liquirit q. s. ut f. pil. X.*  
DS. 2 pigułki dziennie.

Z innych środków wewnętrznych, tonica, roborantia, diuretica.

Owrodzenia smarować 5% maścią resoreynową.

## Hysteria.

Zwrócić uwagę na zmianę w poszczególnych organach, zwłaszcza w narządzie moczowo-płciowym i starać się istniejące złożenia usunąć.

Chorą leczyć psychicznie i starać się zyskać zaufanie. Jeżeli jest anaemia, chlorosa, to odpowiednio leczyć. U osób wynędzniałych dobre skutki daje metoda Weir-Mitchella.

W cięższych przypadkach, chorego umieścić w odpowiednim zakładzie i leczenie systematycznie przeprowadzić.

W mniej wybitnych, leczenie w zakładach wodolecznicznych, zimne nacierania, kąpiele letnie, kąpiele borowinowe (sól borowinowa Mattoniego) i inne procedury. Elektryzowane prądem stałym, lub faradycznym także nieraz dobre skutki daje.

Ze środków wewnętrznych wszystkie nerwina, jak asa foetida, Castoreum, Valeriana, Camphora bromata, Zincum valerianicum i wiele innych. Obok tego pobyt na wsi, w górach lub kąpielach morskich, higieniczne życie, dyeta pożywna niepodniecająca.

W ostatnich czasach polecają, zwłaszcza Francuzi, hypnozę, i suggestyę, jako czynniki lecznicze przy hysterii.

Podeczas napadu hysterycznego raptowne zlanie wodą twarzy, silny prąd elektryczny, chłodna kąpiel, Chlorał w lewatywie lub na wewnątrz. W razie bezsenności Sulphonal 1—2 grm. lub Chlorałamid 2—3 grm. na noc.



**522. Sulfonali 1—200,***Dtr. tal. dos. 6.*

S. Na noc proszek, popić znaczniejszą ilością herbaty lub rosołu.

**523. Amylenhydrat. 5'00,***Aqu. dest. 60'00,**Syrup aurant. 10'00.*

S. Na noc połowę.

**Ichthyosis.**

Usunięcie twardych blaszek przyskrórkowych zapomocą tłuszczów (oliwa, tran) maści Wilkinsona, którą się na noc naciera razem z mydłem szarem, a rano się zmywa. Kaposi chwali bardzo 5<sup>0</sup>/<sub>10</sub> maść naftolową, którą się 1—2 razy dziennie naciera, a co 2-gi dzień mydłem naftolowym zmywa. Skoro skóra pod wpływem tych środków stanie się podatną i gładką, staramy się utrzymać ją w tym stanie, przez kąpiele i wcieranie tłuszczów obojętnych. Na wewnątrz podaje się chinin, żelazo, arszenik, pilocarpin.

**Icterus.**

Leczenie powinno być przede wszystkim zastosowane do przyczyny cierpienia, (vide Cattarrhus gastro-duodenalis, Cholelithiasis. Cirrhosis hepatis, Carcinoma hepatis etc.). Zresztą leczenie przypadkowe, w razie bólów w okolicy wątroby, okład ciepły i wstrzykiwania podskórne morfiny.

Swędzenie skóry lagodzą ciepłe kąpiele i zmywania 2% kwasem karbolowym, z dodatkiem sody lub rozczyn:

**524. Acidi carbol. 10'00,***Chloralhydr. 5'00,**Aq. dest. 500'00.*

S. Do nacierania.

Dyeta przeważnie mleczna i rosółowa. (unikać mięsa).

W nowszych czasach używano z dobrym skutkiem wlewania zimnej wody 1-szym dniem na 12—13° R., w 2-gim 15—16° 3 i 4-go dnia 18—20°, w ilości 1—2 litrów. U dzieci również tak samo, płynu jednak nie więcej jak jeden litr.

**525. Argenti nitric. 0'06,***Aq. dest. 180'00.*

DS. 3—4 razy dz. łyżkę.

**Ileus.**

Jeżeli przyczyną niedrożności jelit jest zwężenie, okrucenie, uwiązgnięta przepuklina, nie wiele można się spodziewać z leczenia środkami wewnętrznymi, należy przystąpić do zabiegu operacyjnego, przedtem jednak należy przez podawanie przetworów makowca uspokoić gwałtowne ruchy jelit i zapomocą dużych lewatyw próbować przywrócić drożność. Lewatywy z wody sodowej: łączy się syfon z sondą do odbytnicy włożoną i powoli wypróżnia. Gdy powodem niedrożności jelit jest uwiązgnięta przepuklina, należy starać się ją odprowadzić (vide Hernia incarcerata). Jeżeli niedrożność jelit pochodzi z wglóbień, udaje się często zapomocą przetworów makowca i lewatyw drożność przywrócić. W nowszych czasach polecają prócz tego, wypróżnienie żółładka zapomocą aspiratora żółłdkowego.

Gdy te środki nie skutkują, nie należy długo zwlekać z zabiegiem operacyjnym.

Gdy przyczyną cierpienia jest zaparcie kału, a nie ma objawów zadrażnienia otrzewnej, należy podawać środki przeczyszczające w dużych dawkach, w razie przeciwnym lub, gdy środki czyszczące nie skutkują, prze-

twory makowca, okład lodowy na brzuch, kawałki lodu do połknięcia, zresztą leczenie przypadowe.

## **Impetigo vide: Eczema faciei impetiginosum.**

## **Influenza.**

W czasie epidemii zapobiegawczo brać po 0·25 chininy. Gdy choroba wybuchnie, środek oczyszczający (Calomel 0·50 pro dosi, dzieciom 0·05—0·10). Dalej leczenie objawów, środki przeciwgorączkowe. Chinina, Antypyryna, szczególnie, gdy bóle głowy zbyt silne. Natr. salicylicum (zwłaszcza dzieciom).

Przeciw nieżyłtom oskrzeli Inf. Ipec. cum Natro et Codeina

Starcom zaraz podać wina i środki wzmacniające.

## **Insolatio.**

Zdjęcie sukien, ochładzanie ciała, tryskanie zimną wodą. Po oduceniu duże ilości kawy, herbaty. Kąpiel. W razie zapadu, sztuczne oddychanie, amoniak do wachania.

## **Intermittens.**

W czasie napadu leżenie w łóżku. Podczas dreszczu, ogrzewanie, wśród gorączki chłodzenie. Przed napadem wiadomym, na 5 godzin chinina.

Częste napady wymagają zmiany miejscowości, unikania surowych owoców.

**526.** *Chinin muriatici* 0·50,

*Dtur. tal. dos. N. V.*

S. Przed napadem proszek.

Przez kilka dni chociażby napad się nie powtórzył, rano i wieczór po proszku.

Jeżeli chory chininę wymiotuje, można ją dać w lewatywie z krochmalem lub:

**527.** *Chinini muriat.* 0·50,  
*Glycerin.*

*Aqu. dest. āā.* 2·00,

(*Disp. sine acido*).

S. Wstrzyknąć pod skórę.

Przy dłuższem trwaniu:

**528.** *Decoct. cort. chinæ*  
*e 10·00 ad 180·00,*

*Sol. arsen. Fowleri* 1·00,

*Syrup Sacchari* 20·00.

MDS. 4 łyżki dziennie.

**529.** *Sol. arsen. Fowleri* 5·00.

*Trae chinæ comp.* 15·00.

S. Rano i wieczór po 5 kropli, postępować co dzień o jedną kroplę, aż do 20-tu.

**530.** *Trae Eucatypti glob.* 15·00.

S. Kilka razy dziennie po 10—20 kropli.

Dzieciom:

*Chinini muriat.* 0·30—0·50.

Jeżeli wymiotują, dać w lewatywie lub czopkach.

**531.** *Chinin muriatici* 0·25,

*Butyri Cacao* 0·50,

*Mf. supposit dtur. tal. N. IV.*

S. Przed napadem na 3 godz. czopek, a/ później, po jednym przez kilka dni.

**532.** *Chinin tannici*

*Sacchari āā.* 2·00,

*Mfp. div. in dos. N. VI.*

DS. 3 proszki dziennie, co godzinę jeden.

**533.** *Chinini muriat.* 0·50,

*Acid. tartar.* 0·30,

*Syrup simpl.* 60·00.

DS. 2 lub 3 łyżeczki w małej ilości czarnej kawy parę razy dziennie.

**534.** *Trae Helianthi* 1·00,

*Aqu. dest.* 5·00.

DS. 3 razy dziennie po 10—20 kropli.

**535.** *Sol. arsen. Pearsoni*

*Trae chinæ āā.* 5·00.

MDS. 3 razy dziennie po 2—3 kropli.

## Intertrigo.

Utrzymywanie czystości skóry i przed zamoczeniem chronić.

Dzieciom tłustym pudrować we fałdach skóry.

**536.** *Acidi Salicyl.* 0·50,

*Alum. plumosi*

*Amyli* āā. 25·00.

Mfp. S. Puder.

**537.** *Kali sozojodolici* 5·00,

*Talei* 50·00.

Mfp. S. Puder.

Zakładać we fałdy skóry płatki posmarowane jedną z poniżej podanych maści. Kąpiele letnie na 26° z dodatkiem otrąb lub *Bolus alba* (50—100)

W przypadkach uporczywych z dodatkiem Sublimatu (0·50).

Na częściach płciowych i odbytnicy pedzłowanie Sublimatem (0·50:100 aquae).

**538.** *Acidi borici* 0·50,

*Lanolin* 50·00,

*Vaselin* 10·00.

Mf. ungu. S. Przed posmarowaniem oczyścić skórę.

**539.** *Acidi salicyl.* 0·20,

*Lanolin* 20·00,

*Mf. Unguentum.*

**540.** *Ichtyoli* 0·30,

*Lanolin* 30·00,

*Mf. Unguentum.*

**541.** *Cocain oleinici* 0·50,

*Lanolin* 18·00,

*Ol. olivar.* 2·00.

Mf. Ungu. S. W razie silnego świądu posmarować.

Przed smarowaniem maści oczyścić skórę z resztek proszków lub maści, maść 2 razy dziennie nakładać.

Do zmywania.

**542.** *Aqu. Plumbi*

*Aqu. boric.* 5<sup>0</sup>/<sub>10</sub> āā. 100·00.

DS. Zewnętrznie.

## Iritis.

Zapalenie tęczówki występuje w następujących formach: Iritis plastica, serosa, suppurativa, gummosa lub forma mieszana z dwóch poprzednich.

Leczenie jest następujące:

1) Zapuszczanie atropinu z początku co 2 godziny, aż osiągnie się maksymalne rozszerzenie źrenicy, a obecne tylne przyczepiny ulegną rozerwaniu.

Przy Iritis plastica, dobrze jest zapuszczać atropin z Cocainą w celu rozerwania synechii, po tem zaś sam atropin, który w dalszym przebiegu choroby 3 razy dziennie zapuszczać należy, a po ustąpieniu choroby jeszcze przez 3 tygodnie raz dziennie.

Iritis serosa wymaga od początku tylko 2 razy dziennie atropinu i badania napięcia ocznego.

2) Ciemny pokój, lekko oczyszczające środki, przebywanie dużo w łóżku, lekkie wieczorne poty.

W razie bólów w nocy, iniekcya morfiny w skroń.

3) Ciepłe okłady wilgotne z mąki siemienia lnianego, robione przez cały dzień, wpływają lecząco na chorobę i kojąco na bóle; wcieranie maści belladonowej w skroń co 2 godziny w razie bólów.

4) Uwzględnienie przyczyny: Syfilis, wcieranie Ungu. cin. systematycznie przeprowadzone. Rheuma, Natr. salicylicum wewnętrznie; diabetes: sól karlsbadzka: przy zółtach: jod.

Jeżeli źrenica mimo energicznego antropinizowania rozszerzyć się nie chce, postawić na skroń 4—5 pijawek. Zarośnięcie źrenicy (occlusio vel seclusio) wymaga wykonania Iridectomii.



**543.** *Atropini sulph.* 0'05,  
*Cocaini muriat.* 0'10,  
*Aqu. dest.* 5'00.  
 MDS. Atropina do oka. Zakraplać.

**544.** *Atropini sulph.* 0'05,  
*Aqu. dest.* 5'00.  
 DS. Atropina do oka.

**545.** *Morphii muriat.* 0'10,  
*Aqu. dest.* 10'00.  
 DS. Morfina 1% do iniekcji podskórnych — do rąk lekarza.

**546.** *Ung. hydrarg. cin.* 15'00,  
*Extr. belladonnae* 2'00.  
 MDS. Maść belladonowa na czoło.

**547.** *Ung. hydrarg. cin.* 30'00,  
*Div. in p. aequ. N. X.*  
 DS. Szara maść do wcierania.

**548.** *Kali chlorici* 10'00,  
*Aqu. dest.* 500'00.  
 DS. Płukanie do ust.

**549.** *Natri salicyl.* 10'00,  
*Aqu. dest.* 200'00.  
 DS. 2 łyżki dziennie.

**550.** *Natri jodati* 8'00,  
*Aqu. dest.* 200'00,  
*D. in v. n.*  
 DS. 2 łyżki dziennie.

**551.** *Farinae sem Lini* 100'00.  
 DS. Mączka do okładów.  
 Dla dzieci:

**552.** *Natr. jodati* 4'00,  
*Aqu. dest.* 200'00,  
*D. in v. n.*  
 DS. 2 łyżeczki dziennie z mlekiem słodkiem.

## Ischias.

Przyczynę wynaleść i takową usunąć.

Jeżeli na tle malaryi, to chinina, arsen; jeżeli skutek zaziębienia: kąpiele ciepłe, łaźnia parowa, leżenie w łóżku, ciepłe utrzymywanie nóg, środki odwodzące, wzdłuż nerwu kulszo-

wego, jak: suche bańki, Tinct. jodi, synapizma, vesiatoria, obok tego massage, prąd elektryczny stały (anoda na miejsce bolesne), rozpylanie eteru przyrządem Richardsona, na wewnętrzny antipiryna. Natr. Salicylicum, phenacetyne, antifebryne, salol, betol, kali jodatum w dawkach kilkagramowych dziennie.

W razie silnych bólów iniekcye morfiny. Można też wstrzykiwać:

**553.** *Acid. hyperosmici* 0'10,  
*Aqu. dest.* 10'00.  
 S.  $\frac{1}{4}$  strzykawki Prawatza.

Jeżeli neuralgia się zmniejsza i chorego można wysłać do kąpiel to: Swośzowice, Krzeszowice, Lubień, Cieplice czeskie, Trenčyn, Piszczany, Busk. kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa),

W przypadkach ciężkich ucieć się można do naciągania nerwu.

**554.** *Antipyrin.*  
*Chinini muriat.* āā. 0'50.  
 S. 3 proszki dziennie.

**555.** *Euphorin* 0'40,  
*Dtur. tal. dos.* 20.  
 S. 2—3 razy dziennie.

**556.** *Betoli* 3'00—5'00,  
*Sacchari* 3'00,  
*Mfp. div. in dos. N. X.*  
 S. 4 proszki dziennie.

**557.** *Salol* 0'50—1'00,  
*Sacchari* 0'25,  
*Dtr. in capsul. amylac.*  
 S. 3 proszki dziennie.

**558.** *Antinervin* 0'20—0'30.  
 Kilka razy dziennie.

*Exalgin* 0'30—0'40 pro dosi.  
*Methylen. coerul.* 0'02—0'03  
 pro dosi.

## Kephalhaematoma.

Pokryciem z waty chronić guz od urazów. Nie robić nacięć, tylko w razie ropienia.

## Keratitis.

1) Zapalenie rogówki ropne (Keratitis suppurativa).

W lżejszych przypadkach leczenie ambulatoryjne: Przepłukiwanie raz dziennie worka spojówkowego rozezynem sublimatu 1:5000·00 zasypanie drobno-miażdżonego jodoformu i założenie opaski. Procedurę tę powtarzać co dzień, aż do zupełnego wyleczenia.

W cięższych przypadkach przepłukiwania sublimatem co 2 godziny, jodoform, atropin 1% kilka razy dziennie i ciepłe wilgotne okłady z siemienia lnianego (zob. Iritis) na noc opaska, ciemny pokój i łóżko.

Skoro powyższe leczenie zawodzi, wypalenie części rogówki naciekłych ropą, a więc żółtawo zabarwionych, galvano- lub termokauterem, lub też keratotomia Saemisch obok powyższego leczenia. Po wyleczeniu należy dłuższy czas jeszcze nosić opaskę.

W razie obecności ciała obcego w rogówce, wydobycie tegoż bezzwłoczne.

2) Zapalenie rogówki miąższowe (Keratitis parenchymatosa diffusa).

W okresie 1-szym progressy (zaćmienia zwiększają się, nacierkanie rzaskowe, powierzchnia rogówki jakby drobno pokłuta, światłowstret i łzawienie) nie można używać środków drażniących i jedynie ciemne, dymne okulary litera C., zapuszczanie atropinu 3 razy dziennie (zob. Iritis), zasypywanie bardzo małej ilości jodoformu raz dziennie. Zakazać pracy oczyma, ograniczenie ilości światła, jednak nie zamykanie w ciemnym pokoju. Jod wewnętrznie lub w razie nabytej kiły wciieranie Ungu. ciner. à 3·00 (zob. Iritis)

są wskazane, a przy tem jak najlepsze łatwo strawne a niepodniecające odżywianie.

W okresie 2-gim (objawy drażnienia i zaczerwienienia oka zupełnie ustąpiły, zaćmienie rogówki od obwodu zaczyna ustępować, rogówka na powierzchni gładka) przejść na leży do środków lekko drażniących, raz dziennie zaczynając od Calomelu i zmieniając co jakiś czas (zob. Maculae corneae).

3) Keratitis phlyctenulosa (zob. Conjunct. phlyctenulosa).

Zapalenie rogówki występujące, jako następstwo cierpienia spojówek (Trachoma. Phlycteny, Ulcus corneae catarrhalis, Blepharorrhoea) wymagają głównie przyczynowego leczenia i są w odnośnych rozdziałach uwzględnione.

## Laryngitis acuta.

Pobyt w dobrze przewietrzanym mieszkaniu, najmniej mówić, co 6 godzin okład wysychający. Środki napotne (herbata lipowa, lemoniada). Woda Szezwinnicka, Giesshübler, Selterska z mlekiem. W celu zmniejszenia kaszlu narcotica. W razie silniejszego zapalenia środki przeczyszczające, okłady lodowe, pigułki z lodu, synapizma naszyje.

559. *Det. alth. e 10·00 ad 200·00,*

*Morphii mur. 0·05,*

*Syrup Sacchari 20·00.*

DS. Co 2 godz. łyżkę.

560. *Natri benzoic. 15·00,*

*Syrup terebinth. 50·00,*

*Syrup toltan. 15·00.*

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

561. *Sal. ammoniaci 5·00,*

*Aqu. dest. 500·00.*

S. Do inhalacyi.

562. *Natri borici 10·00,*

*Aqu. dest. 500·00.*

S. Do inhalacyi.

**563. Natri bicarb.***Natr. chlorat. āā. 5'00,**Aqu. dest. 500'00.*

S. Do inhalacyi.

**564. Aqu. lauroc. 5'00,***Spir. vini rectif. 50'00—100'00.*

S. Łyżeczkę do inhalacyi.

**565. Acid. carbol. 0'50—1'00,***Cocain hydrochl. 0'25,**Glycerin 50'00,**Aq. 450'00.*

S. Do inhalacyi 3 razy dzien.

U dzieci zob. Pseudocroup.

**Laryngitis chronica.**

Wzbronić nadużywania głosu, wychodzenia wśród niepogody, palenia tytoniu, używania napojów wysokowych. Polecieć w razie zółzów kąpiele słone (w domu), pobyt w okolicach górzystych i lesistych, zwłaszcza gruzliczym, a również picie mleka, żentyey, kefiru.

Otyłym zalecieć picie wody Karlsbadzkiej, Maryenbadzkiej.

W razie podrażnienia do kaszlu, duszności: narcotica.

**566. Ammon. muriat.***Succi liquir āā. 5'00,**Aqu. dest. 120'00,**Morph. mur. 0'03.*

S. Co 2 godz. łyżkę.

**567. Zinci sulphur. 1'00,***Aqu. dest. 500'00.*

S. Inhalatio.

**568. Alumin crudi 5'00,***Aqu. dest. 500'00.*

S. Inhalatio.

**569. Tannin. 3'00—5'00,***Spir. vini rectif. 50'00,**Aqu. dest. 500'00.*

S. Inhalatio.

**570. Ol. Juniperi***Ol. Terebinth. āā. 10'00.*

S. Po 10—20 kropli do inhalacyi.

**571. Ol. pini pumilion.***Ol. juniperi āā. 10'00.*

S. Po 10—20 kropli do wziewaia.

Do wdmuchiwania:

*Alum. crud.**Tannin. pur.*

Pędzlowania:

**572. Argent. nitr. 1'00—5'00,***Aqu. dest. 50'00.*

S. Do Pędzlowania.

**573. Zinci sulphur. 2'00,***Aqu. dest. 20'00.*

S. Do pędzlowań.

**574. Jodi puri 0'50,***Kali jod. 1'00,**Glycerin 50'00.*

S. Do pędzlowań.

**Laryngitis crouposa.**

W początku niezytu, czem się dławiec rozpoczyna, dać dziecko do łóżka i stosować środki wykrztuśne, w połączeniu z Kali chloricum, Kali carbonicum. W celu zachowania sił dziecka dać pożywną dyetę — skrobane mięso, jaja, winną polewkę, mleko z herbata, cognakiem.

Nieużywać ani upustu krwi, ani pijawek, pryszczydeł, ani środków wymiotnych! Lekkie środki przeczyszczające.

Aby zapobiedz wytwarzaniu się błon, zimne okłady na szyję, połykanie lodu lub lodów. Inhalacye z aparatu Siegla, już to z wody wapiennej, już to z podanych niżej środków, z początku ce 3 godziny.

Obok tego improwizowana parówka t. j. okrywa się pewną małą przestroną pokoju prześcieradłami szczelnie. W takiej budce trzyma ktoś dziecko, aby wdychało parę, zrobioną przez puszczenie rozpalonego żelaza do wody w naczyniu na podłodze stojącym — powtórzyć parę razy dziennie.



W celu pobudzania do rychlejszego odrywania się błon, robi się wecierania z szaruchy 3 razy dziennie, a to można połączyć z mięsieniem krtani. Podawać obficie napoje. Inhalacye częste, w pokoju utrzymywać dużo pary.

W razie silnej gorączki chinina, po 0·20—0·30 już to w proszkach, w roztworze do wewnątrz, już to w lewatywie, dawszy poprzednio lewatywę odczyszczającą. Gdy występują objawy ścieśnienia krtani, (stenosis) przyczem i błony zaczynają się odrywać, dawać środki wykrztuśne.

W razie upadku sił: wino, cognac, czarna kawa z rumem, kamfora. Jeżeli przy wdychu i wydechu słychać rżenia z odrywających się błon, wtenczas można dać środek wymiotny.

Gdy się jednak ścieśnienie krtani wzmacnia, występuje zapadanie dołków nadobojczykowych, zaciąganie się dołka podsercowego, bezgłos i napady duszności — nie zwlekać z wykonaniem Tracheotomii lub intubacji.

**575.** *Inf. ipecac. e 0·20 ad 80·00,*  
*Kali chlorici 1·00,*  
*Syrup rubid. 20·00.*

MDS. Co godz. łyżeczkę.

**576.** *Ungu. hydrgr. ciner.*  
*Lanolin āā. 6·00,*  
*Mfung. div. in dos. N. VI.*

S. 3 razy dnia po jednej sztuce wetrzeć w szyję.

**577.** *Ammon. muriatici 1·00,*  
*Aqu. dest. 200·00.*

DS. Do inhalacji.

**578.** *Acidi lactici 2·00,*  
*Aqu. dest. 300·00.*

DS. Do inhalacji.

**579.** *Sublim. corrosivi 0·05,*  
*Aqu. dest. 300·00.*

DS. Do inhalacji.

Używa się również do inhalacji:

*Kali chlorici 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, Acid. borici 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, Resorcini 1<sup>0</sup>/<sub>0</sub>.*

**580.** *Infus. ipecac. e 0·20 ad 100·00,*

*Pilocarp. muriat. 0·01,*

*Syr. Rubi idaei 15·00.*

MDS. Co pół godz. łyżeczkę.

**581.** *Inf. Senegae e 3·00 ad 80·00,*

*Liquor amon. anisati 1·00,*

*Syrup simpl. 15·00.*

MDS. Co godz. łyżeczkę.

**582.** *Inf. ipecac.*

*e. 1·00 ad 50·00,*

*Tart. emetic. 0·05,*

*Syrup rubid. 10·00.*

MDS. Co 5 minut łyżeczkę aż do wymiot.

Radzą też w razie duszności, gdy niemożna robić tracheotomii:

**583.** *Aether sulphur. 3·00,*  
*Aether acetic. 1·00,*  
*Menthol 0·10.*

Co kwadrans kilka kropli na wacie trzymać przed ustami, jak przy chloroformowaniu.

## Leukaemia.

Przyczyna niewiadoma. Leczenie prawie zawsze bez skutku.

Podawać należy chininę z żelazem, lub dodatkiem arszeniku. Po dłuższym użyciu zmienić na ol. eucalyptusowy i piperynę, lub polecić pić wodę Gubera, Levico lub Roncigno. — Krynica, Żegiestów.

Próbowano robić wstrzykiwania do mięszu śledziony:

Ergotyny 0·50—1·0, lub Sol. arsen. Fowleri. Żyć chorego forsownie, pobyt na świeżem powietrzu, mierny ruch, zresztą leczenie symptomatyczne.

- 584.** *Piperini* 5'00,  
*Ol. eucalypti e foliis rec.*  
 10'00,  
*Chinin muriat.* 4'00,  
*Extr. et pulv. liquir q. s. ut*  
*f. pil. N. 100.*  
 S. 4—8 pigułek dziennie.  
*Trac eucalypti* 50'00.  
 DS. 2—3 łyżeczki na dzień.

## Lichen scrophulosorum.

Poprawienie odżywienia, po-  
 byt na świeżem powietrzu, suche  
 mieszkanie, wewnętrznje tran.

- 585.** *Jodi puri* 0'10,  
*Olei jecoris aselli* 150'00.  
 MDS Rano i wieczór łyżkę.

W celu szybszego usunięcia  
 wysypki, naciera się skórę 2—3  
 razy dziennie tranem i układa  
 się pacyenta między kocami weł-  
 nianami.

## Lichen ruber.

Jedynym środkiem usuwają-  
 cym tę chorobę jest arszenik,  
 który należy podawać przez 6—  
 9 miesięcy, by zapobiedz na-  
 wrotowi choroby.

- 586.** *Pillularum arsenic. asiati-*  
*carum Hebrae* N. 100.

DS. Z początku 3 pigułki  
 dziennie, co 4-ty dzień pod-  
 wyższa się dawkę dzienną  
 o jedną pigułkę, dochodząc  
 do 8 nawet do 10 dziennie,  
 trzymamy się tej ilości do-  
 tąd, dopóki sprawa w zna-  
 czniejszej części nie ustąpi,  
 następnie schodzi się do 6  
 pigułek dziennie, które się  
 przez 3—4 miesiące używa.

Szybciej działają, lecz od re-  
 cedywy nie zabezpieczają:

- 587.** *Solut. arsen. Fowleri* 4'00,  
*Aqu. dest.* 20'00,  
*Acid. carbolic* 0'40.

DS. Co 2-gi dzień wstrzyknąć  
 całą strzykawkę Prawaza —

Unna podaje maść, którą się  
 2 razy dziennie wciera:

- 588.** *Sublimati corrosivi* 0'10,  
*Acid. carbol.* 2'00,  
*Unguenti Hebrae* 50'00.  
 Mf. ungu. S. Maść.

W razie swędzenia używa się  
 kąpieeli siarczanych, sodowych  
 i naciera się skórę płynem:

- 589.** *Acid. salicyl.* 2'00.  
*Spirit. vini gallici* 100'00,  
*Glycerini* 6'00.

Następnie posypuje się pudrem.

W razie bezskuteczności ar-  
 szeniku podają na wewnątrz tar-  
 tras antimon. 0'008 pro dosi,  
 z początku 5 razy dz., później  
 4 razy dz. Zewnętrznie hydro-  
 terapia.

## Lupus vulgaris.

Dopóki lupus występuje w for-  
 mie plam lub guzków odoso-  
 bnionych wystarcza wypalenie  
 c. nitrate argenti in substantia,  
 guziczek przebija się aż do tkan-  
 ki łącznej zdrowej.

Jeżeli już są wystające rozle-  
 głejsze nacieki: wyłyżeczkowa-  
 nie i wypalenie Pacquelinem,  
 lub gdy naciek bardzo znaczny,  
 przykładą się przez 8—10 dni  
 maść pyrogallusową 10% tak,  
 by maść dniem i nocą stykała  
 się z naciekiem, lub używa się  
 emplastrum hydrargyri, okłady  
 z gazy jodoformowej tranem na-  
 pojonej co 2-gi dzień naprze-  
 mian z opatrunkiem jodoform-  
 owym.

## Lupus erythematosus.

Poprawienie odżywienia (tran,  
 żelazo, arszenik).

Miejscowo: zmywanie codzien-  
 ne c. spiritu saponato kalino, na  
 noc emplastrum hydrargyri.

## Lymphangioitis.

Usunięcie przyczyny (otwarcie  
 ropnia, oczyszczenie rany pier-

wotnej, zdjęcie strupa, pod którym się ropa zatrzymuje i t. p.). Na część zajętą chorobą, okłady wysychające z octanu glinowego. Dyeta pożywna, wyskok w znaczniejszej ilości.

**590.** *Alum. crud.* 40'00,  
*Plumb. acet.* 70'00,  
*Aqu. dest.* 600'00.  
*Filtra!*

S. Do okładów.

## Lymphoma.

W pierwszym rzędzie leczenie przyczynowe (scrophulosis, pseudoleukaemia i t. p.)

Na wewnątrz z początku wypada stosować maść jodową, a w razie nieskuteczności tejże, zwłaszcza jeżeli gruczoły okazują dążność do ropienia, najlepiej takowe wyluszczyć lub wyskrobać ostrą łyżką. W przypadkach t. zw. lymphoma malignum najskuteczniejszym jest leczenie zapomocą przetworów arsenu.

Na wewnątrz należy podawać *Sol. arsen. Fovleri* lub wody arsen zawierające, (woda Gubera, Roncagno, Levico), do miąższu zaś gruczołów wstrzykiwać codziennie po kilka kropli *Sol. arsen. Fovleri*. W niektórych przypadkach, w których arsen zawodzi, działają bardzo dobrze wstrzykiwania kwasu nadosmowego.

**591.** *Sol. ars. Fovleri*  
*Trae ferr. pom. aa.* 10'00.

S. Codziennie przed obiadem od 2 kropli począwszy o 2 krople wzmacniać dawkę aż do 50, a potem znów o 2 krople codziennie zmniejszać.

**592.** *Sol. ars. Fovleri* 10'00.  
S. Do wstrzykiwań.

**593.** *Ac. hyperosmic.* 0'10,  
*Aqu. dest.* 10'00,  
*D. in vitro nigro.*  
S. Do wstrzykiwań.

**594.** *Jodol* 5'00,  
*Vaselin* 50'00.  
Mf. ungu. S. Maść.

## Lyssa.

Rany nie wysysać! Wyciąć okolice miejsca ukąszonego, przysięgać rozpalonem żelazem lub kali caustic., lub acid. carbol. pur., oraz dobrze opatrzyć. Gdy wściekizna wybuchnie, można próbować wstrzyknięcia Curary.

**595.** *Curare* 0'20,  
*Aqu. dest.* 5'00,  
*Acid. mur. gttam.*

MDS. Na 5 wstrzyknięć.

Chloral, morfina podskórnio użyta, chlороformowanie służy do uspokojenia.

## Maculae corneae.

Plamki rogówkowe są to większe lub mniejsze zaćmienia po przebytem zapaleniu.

W celu wyjaśnienia stosować środki lekko drażniące (raz na dzień) zaczynając od kalomelu i zmieniać je co kilkanaście dni.

**596.** *Calomelanos v. h. p. et subtiliss. pulv.* 10'00.

DS. Proszek oczny, pędzelek

**597.** *Praecip. flavi vel albi* 0'20,  
*Vasel. fl.* 4'00,

DS. Maść. Wprowadzić pędzelkiem za powieki i lekko masować przez powieki palcem.

**598.** *Trae Opii crocati* 5'00.  
DS. Kropla oczna, zakraplacz.

**599.** *Ol. therebint. rectific.*  
*Glycerini aa.* 5'00.

MDS. Krople oczne (środek Dondersa).

**600.** *Ung. hydrarg. cin.* 1'00,  
*Vaselin. flav.* 2'00,  
*Lanolin* 1'00.

S. Jak maść 597.

## Malleus.

Zmianę pierwotną wycina się i wypala kwasem azotowym,



przy nacieku miękkim stosuje się szaruchę i okłady ciepłe z płynu Burowa, jeżeli naciek zbity, robi się głębokie nacięcia. Na wewnątrz sporo ilości alkoholu, chinina.

## Mania.

Odosobnienie chorego, zabezpieczenie chorego i otoczenie. Dyeta pożywna mięsna.

Tylko w razie silnego podrażnienia mózgu (zrywań, zgrzytania zębami, przy zwięzieniu żrenic) można stawiać pijawki i podać środki przeczyszczające. Kąpiel, lodowe okłady. Jeżeli przeważa podrażnienie płciowe Kali bromatum 4—10·0. Jeżeli mania skutkiem opilstwa: morfiną, opium.

Przy objawach anaemii mózgu wino, piwo, chloral.

## Mastitis.

Uniesienie piersi za pomocą chustki lub bandażu, okłady z liquor alum. acetici, wcierać masę belladonową.

### 601. Solutio Burowi 500·00.

DS. Do okładów.

*Extr. bellad.* 2·00,

*Lanolin* 30·00.

Mfn. S. Zewnętrznie.

Nadto dyeta skąpa, unikanie napojów wysokowych, środki przeczyszczające ol. ricini, woda gorzka, Victoria, Hunyadi Janos.

### 602. Magnesiae sulph. 35·00,

*Aqu. dest.* 120·00,

*Syr. simpl.* 15·00.

DS. Co 2 godz, 2 łyżki, do skutku.

### 603. Acidi tartar. 10·00,

*Syr. rubi Id.* 70·00.

S. Kwasek do wody do napoju.

Jeżeli sprawa nie ustępuje, bolesność i zaczerwienienie wzrasta, okłady z gorącej wody, kaptazmy. Skoro chęłbotanie mo-

żna wykazać przeciąć wcześniej i założyć opatrunek aseptyczny.

## Melancholia.

Największy spokój, położyć chorego do łóżka.

Czuwać, aby chory sobie lub otoczeniu szkody nie zrobił. Dyeta pożywna, w razie potrzeby sztuczne karmienie. Środki nasenne, opium, sulfonal, letnia kąpiel 26—28 R.

### 604. Sulfonal 1·00,

*Dtur. tal. dos. N. V.*

S. Na noc proszek w gorącym mleku lub rosole.

## Mastodynia.

Podwiązanie gruczołu, obłożyszypoprzednio watą. Wstrzykiwanie morfiny w okolicę bolesną.

### 605. Chloroformii 5·00,

*Ol. camphorati* 15·00,

*Mf. liniment.*

DS. Do wcierania.

## Meningitis cerebro-spinalis epidem.

Leczenie objawów. Rozpocząć podaniem Calomelu, w dużych dawkach. Łód na głowę i na kark; pijawki, bańki wzdłuż kręgosłupa. Wcieranie szaruchy. Wstrzykiwanie morfiny, chloral i natrum bromatum. Natrum jodatum (1—2 gramów dziennie). Przeciw gorączce: Antipiryna, wobec obrzęku stawów acid. Salicyl.

Przeciw wymiotom pigułki lodowe, Cocain. muriatic. (1:10, po 5 kropli).

## Meningitis simplex.

Zimne okłady na głowę, wcieranie szaruchy (2·00—4·00) w tyłogłowie i kark. Do wewnątrz Calomel (0·01—0·03 co godzinę), pryszczydła — starszym dzieciom i silnym można postawić

pijawki. W razie drgawek chlorał w lewatywach. Przeciw wymiotom pigułki lodowe. Po uspokojeniu unikać gwaru, rażącego światła; dyeta z początku ścisła, później pożywna.

Przetwory jodowe, Natrum jodatum 1% co 2 godz. łyżeczkę, wcieranie 10% maści jodoform.

## Meningitis tuberculosa.

Jeżeli dzieci chudną, gruczoły obrzmiewają dawać chinin z żelazem i wcierać jod w gruczoły. Gdy choroba wybuchnie, leczenie według objawów. W pierwszych chwilach przeciw podrażnieniu mózgu natr. bromat. (1—2 grm. pro die) zimne okłady na głowę. Pokój zaciemnić. Lewatywy i środki przeczyszczające. Pokarmy dawać często w małych ilościach. Baczość na oddawanie moczu.

**606.** *Calomelanos* 0·30—0·50,  
*Sacchari* 2·00,  
*Mfp. div. in dos. N. 10.*  
DS. Co 2 godz. proszek.

**607.** *Kali v. Natr. jodat.* 1·00—2·00,  
*Aqu. dest.* 100·00,  
*Syrup Sacchari* 20·00.  
MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

**608.** *Natri bromati* 1·00—2·00,  
*Aqu. dest.* 100·00,  
*Syrup Sacch.* 20·00.  
MDS. Co 2 godz. 2 łyżeczki.

W razie wielkiego rozdrażnienia lub drgawek:

**609.** *Chloralkydrat.* 1·00,  
*Natri bromat.* 1·00,  
*Aqu. dest.* 80·00,  
*Syrup rubid.* 20·00.  
MDS. Co godz. łyżeczkę.

**610.** *Urethani* 1·50,  
*Natri brom.* 0·50,  
*Aqu. dest.* 100·00,  
*Syrup simpl.* 15·00.  
MDS. Co godzinę łyżeczkę.

**611.** *Jodoformii* 2·00,  
*Lanolin*  
*Vaselin āā.* 10·00.

Mf. ungu. DS. Wcierać na tyłogłowie.

Po obcięciu włosów przy skórze posmarowawszy przykryć cienką ceratką.

## Metritis.

W przypadkach ostrego zapalenia macicy: spokojne leżenie w łóżku, u osób silnych kilka pijawek na okolicę podbrzusza, zimne okłady, worek lodowy. Scarificatio części pochwowej macicy.

Środki solne wypróżniające. W razie boleści maść:

**612.** *Extr. bellad.* 2·00,  
*Vasellini flavi* 3·00.  
M. ungu. DS. Zewnętrznie.

**613.** *Extr. opii aquosi* 0·10,  
*But. Cacao q. s. ut f. l. artis suppositoria ad anum N. V.*  
DS. Co 3—4 godz. czopek.

Po ustaniu bólów, okłady wysychające na brzuch zamiast lodu.

W przypadkach przewlekłego zapalenia: unikanie pracy fizycznej nateżającej, gwałtownego spółkowania, uregulowanie stolca (środki solne, Cascara Sagrada, Hunyadi Janos).

U niedokrewnych podawanie żelaza. Jeżeli równocześnie miesiączkowanie zbyt obfite:

**614.** *Extr. Hydrastis Canad. fabricationis Parke et Davis*  
40·00.

*D. in l. guttatoria.*  
S. 3 razy dnia po 20 kropel.

Leczenie miejscowe: pomazywanie części pochwowej we wzierniku co 2—3 dni cum Trajodi, albo Ichthyolem. Tampony w przypadkach świeżych.

**615.** *Ammon. sulpho ichthyol.*  
5'00,

*Glycerini* 200'00.

DS. Do tamponów lub

**616.** *Kali jodati* 5'00,

*Glycerini* 100'00,

*D. in v. nigro.*

S. Do tamponów.

Nakłuwanie co kilka dni części pochwowej we wzzierniku, massage.

W przypadkach zastarzałych amputatio portionis vaginalis.

Nadto w porze letniej, w przypadkach świeżych, gdy powiększenie macicy znaczne, leczenie kąpielowo zdrojowe: Iwonicz, Rabka, Ciechocinek, Rymanów. W późniejszych okresach: Krynica, kąpiele morskie. Kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa).

## Metrorrhagia.

Dokładne wykazanie przyczyny krwotoku.

W przypadkach krwotoku poporodowego z macicy, jeżeli przyczyną złe kureczenie się tejże: nacieranie dna macicy przez powłoki brzuszne ręką, okłady zimne na brzuch, Sécale cornutum przez usta, w lewatywie lub podskórnie. Wstrzykiwania gorące na 40°. Uciskanie macicy dwuręczne. W ostatnich czasach Dürssen tamponuje macicę gazą jodoformową.

Jeżeli przyczyną są pozostałe części łożyska, błon, skrzepy: usunięcie dokładne tychże.

Gdy macica dobrze skurczona i nie zawiera, a krwotok trwa, domyślać się należy przyczyny krwotoku w pęknięciu ujścia zewnętrzznego macicy, lub na innym miejscu. Założyć wzziernik i tamować krwotok miejscowo przez podwiązanie, ucisk, tamponadę, zeszytanie pęknięcia.

Gdy to nie pomaga wytampować pochwę zapomocą Penawar-Djambi w gazie jodoformowej i jeżeli przyczyną — nowotwory macicy — usunięcie tychże sposobem operacyjnym. Na razie podczas krwotoku tamponada pochwy po przestrzyknięciu tejże roztworem środka przeciwniegnilnego j. n. p. 2% roztwór kw. karbol.; 1 : 2000—3000 roztwór sublimatu i t. d. Do tamponowania najlepiej użyć kulek waty oczyszczonej zamoczonej w glicerynie, pierwsze kulki owinąć gazą jodoformową.

W przypadkach gwałtownych wstrzyknięcie do jamy macicy roztworu Liquor ferri sesquichlor. strzykawką Madurowicza lub Brauna, przyczem warunek konieczny, aby kanał macicy był dostatecznie drożny, aby roztwór mógł przez szyję macicy do pochwy spływać. (Postępowanie obosiecznie ze względu na możebność dostania się roztworu do jamy brzucha).

Równocześnie zwalczanie powstającej ostrej niedokrewności: ułożenie spokojne, poziome, ciepłe okłady na głowę, chłodne napoje, wino, kawa czarna, cognac, rum, Tinct. cinam, Tra ferri acet. aeth. Wstrzykiwania podskórne eteru, ol. camphoratum, wstrzykiwania podskórne większych ilości roztworu soli kuchennej 0'5 : 1000; lewatywy z tegoż roztworu.

Bandaże na kończyny, ucisk na tętnicę główną przez powłoki brzuszne.

## Migraena.

Uwzględnić: ogólne osłabienie, choroby nerwów, chor. narządów trawienia, zbroczenia płciowe. W czasie napadu spokój. Masowanie czoła i skroni (można użyć maści z mentholem lub co-



caina). Smarowanie przecikiem z mentholu.

**617.** *Chinin. muriat.* 0·25,  
*Coffeini natro salic.* 0·10,  
*Sacchari* 0·20,  
*Mfp. dtur. tal. dos. N.* 10.

DS. W czasie napadu co godzinę proszek (użyć 2 lub 3).

**618.** *Antipyrin* 0·50,  
*Dtur. tal. dos. N.* 10.  
DS. Jak wyżej.

**619.** *Phenacetin* 0·50,  
*Chinin.* 0·20,  
*Mfp. dtur. tal. dos. N.* 10.  
S. Jak wyżej.

**620.** *Natri Salicyl.* 0·50,  
*Dtur. tal. dos. N.* 10.  
DS. Jak wyżej.

**621.** *Euphorin* 4·00,  
*Div. in dos. N.* 10.  
S. 3 proszki dziennie.

**622.** *Coffeini citrici* 1·00,  
*Phenacetin* 2·00,  
*Sacchari* 1·00,  
*Mfp. div. in dos. N.* 10.  
DS. Co 2 godziny proszek.

Podskórne zastrzyknięcie Ergotyny (Bombellon) 0·25. Chlorałhydrat 1—2 gram. w lewatywie.

Do dalszego leczenia można użyć:

**623.** *Chinin. muriat.* 5·00,  
*Pulv. fol. digital.* 1·50,  
*Extr. gent. et pulv. q. s.*  
*f. pil. N.* 30.  
DS. Na noc pigułkę.

**624.** *Solut. arsen. Fowleri* 5·00,  
*Trae ferri pomat.* 10·00.  
MDS. Rano i wieczór po 5 do 10 kropli.  
Woda arsenikalna Gubera.

**625.** *Ammon. bromati* 1·00,  
*Kali bromati*  
*Natri bromati aa.* 2·00,  
*Aqu. dest.* 180·00,  
*Syr. aurant.* 20·00.  
MDS. 3 razy dziennie łyżkę.

## Morbilli. Odra, Kur.

Niemowleta i chorowite dzieci oddzielić. Jeżeli przebieg prawdziwy nie trzeba uciekać się do lekarstw. Pokój ostrożnie przewietrzać, ciepłota od 15—16° R. okrycie średnio ciepłe, lekkie przysłonięcie okien, jeżeli jest światłowstręt.

Dyeta w czasie gorączki ścisła, po jej przebyciu pożywna, za napój lekkie kwaski, lub wody (szczawowy alkaliczne). Dopóki trwa łuszczenie nie wypuszczać dzieci z łóżka, a mniej więcej 8—14 dni nie wypuszczać z pokoju, zwłaszcza, gdy są objawy niezytu.

Przeciw niezytowi spojówek wystarczają przemywania 20/10 kw. borowego. Silny świąd uspakaja się nacieraniem tłuszczami. Silny kaszel wymaga podania naparu ipecac. ze środkami narкотycznymi, wzięwania pary wodnej, napoje ciepłe, odwar ślazu i t. p. W razie biegunki dyeta i opium.

Wysokie gorączki i majaczenia, uśmierzać zimnemi okładami na głowę. Chinina — antipyrina, Natr. salicylicum.

Wśród upadku sił, stygnięcia kończyn: wino, cognac, camphora, Acid. benzoicum.

Przeciw drgawkom: Chloral w lewatywach (0·50:50) kali bromatum (2:100) co godzinę łyżeczkę.

Jeżeli gorączka przewleka się ponad 4 dni, zwrócić uwagę na przelyk, uszy i nerki.

Powikłania: błonica, dławiec, niezyt oskrzeli, zapalenie płuc, leczyć według wskazań odpowiednio podanych.

**626.** *Codeini phosphor.* 0·02,  
*Linctus gummosi* 50·00,  
*Syrup Altheae* 30·00.  
MDS. Co 2 godziny łyżeczkę w razie silnego kaszlu.

**627.** *Extr. hyoscyami 0.15,*

*Aqu. dest. 70.00,*

*Syr. simpl. 10.00.*

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

**628.** *Infus. ipecac. e 0.20 ad*  
100.00,

*Tinct. laudani gtts. duas.*

*Liquor ammon. anisat. 1.00,*

*Syrup althae 20.00.*

MDS. Co godzinę łyżeczkę.

## Morbus Basedowi.

Regularne, higieniczne życie, unikanie zmęczenia fizycznego i umysłowego, wstrzymanie się od nadużywania a nawet od picia alkoholików, herbaty, kawy, nadmiernego palenia. Pobyt na świeżem powietrzu, zwłaszcza w górach lub nad morzem.

Na okolicę serca okład zimny lub lód, zwłaszcza podczas silniejszej akcyi serca, oraz digitalis lub strophantus w miernych dawkach.

U chorych osłabionych, anemicznych: żelazo, chinina, arsen, procedury wodolecznicze, obok systematycznego stosowania prądu galwanicznego na sympatię (ganglion supremum i processus mastoidei).

Przetwory białkowe i nervina, woda Gubera, Levico, Roncegno, Żegiestów, Krynica, Elster, Francensbad, obok należytego odżywiania i psychicznego spokoju.

## Morbus Brighti.

Jeżeli mamy do czynienia z ostrym Morb. Brighti, to chory powinien bezwarunkowo leżeć w łóżku, w jednostajnej ciepłej temperaturze. Dyeta złożona z mleka, kleików, rosółów, lekkich zup, trochę kaszki, lub ryżu w mleku. Do picia woda selterska, bilińska, gieshübel-ska, ubogim zaś zwykłą wodę z dodatkiem cytryny lub kwasu, uważać przytem by stolce były regularne.

Na okolicę nerek stawiać bańki suche, nawet cięte lub pi-jawki, jeżeli moczu bardzo krwa- wy i zawiera wiele białka.

Jeżeli opuchliny są znaczne, to polecić kąpiele gorące zaczyna-jąc od 28° R. do 30° i 32° R. po 15—45 minut, ze zlewania- mi na głowę, następnie za- wija się chorego w koce na 1—2 godzin, żeby się dobrze pocił. Jeżeli chory czuje się w kąpielu bardzo osłabionym, dać można kieliszek wina. Albo też urzą- dza się choremu w łóżku sztuczną parówkę za pomocą przy- rzędu opalanego spirytusem. O- bok tego można dawać mierne dawki cardiaców, jak digitalis, strophantus lub coffein dla po- łączenia działania napotnego z moczopędnem. Wstrzykuje się też pilocarpinę po 0.01—0.02 na dawkę, uważając jednak czy nie nastąpi zapad. Obok napotnych i moczopędnych polecają silno środki przeczyszczające jak co- locynth, Jalapa, gumi gutti, Rheum, nawet pig. Morisona.

W razie przypadków moczni- cowych, kąpiel gorąca ze zle- waniem zimnem, silny laxans, podskórnie eter lub kamfora, al- bo też do lewatywy Hydras chlo- rali 2—3 gramów lub Acid. ben- zoicum po 0.2 co 2—3 godziny. Zob. Uraemia.

Jeżeli okres przewlekły, chory nie koniecznie ma leżeć w łóż- ku, zwłaszcza jeżeli opuchliny nieznaczne.

Dyeta przeważnie mleczna, 2—4 litry mleka, jaja, mięsa mniej, jarzyny, żadnych alko- holików i korzeni.

Do picia wody: Bilińska. Giess- hübel lub woda z kwaskami. Unikać zmęczenia fizycznego, odziewać się ciepło, nie nara- żać się na niepogodę i zmiany temperatury.

Choremu należy polecić mierne dawki tanniny lub Plumb acet, Ferr. sesquichloratum obok ciepłych kąpielei, mniej energicznie stosowanych jak w okresie ostrym i zawiązania w koce. Nadto podawać diuretica: Coffein 1·0—1·50 p. die, theobrominum salicyl. w tych samych dawkach, digitalis, adon. vernalis z dodatkiem Liqu. kali acet. 15—20 na 200. W razie zaparcia stolca, środki przeczyszczające.

*Diuretini 5·00,*

*Aq. dest. 100·00,*

*Syr. aurant. 15·00.*

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

**629.** *Strontii lactici 50·00,*

*Aqu. dest. 250·00.*

MDS. 2 łyżki dziennie.

## Morbus maculosus Verlhofii.

Lekka pożywna dyeta, spokój w łóżku, kwaśne napoje (kawa, herbata wzbronione). (Leczenie krwotoków zob. Epistaxis, Haematemesis).

**630.** *Det. Chinae reg. e 10·90*  
*ad 180·00,*

*Acid. sulphur. dil. 3·00,*

*Syrup s. 20·00.*

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

**631.** *Extr. secal. corn. 1·00,*

*Aqu. dest. 100·00,*

*Syr. sacch. 20·00.*

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

## Morphinismus.

Najlepszą metodą, powolne odzwyczajanie, z początku do połowy lub trzeciej części, później w przeciągu 10—20 dni zejść do 0 morfiny, w końcu wstrzykiwać Aq. destil., dając natomiast cokolwiek morfiny do wewnątrz, lub małe wstrzyknięcia Codein hydrobl. lub extr. opii aqu.

Dobre żywienie, mleko z cognakiem, mocne wina, kąpiel 28° R.

Przeciwno bezsenności brom z makowcem, Amylenhydrat, Sulfonal, unikać Chloralu.

Wpływ moralny, usunięcie powodów, jakie doprowadziły do Morf., chronić od powtórzenia się choroby.

Przeciwwskazanie do odzwyczajania morfiny stanowi tylko bolesna ciężka choroba, gdzie morfina mniej szkodzi.

## Morpiones zob. pedic. pubis.

## Mydriasis (rozszerzenie źrenicy).

Towarzyszy zwykle porażeniu accommodationi; przyczyny, prognoza i leczenie takieżsame, jak przy paralysis accommodationis.

## Myelitis.

W ostrej:

Ułożenie chorego równo w łóżku, najlepiej na poduszkach powietrznych. Bańki cięte lub pijawki w samym początku choroby, potem Tra. jodi, weierki z Ung. cinereum 3—4 grm. p. die i jednocześnie kali jodatum, jeżeli była lues, a nawet jako środek przeciwzapalny.

Uważać przy tem na ślinotok, lodowe okłady na stos pacierzowy. Równocześnie silne środki przeczyszczające: Kalomel, Jalapa, Senna. Uważać na odleżyny, na zatrzymanie moczu.

W przewlekłej formie:

Kąpiele ciepłe, wyjazd do Cieplie, Gasteinu, Trenczyna, Wildbadu, Swoszowie, Piszczan, Lubienia itp. wód. Elektryzowania prądem stałym i faradycznym. Na wewnątrz kali jodatum z 10:200, 2 łyżki dziennie. Arg. nitricum 0·01—0·02 w pigułkach, arsen po 0·001 lub Ergotyne po 0·10—0·50 2—3 razy dziennie (skutek jednak wątpliwy).



## Myringitis.

Jeżeli ból wielki 1—2 pijawek na Tragus, gdy widać tworzący się ropień, nacięcie. W razie miernego bólu wcierać w oko-licę ucha:

**632.** *Morphii muriat.* 0'30,

*Ol. hyosc.* 15'00.

jako też włożyć do ucha watę napojoną kilkoma kroplami tego rozczynu.

Leczenie zapalenia B., jak przy Otitis media acuta.

## Nephritis zob. Morb. Brighti Nephrolithiasis.

Zalecić wody alkaliczne (Karlsbad, Vichy, Ems, Kissingen. Zabronić zbytniego pożywania mięsa, za to więcej jarzyn, mleka, w ogóle dużo płynów.

Napoje wyskokowe w małej ilości; kwaśne napoje i potrawy wzbronione. Mierne używanie ruchu.

Przeciw krwotokom z nerek Ergotin, Tannin. Przeciw kolce nerkowej, narcotica: Morfina, Opium, dalej Urethan 3—4'0 dziennie. Ciepłe kąpiele, bańki suche, nacieranie oliwą z chloroformem, ciepłe okłady. Wstrzykiwania morfiny.

**633.** *Butyl Chloral* 5'00,

*Aqu. dest.* 120'00,

*Spir. vini rectific.* 10'00,

*Glycerin* 2'00.

DS. 2—3 łyżek jedna po drugiej.

**634.** *Lithii carbon.*

*Natri bicarb.* āā. 0'50,

*Tal. dos. N. X.*

S. 3 pr. dziennie.

**635.** *Piperazin* 5'00,

*Div. in dos.* 10.

DS. 3 pr. dziennie w opłatku, lecz znacznie lepiej w syfonie wody sodowej lub Giesshübelskiej.

## Neuro-retinitis (Zapalenie nerwu wzrokowego i siatkówki).

Cierpienie objawiające się jedynie podupadaniem bystrości wzroku rozpoznawanem być może jedynie wziernikiem. Obok ograniczenia światła, jużto okularami, jużto w pewnych formach zapalenia, ciemnym pokojem i zakazanie pracy, wymaga przedewszystkiem leczenia przyczynowego, a więc: Syphilis (secundaria) wcierań ungu. cinereum; diabetes: Karlsbad, albuminuria: mleczna kuracja itd.

Rheuma i leukemia dają również powód do zapaleń siatkówki. Choroby mózgu prowadzą tak zwaną tarczę zastoinową.

## Neuralgia intercostalis.

Elektryzowanie, wcierań kojących maści. Wstrzykiwania morfiny lub antipyriny. Jeżeli przyczyną jest liszaj (herpes) pudrować lub smarować maścią cynkową, lub morfinową.

**636.** *Chloroformii* 10'00,

*Ol. hyosc. cocti*

*Ol. olivar.* āā. 20'00.

MDS. Do nacierania.

**637.** *Veratrini* 0'50,

*Chloroformii* 10'00,

*Spiritus* 50'00.

MDS. Do nacierania.

**638.** *Antipyrin.*

*Aqu. aest.* āā. 5'00.

MDS. 1 lub 2 strzykawki wstrzyknąć w okolicę bólu.

## Neuralgia trigemini, Prosopalgia.

Uwzględnić i leczyć przyczyny: anaemia, histerya, zimnica, choroby ucha, zębów itp.

Wycięcie blizny ugniatającej nerw. Leczenie przymiotu, zatrucia ołowiem.

**639.** *Chinin muriat.* 0'50,  
*Dtur. tal. dos. N. X.*  
 S. Jeden proszek przed na-  
 padem.

**640.** *Chloral. croton.* 0'30.  
 Pro dosi w pigułkach 4—5  
 razy dziennie.

**641.** *Solut. arsen Fovleri* 10'00.  
 DS. 3 razy dziennie od 3—5  
 kropli po jedzeniu.

Wrazie bólu powstałego z prze-  
 żębienia:

**642.** *Natri Salicyl.* 5'00,  
*Aqu. dest.* 180'00,  
*Syrup aurant.* 20'00.  
 MDS. Co godz. łyżkę.

**643.** *Butyl chloral* 2'00—3'00,  
*Spir. vini rectif.* 10'00,  
*Glycerin* 20'00,  
*Aqu. dest.* 120'00.

MDS. 3—4 łyżek na raz.  
 (Dawki według stopnia bólu  
 i indywidualności chorego).

**644.** *Extr. Gelsemii fluid.* 10'00.  
 DS. Co  $\frac{1}{2}$  godz. po 5 kropli.  
 (Najwyżej 3 dawki).

**645.** *Antipyrin* 0'50,  
*Dtur. tal. dos. N. 10.*  
 DS. Rano i wieczór proszek.

**646.** *Exalgin* 0'30—0'40.  
 Kilka razy dziennie.  
*Methylen caerul.* 0'02—0'03.  
 pro dosi, 2—3 razy dziennie.

**647.** *Veratrin.* 0'15,  
*Morphii acet.* 0'10,  
*Ungu. cerei* 10'00.  
 Mf. ungu. S. Wcierać w miej-  
 sca bolące.  
 Elektryczność, naciąganie lub  
 wycięcie kawałka nerwu.

## Noma.

Najglówniejszym czynnikiem  
 leczniczym jest pożywna i pod-  
 niecająca dyeta.

Części zgorzelą dotknięte na-  
 leży przypalić zgęszczonymi  
 kwasami lub sześcioclorkiem

żelaza, najlepiej jednak lapisem  
 lub termokauterem.

Do opatrunku najlepiej nadaje  
 się jodoform lub płatki waty ma-  
 czane w kreolinie. Usta należy  
 pilnie płukać, lub wymywać roz-  
 czynami przeciwgnilnymi (3%)  
 woda borowa, słaby rozczyń  
 nadmagnezianu potasowego, 3%  
 kwas salicylowy itp. Ubytki po-  
 wstałe, wymagają najczęściej po  
 zupełnem zablżnieniu zabiegów  
 plastycznych.

## Obstipatio alvi habitualis.

Usunąć przyczyny cierpienia,  
 środki lekko czyszczące, dyeta  
 mieszana, kompoty, jarzyny, o-  
 woce, u chorych, którzy znoszą  
 mleko, dawać takowe w sporych  
 ilościach.

Obok tego zabiegi hydropa-  
 tyczne, mięsienie, codzienne le-  
 watywy, wody mineralne: Karls-  
 bad, Marienbad, Hunyady Janos.

**648.** *Pulv. liquir comp.* 40'00.  
 Co dzień na noc  $\frac{1}{2}$  — jednej  
 łyżeczki.

**649.** *Trae Rhei vinos*  
*Extr. fluid. Cascar. Sagr.*  
*aa.* 25'00.  
 DS. 2 razy dnia po  $\frac{1}{2}$  — 1-cj  
 łyżeczki.

**650.** *Extr. Aloë aquos.*  
*Extr. taraxaci aa.* 5'00,  
*f. pil. N. 50.*  
 S. Rano i wieczór po 1—2 pi-  
 gułek.

**651.** *Trochisci compressi e Rheo*  
*à 0'50 N. 50.*  
 DS. Co dzień na noc 1—3 pa-  
 stylek.

**652.** *Trochisci compressi e Cas-*  
*car. Sagrad à 0'50 N. 50.*  
 S. Co dzień na noc 1—3 pa-  
 stylek.

**653.** *Sal. therm. Carolin.* 100'00.  
 DS. Co dzień na czczo łyżecz-  
 ką w  $\frac{1}{2}$  szklanki ciepłej  
 wody.

**654. Natri bicarb.***Magnes carbon.* āā. 10'00,*Pulv. rad. Rhei* 7'00.

DS. 2 razy dnia na koniec noża.

Nadzwyczaj zalecają:

**655. Podophyllini** 0'30,*Extr. aloes**Extr. rhei* āā. 3'00,*Extr. taraxaci q. s. f. pil.*

N. 40.

S. Na noc 1—3 pigulek.

Przy uporeczywem zaparcieiu, wlać przez wysoko do rectum wprowadzoną sondę: 70 gr. aether sulph. z 300 gr. Āq. foeniculi.

Dzieciom:

U osesków, zmiana mamki, odsunąć dodatki mączne, woda z cukrem lub extractem słodowym. U starszych regularne żywienie, mieszany pokarm, unikać środków rozwalniających. Lewatywy ze słonej chłodnej wody (14° R.), płyn do 1 roku 100—200 gr., starszym do 500 gr.

W razie koniecznej potrzeby, oseskom: *Rheum cum magnesia* 2 r. dziennie na koniec noża, starszym *Aq. laxat.* 2—3 łyżeczki dziennie, *Trae rhei vin.* 1—2 łyżeczki, opaski z chłodnej wody na noc, po poprzedniem masowaniu brzucha. *Extr. fluid. Cascar. Sagr.*, rano i wieczór po 10—15 kropli.

**656. Extr. Casc. Sagr.** 5'00,*Aqu. dest.* 50'00,*Syrup zingib.* 20'00.

S. Na noc łyżeczkę.

**657. Tinct. nuc. vom.** 1'00,*Tinct. rhei aquos* 14'00.

MDS. 2 razy dz. po 10 kropli dla dziecka 8—12 mies. przez dłuższy czas.

*Ol. ricini* 15'00,*Inf. coffeae tost.* 60'00,*Sacch.* 20'00,*Vitell. ovi* N. 1.*f. emulsio.*

S. Co godz. łyżeczkę.

**Odontalgia.**

Jeżeli z powodu pruchnienia zęba i zapalenia nerwu: płukanie w celu oczyszczenia, osuszenie jamy w zębie i założenie kwasu karbol. czystego na kuleczce z waty.

**658. Morphii mur.** 0'03,*Spir. vini rectific.* 5'00,*Chloroformii* 20'00.

MDS. Na kulce z waty włożyć do jamy zęba.

**659. Mentholi** 2'50,*Chloroformii* 4'00.

Na wacie włożyć do zęba.

**660. Extr. opii***Camphor. tritae**Bals. peruv.* āā. 0'50,*Masticis* 1'00,*Chloroformii* 10'00.

S. Kuleczkę waty w tym rozczynie zmaczaną włożyć do zęba.

*Pulpitis ac.* Po oczyszczeniu zęba.

**661. Thymol** w substancji włożyć.

*Periodontitis:* płukanie zimną wodą, zimne okłady. Tra jodi do pędzlowania dziąsła około chorego zęba, 1—2 razy dziennie. Jeżeli bóle się zwiększają, przejść do okładów ciepłych, płukania kojące.

**662. Decoct. altheae** 200'00,*Trae opii* 2'00,*Aqu. menth. pip.* 10'00.

DS. Płukanie.

Z powodu zwiótczenia dziąseł: usunąć kamień ze zębów i płukanie środkami ściągającymi.

**663. Acidi tannici** 4'00,*Spir. vini rectific.* 80'00,*Bals. vitae Hofm.* 20'00.

MDS. łyżeczkę na szklanke płukania.



**664.** *Infus. fol. Salviae* 200·00,  
*Spir. cochlear.*

*Trac myrrhae* āā. 25·00.

MDS. Woda do ust.

Jeżeli ból bez wiadomej przyczyny: antipiryn, phenacetin, Natr. salicylicum 0·75, co  $\frac{1}{2}$  godz.

**665.** *Cocaini oleinici* 1—2·00,

*Ol. olivar.* 10·00.

DS. Kilka kropli ogrzanego płynu wpuścić do ucha.

Przeciw krwotokom po wyrwaniu zęba:

**666.** *Chloroform.* 4·00,

*Acid. tannic.*

*Menthol* āā. 2·00,

*Tinct. ratanh.* 25·00,

*Aqu. dest.* 500·0.

MDS. Do płukania.

## Oedema glottidis.

Uważać na czystość powietrza, unikać pyłu, dymu, zakazać rozmowy. Przy nieznacznym obrzęku, można dać inhalacye z *Acid. tannicum*, *Kali bromatum*, płukanie roztworami środków ściągających lub też pędzlowanie c. *Arg. nitrico* (1:20) raz dziennie. Łykanie pigułek z lodu, zimne lub wysychające okłady na szyję, wcieranie szaruchy. Środki przeczyszczające oraz wymiotne. Znaczniejsze obrzęki wymagają nacięć (*scarificatio*) przy pomocy wżiernika.

W ostateczności *Tracheotomia*.

## Oedema pulmonum.

Leczenie głównej choroby w odpowiedni sposób.

Przy pierwszych objawach obrzęku płuc ostrego, podać środki podniecające akcyę serca jak: czarna kawa, cognac, grog, wino, kamfora, piżmo. Podskórnie wstrzyknąć eter, ol. *camphoratum* lub *coffeine*.

Zewnętrznie położyć na piersi i łydki *synapizma*, rozcierać

nogi i ręce, dać choremu kąpiel i zlewać głowę i piersi zimną wodą.

Jeżeli chory jest krwisty, można puścić krew, zwłaszcza w obrzęku płuc wśród spraw zapalnych.

Nadto można dać lewatywę ze środków ostrych jak: *Decoct colocynt.*, octu, rozczyntu soli itp.

Jeżeli niebezpieczeństwo na razie minęło, dawać *cardiacą* i *digitalis*, *coffeine*, *theobrominę*, *Sparteinę* *Tra stroph.* — Po tem leczyć główną chorobę i zwracać uwagę na pierwsze objawy zastoinowe.

**667.** *Infus. flor. arnicae*

e 15·00 ad 120·00,

*Camphor. trit.* 1·25,

*Mucil. g. mimos.* 20·00.

Mf. emulsio. S. Co  $\frac{1}{2}$  godziny łyżkę.

**668.** *Acidi benzoici* 3·00,

*Camphor. pulv.*

*Stibii sulph. aurant* āā. 0·50,

*Sacch. alb.* 5·00.

*Mfp. div. in dos.* X.

S. Co 2 godz. proszek.

## Omphalitis.

Opatrunek przeciwniepalny (*salicylowy*, *jodoformowy*) okłady z letniej wody (2% maść *salicylowa* z *waseliną*), ropnie wcześniej otwierać.

## Onania (Masturbatio) Samogwałt.

Zapobiegać wypryskom na częściach płciowych, *oxyuris*; nieprzykrywać dzieci pierzaną pościelą. Wzbraniać nieobyczajnych rozmów, czytania. Ręce wśród nocy kazać trzymać na kółdrze.

Leczenie polega na wpływie moralnym; z środków ostatecznych w razie potrzeby, obrzezanie, względnie przypiekanie lechtaczki.

Przeciw niedokrewności przetwory chinowe, żelazo, pobyt na świeżem powietrzu, gimnastyka.

## Onychia.

Po stłuczeniach okłady z Aqu. Goulardi, Liquor alum. acet. Kąpiele sublimat. (0.50:1000.00).

Najprostszym sposobem leczenia wrastającego paznokcia jest usunięcie wrastającej połowy (po poprzednim zamrożeniu palca eterem) zapomocą nożyczek. U ludzi bojących się tej małej operacji można osiągnąć wynik korzystny przez codzienne głębokie wprowadzenie kawałka gazy jodoformowej do załamka pomiędzy paznokieć a skórę.

## Ophoritis.

Schodzi się z leczeniem perimetritis.

## Otalgia.

Leczenie zależne od przyczyny. Wskutek zimnicy: chinina, jednak w przebiegu nieżyty lub ropienia ucha środkiem szkodliwym.

W przebiegu syfilis: kali jodatum.

Zwrócić szczególną uwagę na spróchniałe lub źle wprowadzone sztuczne zęby. W każdym razie można użyć maści kojących, wkraplać Cocainę.

## Otitis.

a) *Ot. externa circumscripta* (v. *Furuncul*).

W pierwszej chwili leczenie poronne, w pobliżu furunkulów robi się lekkie nacięcia (jak przy szczepieniu) i napawa maścią (Resorein 2.00 Lanolin 20.0) kilka razy dziennie. Przewód uszny wypełnia się również maścią a w pobliżu Tragus zakłada się watę borową. W dalszym okresie kataplazmy do przewodu usz-

nego, oraz za muszlą ucha. Często przepłukiwanie ciepłą wodą, wprowadzenie pary do ucha. Wezłone przecięcie, przed tem można dla uniknięcia bólu wielkiego wstrzyknąć 10% roztworu Cocainy. Po ustaniu krwawienia, przestryknąć i watą wysuszyć ucho, po czem 5% maścią borową wysmarować.

**669.** *Cocaini muriat.* 0.20,  
*Aqu. dest.* 10.00.

DS. Watę napojoną kilku kroplami włożyć do ucha.

**670.** *Veratrini*  
*Morphii muriat.* āā. 0.10,  
*Lanolin*  
*Vaselin* āā. 7.00.

Mf. ungu. DS. Wcierać w okolicę ucha.

Jeżeli ból bardzo silny nie ustaje, podskórne wstrzyknięcie morfiny.

b) *Otitis exter. diffusa.*

U silnych osób pijawki (na Tragus, nie na proc. mastoid). Ustawiczne przepłukiwania ciepłą wodą a jeżeli i to bez skutku, kataplazmy do przewodu usznego, na proc. mastoideus i przed muszlą uszną, (lecz nie jeden duży kataplazm na całe ucho).

Kataplazmy tylko parę godzin przykładac, poczem założyć watę napojoną gliceryną. W razie silnego bólu wkraplanie Cocainy i zewn. maści kojące lub też podać morfinę i chlorał wewnętrznie.

Jeżeli pojawi się ropienie, przestrykać 1—3 razy dziennie i oczyścić ucho watą.

Następnie wdmuchiwać kwas borowy, wkraplać 5% roztwór kw. borowego, a w uporczywych ropieniach, pędzlowanie roztworem Arg. nitrici 1:30.

## Otitis media.

Dopóki trwa ból, postawić na Tragus 1—2 pijawek, wkraplać 10% roztwór Cocainy. Jeżeli się błona bębenkowa wypukła, przekłucie (Paracentesis).

W razie obrzęku proc. mastoid.: kataplazmy, wcieranie szaruchy.

Częste przestrzykiwania lub wkraplanie ciepłej wody do ucha.

Po przebiegu bębenka 2 razy dziennie przestrzykać ucho i równocześnie przedmuchiwanie według metody Politzera.

Chory powinien być w łóżku, gdy potrzeba, płukać gardło, brać środki napotne. Na wewnątrz podać w razie silnego bólu morfinę — chloral — kali bromatum, zewnętrznie stosować kojącą masę (zob. Otitis exter.).

Po kilku dniach ropienia wdmuchiwanie kw. borowego raz na dzień a jeżeli to nie zmniejszy wydzieliny, wkraplać środki ściągające.

**671.** *Zinci sulphur.* 0·20,  
*Aqu. dest.* 20·00.

MDS. Po przestrzykaniu ucha wlać kilkanaście kropli nieco ogrzanego płynu.

W razie cuchnącego odpływu, przestrzykiwania 2% kw. karbolowym lub kali hypermang. 0·50:100·0.

## Ozaena (Rhinitis catarrh. acuta).

Jednostajna ciepłota, zaprzestanie kapieli.

W zatkanie przewody nosa u ssawców napuszczać pędzelkiem 2% roztwór Cocainy 3 razy dziennie. Starszym przestrzykać roztworem sody lub soli, (łyżeczkę na 1/2 litra wody) lub ałunu (1/3 łyżeczki na 1/2 litra).

Pędzlowanie mascią z praecipit. rubri (0·50:10·0), kwasu bo-

rowego 5%; podawać środki napotne.

**672.** *Zinci sozojodol.* 5·00,  
*Vasellini*  
*Lanolini āā.* 40·00,  
*adde Paraff. liq. q. s. f. ung. molle.*

S. Posmarować gazę i wkładać do nosa.

Wdmuchiwać:

**673.** *Bismut. salicyl.* 5·00,  
*Talc.* 2·00.

Mfp. S. 2 razy dziennie wdmuchiwać do nosa.

**674.** *Cocain mur.* 0·50,  
*Aqu. dest.* 10·00.

MDS. Watę zmaczaną w płynie co 5 godzin wkładać.

Wziewanie do nosa pary z kamfory lub:

**675.** *Zinci sulphur.* 2·00,  
*Thymol* 0·20,  
*Menthol* 0·30,  
*Alcohol. absol.* 50·00,  
*Aqu. dest.* 120·00.

DS. Rozpylaczem wtryskiwać do nosa 2 razy dziennie.

**676.** *Saloli* 5·00,  
*Acidi borici* 3·00,  
*Acidi salicyl.* 0·50,  
*Thymol.* 0·20,  
*Talc. pulv.* 10·00.

Po przestrzykaniu nosa wodą karbolową 1% i osuszeniu, wdmuchiwać do nosa.

## Ozaena chronica.

Uwzględnić: ciała obce, polipy, nowotwory, zatrzymaną ropę, strupy, dalej: przymiot, zołzy.

Przestrzykiwania jak powyżej.

*Kali chloricum* 5—10·00:500·00,  
*Resorcin* 10·00:500·00,  
*Kali hypermang.* 0·30:300·00.

Zołzowatym pędzlować roztworem Lugola:

**677.** *Jodi puri* 0·15,  
*Kali jodati* 0·50,  
*Aqu. dest.* 300·00.



Blizsze wewnętrzne ściany nosa, pedzlować balsamem peruwiańskim, w głąb zakładać tampony z waty, napojone balsamem — raz dziennie. Usuwa to cuchnienie z nosa.

**678. Jodol cryst.**

*Acid. tannic.*

*Borac aa. 5'00.*

Mfp. Zażywać 3—5 razy po szczypcie.

Wdmuchiwanie Aristolu. Ozacna syphil: przestrzykiwanie sublimatem (0'01:100'0) z dodatkiem gliceryny.

**679. Praecip. rubri 0'15,**

*Vaselin*

*Lanolin aa. 15'00.*

Mf. ungu. S. Zapuszczać pędzlem do nosa.

**Oxaluria.**

Dyeta przeważnie mięsna, mleczna, unikanie mącznych pokarmów, jarzyn, octu, cytryn, wina.

Ze środków leczniczych: picie wód: Vichy, Karlsbad, Elster, Salzbrunn, Wildungen.

Na wewnątrz: lith. carb. lith. salicylicum, Natr. carbon po 0'50—1'0 dziennie w wodzie selterskiej.

**680. Natri bicarb. 10'0,**

*Lith. carb. efervescentis 50'00.*

*Mfpulv. Div. in dos. N. XX.*

S. r. i. w. proszek w szklance wody.

**681. Natri bicarb. 2'00,**

*Lith. carbon.*

*Kali carbon. aa. 0'50,*

*Aq. flor. naph.*

*Syr. simpl. aa. 20'00,*

*Aqu. dest. 300'0.*

DS. Przez dzień wypić (rozczyn Ewicha).

**Oxyuris vermicularis.**

Lewatywy z wody, czosnku rozartego w wodzie (garść na 1 litr) z  $\frac{1}{2}$  0/100 roztworu sublimatu,

lub też lewatywa z czystego tranu.

**682. Butyri Cacao 3'00,**

*Calomelanos 0'05,*

*Mf. supposit. Dtur. tal. dos.*

*N. V.*

S. Na noc jeden czopek.

*Naphthalin 1'00,*

*Ol. olivar 40'00.*

MDS. Do lewatywy.

Dorośłym 5—6'00:80'00 oliwy.

**Panaritium.**

Należy jak najrychlej głęboko aż po kość przeciąć i w ranę wprowadzić pasek gazy jodoformowej, celem zapewnienia odpływu wydzieliny i zapobieżenia przedwczesnemu zlepianiu się brzegów rany. Kawałki kości obumarłe należy wyjąć.

**Pannus.**

Nie będąc samoistną chorobą, nie wymaga odrębnego leczenia; należy leczyć jedynie chorobę wywołującą tenże jak: trachoma, Conjunct. scrophulosa et blennorrh. chron. (Zob. odpowiednie rozdziały). Łuszcza zaś sama powoli ustąpi.

Zbytęcnem więc jest mówić, iż łuszcza jaglicowa innego, a powstająca na tle skrofulicznem również innego leczenia wymaga.

**Paralysis.**

Wykrycie przyczyny porażenia, czy obwodowe czy ośrodkowe. Leczenie przedewszystkiem głównej choroby.

Najczęstszą przyczyną lues, a wtedy wciérki z unguent. cinereum i kali jodatum.

W razie przyczyny reumatycznej — polecić ciepłe kąpiele siarczane. Cieplice czeskie lub węgierskie, Piszczany — masowanie, elektryzowanie prądem

stałym lub przerywanym stósonie do rozpoznania.

Na wewnątrz pilocarpin 0·01 na dawkę lub podskórnice, lub strychnin. sulfur. 0·10 na 10·0 z tego  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  strzykawki co 2-gi dzień.

## Paralysis agitans.

Choroba nieuleczalna. Można jednak zmniejszyć trzęsienie za pomocą środków, podskórnice wstrzykiwanych:

**683.** *Sol. arsen. Fovleri* 2·00,  
*Aqu. dest.* 4·00.

DS.  $\frac{1}{2}$  strzyk. Na wewnątrz też sol. arsen. Fovleri po 4—6—10 kropli na dzień.

Wody arsenikalne: Gubera, Levico itd.

Ciepłe kąpiele, kąpiele borowinowe, (Mattoniego sól borowinowa), elektryzowanie, kalijodatum lub bromat. i inne nervina.

Polecają też wstrzykiwania z:

**684.** *Hyosciamin mur.* 0·01,  
*Aq. dest.* 10·00.

DS.  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  strzykawki; lub na wewnątrz:

**685.** *Hyosciamin* 0·02,  
*Pulv. et extr. liquir. q. s. ut f. pil.* N. XX.

S. 1—2 pigułki dziennie.

## Paralysis nervi facialis.

Wykrycie przyczyny i leczenie tejsze, a więc: lues, ropnie lub gruczoly, tumory, (exostozy) uciskające nerw, zmiany w uchu (otitis interna).

Jeżeli przyczyną porażenia zaziębienie, to środki napotne, ciepłe okłady, ciepłe kąpiele, unikanie przeciągów, na wewnątrz pilocarpin. mur. 0·01 lub podskórnice.

Elektryzowanie n. facialis, przeważnie prądem stałym, później i faradycznym, massage.

Podskórnice wstrzykiwanie strychniny:

**686.** *Strychnin. sulfur.* 0·10,  
*Aqu. dest.* 10·00.

DS.  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  strzykawki co 2-gi—3-ci dzień

## Paralysis progressiva.

Przy pierwszych objawach usunąć chorego od zajęć, dać mu umysłowy i fizyczny wypoczynek. Dyeta pożywna ale nie podniecająca, życie pod każdym względem higieniczne.

Jeżeli była dawniej lues, to energiczna kuracja rtęciowa przez wciěrki 2—3 grm. na raz, obok tego kali jodatum

Jeżeli by nawet i nie było lues, to przeciejs należy spróbować wcierek, bo czasem bywają polepszenia, a nadto chorzy nie chcą się do lues przyznawać.

Zresztą kąpiele letnie, zimne wycierania, prąd stały na głowę, na wewnątrz kali jodatum lub Ergotin po 0·1—0·50, 2—3 razy dziennie. Rzadko kiedy bywa skutek z leczenia.

## Paralysis accomodationis.

Cierpienie bardzo uporezywe, często nie ustępujące.

Przyczyny obwodowe jak trauma, rheuma, sztuczne (atropin) lub też centralne jak: cierpienia mózgu i rdzenia pacierzowego.

Przedewszystkiem leczenie przyczynowe; lokalnie zapuszczanie raz dziennie 1 kropli 0·5% roztworu pilokarpiny i elektryzowanie słabym prądem stałym. Zakazanie pracy.

Porażenie accomodacyi atropinowe, samo ustępuje.

**687.** *Pilocarp. mur.* 0·05,  
*Aq. dest.* 10·00.

DS. Krople do oka.  
Zakraplacz.

## Paraphimosis.

Odprowadzenie natychmiastowe załupka. W razie trudności, okłady z zimnej wody, z wody Goularda, a w razie znacznego obrzęku nacięcie.

By usunąć obrzęk żołądki, okłada się ją na kilka minut kilkakrotnie w kierunku poprzecznym kateterem Nelatona, po zdjęciu tegoż szybko odprowadza się napletek.

## Paresis vesicae.

Należy choremu polecić, by oddawał mocz w regularnych, nie zbyt wielkich odstępach. Jeżeli oddawanie moczu jest zupełnie niemożliwem lub jeżeli po samowolnem oddaniu jeszcze pełna ilość moczu w pęcherzu pozostaje, należy założyć 2—3 razy na dobę cewnik.

Przeciwno osłabieniu pęcherza, o ile ono nie jest objawem choroby ośrodków nerwowych, zaleca się leczenie hydropatyczne, kąpiele nasiadowe chłodne, zmywania, zimne lewatywy, stosowanie prądu stałego i przerywanego, masowanie, a na wewnątrz przetwory strychninowe.

**688.** *Strychnin. nitric.* 0·01,  
*Sacch. albi* 4·00.

*Mfpulv. div. in dos.* 10.

S. 1—3 proszków dziennie.

**689.** *Strychnin. sulph.* 0·10,  
*Aqu. dest.* 10·00.

S. Do iniekcji.

## Parotitis.

Okłady wysychające z wody ciepłej lub octanu glinowego, na wewnątrz środki lekko przeczyszczające. W przypadkach ropnych wcześnie nacięcie.

## Pavor nocturnus.

Dyeta niedrażniąca, nie dawać kawy, herbaty, napojów wysko-

kowych. Zimne zmywania, kąpiele, gimnastyka. Nie pobudzać wyobraźni opowiadaniem. Na noc nie dawać wiele jeść, sypialnię miernie oświetlić. W razie niedokrewności chinina, żelazo, a w potrzebie na noc cokolwiek soli bromowej, chloralu, urethanu. Opium przeciwskazane.

**690.** *Chloralhydrat*

*Natri brom. āā.* 1·00,

*Mucilag. g. ar.*

*Syrup rubid. āā.* 15·00,

*Aqu. dest.* 80·00.

DS. Na noc łyżkę.

**691.** *Urethani* 2·00,

*Aqu. dest.* 80·00,

*Syrupi* 20·00.

DS. Na noc łyżkę.

## Pediculi capitis.

Po obcięciu włosów, wymyć głowę roztworem sody, następnie wysmarować albo naftą czystą lub z dodatkiem balsamu peruwiańskiego.

**692.** *Ol. petrae* 50·00,

*Bals. peruv.* 20·00.

MDS. Do smarowania głowy.

Po dokładnem nasmarowaniu zawiązać głowę na 12 godzin, po czem należy kilka razy przemyć i wycesać gęstym grzebieniem.

## Pediculi pubis, Morpiones.

Na wieczór posmarować albo czystą maścią szarą, lub też

**693.** *Ol. petrae*

*Unguent. cinerei āā.* 10·00,

*Bals. peruv.* 5·00.

Mf. ung. S. Do smarowania.

Na drugi dzień kąpiel i oczyszczenie mydłem. Po 8 dniach leczenie powtórzyć, aby zniszczyć z gniazda powstałe młode.



## Pediculi corporis seu vestimenti.

Wymagają kąpieli i leczenia powstałych podrażnień skóry. Ubrania należy wyparzyć lub też napuścić 1—2% roztworem sublimatu.

## Pemphigus.

Dobre odżywianie, na wewnątrz żelazo, chinina, Sol. ars. Fowleri a unikać leków osłabiających organizm (pigułek Morisona) leczenie rtęciowe.

W pemphigus pruriginosus kąpiele dziegciowe, t. j. naciera się skórę dziegciem, a w  $\frac{1}{2}$  godz. po tem daje się kąpiel letnią przynajmniej godzinę trwającą. W przypadkach Pemphigus vegetans, daje się kąpiele sublimatowe (5—8 gr. na kąpiel). Przy zmianach w jamie ust, płukanie c. acido borico 2%. Ekzorkyacje pokrywa się płatkami z maścią cynkową lub ochładzające maści.

**694.** *Lanolin anhydrici* 10' 0,  
*Adip. benzoïn.* 20' 00,  
*Liqu. plumb. subacet* 30' 00.  
Mf. Ungu. S. Do smarowań.

## Pericarditis.

Przedewszystkiem spokój, chory powinien leżeć w łóżku, mało się ruszać, na okolicę serca worek lodowy. W razie silnych bólów parę pijawek, suche bańki, pędzlowanie c. Tra. jodi. Na wewnątrz Inf. digitalis e. 1' 00 ad 200' 00, co godzinę łyżkę, lub inne jakie cardiacum. W razie silnej gorączki podawać antipyrinę, phenacetinę lub antifebrinę w połączeniu z coffeiną dla uniknięcia zapadu. Jeżeli bóle trwają, dać morfinę, chloralhydrat, lub sulfonal na noc. Dyeta przy tem płynna, niepodniecająca, uważać na regularne stolce. — Jeżeli okres zapalny minął, stoso-

wać resorbentia: okłady ciepłe, pędzlowanie jodyną, diuretica, jak: coffeina, diuretina, digitalis, Tra. strophanti itp. a dyeta wówczas posilna, lekko podniecająca.

W uporeczywych przypadkach można zrobić punkcję i aspirację przyrządami Potaine'a lub Dieulafoy, lecz rzadko kiedy chory się na to zgodzi.

**695.** *Infus. fol. digit.*  
e 2' 00 ad 180' 00,  
*Syrup simpl.* 20' 00.  
MDS. Co 2 godz. 2 łyżki.

**696.** *Tinct. Strophanti* 10' 00.  
DS. 3 razy dz. po 10 kropli.

Po ustaniu gorączki, gdy exsudat zostaje:

**697.** *Infus. juniperi* e 15' 00  
ad 200' 00,  
*Liqu. Kali acet.*  
*Oxymel Scillae aa.* 15' 00.  
DS. Co 2 godz. łyżkę.

**698.** *Infus. hb. digitalis*  
e 1' 00 ad 150' 00,  
*Kali acet* 5' 00,  
*Syrup simpl.* 20' 00.  
DS. Co 2 godz. łyżkę

Dzieciom:

*Inf. digitalis* e 0' 20:100' 00,  
*Coffein* 0' 05—0' 10 pro dosi  
1—2 razy dziennie.

**699.** *Trae Convallar* 10' 00.  
DS. 3 razy dz. po 5—10 kropli.

## Perimetritis.

W okresie ostrym:

Spokojne leżenie w łóżku, okłady lodowe na okolicę bolesną, w razie znacznej boleści i gwałtownych objawów, u osób silnych 5—6 pijawek nad okolicę pachwinową, dyeta ścisła, płynna, nado wewnątrz: Tra opii simpl. po 10 kropli kilka razy dziennie albo:

**700.** *Extr. opii aquos. 0'10,*  
*But. Cacao q. s. ut f. l. ar-*  
*tis suppositoria ad anum*  
*N. V.*

DS. Co 3 godziny czopek użyć.

(Gdy nasilenie objawów się zmniejsza rzadziej).

Gdy ciepłota opadnie, środki łagodnie wypróżniające: lewatywy z wody z dodatkiem 2 łyżek ol. ricini albo z dodatkiem łyżki gliceryny. Czopki glicerynowe, oleum ricini wewnętrznie.

Gdy objawy ostrego zapalenia ustąpiły, okłady wysychające, po ustąpieniu bolesności: kąpiele nasiadowe ciepłe, z dodatkiem  $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$  kilo soli na kąpiel. Kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa).

**701.** *Trae jodi*  
*„ gallarum āā. 20'00.*

DS. Do pędzlowania.

**702.** *Ammon. sulpho-ichtyol*  
*5'00—10'00,*

*Vasellini flavi 50'00.*

Mf. ungu. DS. Zewnętrznie.

**703.** *Ammon. sulpho-ichtyol*  
*5'00—10'00,*

*Glycerini 200'00.*

MDS. Do tampon. codziennie.

W przypadkach przewlekłych mięsienie.

**704.** *Kali jodati 10'00,*  
*Gelatini q. s. f. l. art. glo-*  
*buli vaginales N. X.*

DS. Raz dnia gałkę użyć lub:

**705.** *Jodoformii desodorati 3'00,*  
*But. Cacao q. s. ut f. l. art.*  
*globuli vaginales N. X.*

DS. Raz dnia gałkę użyć.

**706.** *Ammon. sulpho-icht. 1'00,*  
*Butyr. Cacao q. s. f. l. art.*  
*suppos. ad anum N. X.*

S. Jeden czopek dziennie użyć.

## Periostitis.

Spokój, pędzlowanie nastojem jodowym, okłady wysychające

z octanu glinowego. W przypadkach ropnych, szerokie przecięcie ropni. Jeżeli przyczyną zapalenia okostnej szczęki jest zab schorzały, należy go wyjąć.

Tam, gdzie istnieje podejrzenie o sprawę kiłową, należy stosować plaster rtęciowy, a na ewentualnie towarzyszące owrzodzenia przykładac masć rtęciową, na wewnątrz zaś podawać przetwory jodowe.

**707.** *Kal. jodat. 5—10'00,*  
*Aqu. dest. 200'00.*

S. 3 łyżki dziennie.

**708.** *Natri jodati 5'00—10'00,*  
*Aqu. dest. 200'00.*

S. 3 łyżki dziennie.

**709.** *Empl. hydrarg. extens.*  
 *$\frac{1}{4}$  m.*

S. Pokrajać na paski i przykładać na miejsca zgrubiałe.

**710.** *Merc. praecip. rubri 1'00*  
*—3'00,*

*Ungu. simpl. 50'00.*

Mf. ungu. S. Masć.

## Peritonitis.

Przedewszystkiem chory powinien zachować bezwzględny spokój; dyeta ściśle płynna. Wewnętrznie należy podawać przetwory makowca, a w razie silnych wymiotów kawałki lodu do polykania i cocainę. Zewnętrznie środki przeciwzapalne, okład lodowy, pijawki. Gdy okres ostry minie okłady wysychające lub ciepłe.

W przypadkach surowiczego zapalenia z przebiegiem chronicznym, może być czasem wskazane wypuszczenie płynu z jamy brzusznej, a nawet t. z. tualeta jamy brzusznej.

Peritonitis chronica, zwłaszcza u dzieci, wymaga dobrego odżywiania, wcieranie szarego mydła na ściany brzucha, kąpiele solne (Iwonicz, Rabka).

kapiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa), Punkeya.

Do wewnątrz: żelazo, jod z żelazem, Syrup ferri jodati.

*P. tuberculosa*: leczyć według tychsamych zasad; punkeye wykonywać tylko w ostateczności.

**711.** *Laudani pur.* 0·02,

*Sacch. albi* 0·30,

*Dtur. tal. dos.* XII.

S. 3 pr. dziennie.

**712.** *Cocaini mur.* 0·15,

*Aqu. dest.* 10·00.

DS. W razie wymiotów 10—15 kropli zażyć.

**713.** *Emuls. commun.* 200·00,

*Aqu. lauroc.* 5·00,

*Morphii mur.* 0·05,

*Syrup simpl.* 10·00.

MDS. Co godz. łyżkę.

W razie parcia na stolec:

**714.** *Morphii mur.* 0·01,

*Extr. bellad.* 0·02,

*Butyri Cacao* 1·00,

*f. suppos. dtur. tal. dos.* X.

S. W razie parcia jeden czopek użyć.

## Perniones. Odmrożenie.

Przemywanie alunem, boraxem, pędzlowanie tinct. jodową, rozcienionym kwasem cytrynowym lub octowym.

**715.** *Aluminis*

*Boracis* āā. 5·00,

*Solve in*

*Aqu. rosarum* 300·00,

*Trae benzoës* 15·00.

DS. Do zmywań.

**716.** *Ung. rosat* 75·00,

*Ol. lauri* 15·00,

*Camphorae* 10·00.

Mfung. S. Maść na odmrożenie.

**717.** *Boracis* 5·00,

*Ung. spl.* 25·00.

Mf. ungu. S. Maść na odmroż.

**718.** *Ol. camphorati* 2·00,

*Lanolini* 20·00.

Mf. ungu. S. Do nacierań.

**719.** *Aristoli* 1·00,

*Aether. sulph.* 10·00,

*Collodii* 30·00.

MDS. Do pędzlowań.

**720.** *Medullae ossium* 30·00,

*Acid. mur. conc.* 20·00, \*

*Ungu. altheae* 80·00,

*Extr. opii aquos*

*Camphorae rasae* āā. 1·00,

*Terebinth. venet.* 15·00.

Mf. ungu. S. Do smarowań.

**721.** *Cocain hydrochl.* 0·20,

*Lanolin* 10·00.

Mf. ungu. S. Wcieranie.

Na owrzodzenia opatrunki jodoformowe, maść z azotanu srebra itp.

## Pertussis. Koklusz. Krztusiec.

Oddzielić dzieci zdrowe, zwłaszcza małe. Dyeta pożywna, karmić zaraz po wymiotach. Pobyt na świeżem powietrzu, oddychanie zgęszczonem powietrzem, zmiana miejsca pobytu. Rozpylanie 5% kw. karbol. w mieszkaniu. — Przy napadach dobywać palcem w szmatkę zawiniętą wydzielinę.

W razie wystąpienia zapalenia płuc (napady czasem ustają) dawać leki wykrztuśne:

*nf. ipecac. c. Natro benzoico.*

**722.** *Trae bellad. gtts.* 2—5,

*Mixtur. gummos.* 100·00,

*Syrup simpl.* 15·00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

**723.** *Chloral hydratis* 0·50,

*Ammon. v. Natri bromati* 2·00,

*Aqu. dest.* 100·00,

*Mixtur. gum.*

*Syrup rubid.* āā. 15·00.

MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

**724.** *Cocain mur.* 1·00,

*Aqu. dest.* 10·00.

MDS. Do pędzlowań, przełyku i krtani.



**725.** *Morphii mur.* 0'01—0'02,  
*Aqu. dest.* 60'00,  
*Syrup altheae* 15'00.  
 MDS. 3 razy dziennie łyżeczkę.

**726.** *Chinini muriat.* 0'50,  
*Natr. bicarb.*  
*Sacchari āā.* 1'50,  
*Mfp. div. in dos.* 10.  
 S. Co 3 godz. proszek.

**727.** *Trae alcohol. rad. aconit.*  
*Trae bellad. āā. gtts.* 10,  
*Aqu. amygdal. amar.* 1'00,  
*Aqu. dest.* 100'00,  
*Syrup aurant.* 20'00.  
 MDS. 3—4 r. dzien. łyżeczkę.

**728.** *Stibii sulphur. aur.* 0'50,  
*Mucilag. gum. ar.* 20'00,  
*Aq. dest.* 50'00,  
*Syr. simpl.* 20'00.  
 MDS. Skłóciwszy, co 2 godz. łyżeczkę.

**729.** *Coccionell pulv.* 1'00,  
*Kali carbon.* 3'00,  
*Sacchari* 10'00,  
*Aq. dest.* 100'00.  
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

**730.** *Antipyrin.* 1'00,  
*Terpinhydratis* 1'00,  
*Aqu. tiliae*  
*Syrup aurant āā.* 50'00.  
 MDS. 4—5 r. dzien. łyżeczkę.

**731.** *Codeini mur.* 0'05,  
*Linct. gumm.* 60'00,  
*Syrup altheae* 30'00.  
 MDS. 3—4 łyżek dziennie.

**732.** *Antipyrin* 0'50—1'00,  
*Aqu. de Vichy* 80'00,  
*Syrup rubid.* 20'00.  
 DS. Używać zaraz po napa-  
 dzie łyżeczkę. — Wyżyć  
 w ciągu 24 godzin.

**733.** *Det. hbae Thymi*  
 10'00 ad 200'00,  
*Ammon. bromat.* 2'00,  
*Syrup altheae* 20'00.  
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

**734.** *Bromoformii* 5'00.  
 DS. Dzieciom  
 do roku życia 2—3 kropli,  
 od 2—4 lat 3—4 „  
 do 8 lat 4—5 „  
 3 razy dziennie podać w ły-  
 żeczce wody.

Ponieważ bromoform perełka-  
 mi osiada, uważać, aby dzieci  
 połknęły (Br. należy chronić  
 przed światłem, a gdy zecerwie-  
 nieje, odrzucić).

**735.** *Acidi benzoici*  
*Bismut. salicyl. āā.* 5'00,  
*Chinin sulph.* 1'00.  
 Mfp. DS. 2 r. dziennie wdmu-  
 chiwać do nosa.

**736.** *Acidi borici*  
*Coff. tost. āā.* 5'00.  
 Mfp. DS. 2 r. dziennie wdmu-  
 chiwać do nosa.

**737.** *Thymoli* 1'00,  
*Spir. vini rectific.* 250'00,  
*Aqu. dest.* 750'00.  
 DS. Do inhalacji.

Jako środek, zmniejszający  
 ilość napadów, znoszący wymio-  
 ty, polecają kreozot. Podaje się  
 albo w syropie (0'50:100'00) dzie-  
 ciom od 1½—2 mies. 2 łyżeczki  
 dziennie, starszym 6—8 łyżeczek,  
 lub też we winie z wodą aro-  
 matyczną i syropem.

**738.** *Creosoti* 0'25,  
*Sulphonal* 0'20,  
*Syrup tolutani* 150'00.  
 MDS. Co 2 godziny łyżeczkę  
 (przed użyciem wstrząsnąć).

## Pharyngitis.

W nieżytach lekko przebiega-  
 jących, wystarczą płukania sło-  
 ną wodą, ślazem itp., zabronić  
 palenia tytoniu i trunków.

W cięższych przypadkach uży-  
 wać wdychiwania z ałunu, ac.  
 tannic. Pędzlować roztworem la-  
 pisu (1:20) ac. tannicum (1:15).

**739.** *Alum crudi* 10'00,

*Aqu. dest.* 500'00.

DS. Płukanie.

**740.** *Kali hypermang.* 0'10,

*Aqu. dest.* 500'00.

DS. Płukanie.

**741.** *Kali chlorici* 10'00

*Aqu. dest.* 500'00.

DS. Płukanie.

**742.** *Jodi puri* 0'15,

*Kali jodati* 0'50,

*Glycerini* 50'00.

MDS. Do pędzlowania.

**743.** *Trae myrrhae* 15'00,

„ *pimpinell* 2'50,

*Ol. menth. pip. gtts.* V.

MDS. 15—20 kropli na szklankę płukania. W razie znacznej bolesności, pędzlowanie 5<sup>0</sup>/<sub>10</sub> rozez. Cocaïny.

## Phimosis.

Jeżeli phimosis jest skutkiem zapalenia, to w wielu przypadkach udaje się ją usunąć leczeniem przeciwzapalnym: spokój, ułożenie członka podwyższone, zimne okłady, przestrzykiwanie kwasem borowym 2<sup>0</sup>/<sub>10</sub> pod napletek, by wydzielić przy istnieniu balanitis, trypra, wrzodu miękkiego lub twardego usunąć. W razie, gdy phimosis jest wypływem kiły, utrzymujesz się uporeczywie, a niema objawów zgorzeli, przedsięwzięcie się energiczną kuracją rżęciową, w takim razie wraz z ustępowaniem zmian kiłowych napletka i phimosis ustępuje. W razie grożącej zgorzeli, skutkiem wzajemnego ucisku obrzmiałej żołądki na napletek, operacyjne zniesienie phimosisy.

Metody operacyi:

1) Rozcięcie wewnętrznej blaszki napletka. Naciąga się ile możliwości zewnętrzną blaszkę napletka na żołądki, napinając w ten sposób brzeg napletka,

który się w linii środkowej na długość  $\frac{1}{2}$  ctm. nacina, przy dalszem naciąganiu napletka na żołądki, przecina się wciąż napinającą się blaszkę wewnętrzną dopóki napletek nie da się zupełnie odprowadzić.

2) Przeciawszy na grzbiecie członka obie blaszki napletka, zeszywa się blaszkę napletka wewnętrzną z zewnętrzną.

3) Circumcisio: Cięcie jak wyżej, aż do sulcus coronarius, wzdłuż tego ostatniego prowadzi się cięcie tak, by z blaszki wewnętrznej napletka jaknajwięcej, z zewnętrznej jaknajmniej wyciąć.

## Pityriasis versicolor.

*Trae Veratri viridis* 30'00.

DS. Do pędzlowania na noc.

Następnego dnia zmyć wodą mydlaną.

**744.** *Acidi salic.* 3'00,

*Sulphur. praecip.* 10'00,

*Lanolin*

*Vaselin aa.* 50'00.

DS. Wieczorem nasmarować, rano zmyć wodą z mydłem.

## Pleuritis.

Chory ma leżeć w łóżku, pożywienie płynne, zwłaszcza jeżeli jest gorączka. Suche bańki na okolicę zajętą zapaleniem opłucnej, jeżeli bardzo silny ból, to nawet 1—2 pijawek. Po tem okład lodowy, lub wysychające. Z resztą leczenie wyczekujące, co najwyżej jakiś kwasek do picia, małe dawki chininy. W razie męczącego kaszlu, morfina. Jeżeli się wypocina nie wytwarza, to pozostać przy tem leczeniu, co najwyżej pędzlowanie przez kilka dni chem Tra jodi i nie pozwalać choremu wychodzić, dopóki tarcie istnieje i stan podgorączkowy się utrzymuje. Z resztą trzeba leczyć chorobę

zasadniczą, najczęściej nacieki szczytowe. Jeżeli zaś jest już znaczna wypocina, to obok okładów wysychających można założyć ciepłe kataplazmy. W okresie, kiedy już wypociny nie przybywa, pędzlowanie jodyną, vesicantia, stosowane co 2—3 dni na inne miejsce. Na wewnątrz Natr. salicylicum po 3—4 grm. dziennie, diuretica jak: Inf. digitalis, Theobrom. natro salicyl. po 4—5 grm. dziennie, Coffeinum natro salic. 1—1.5 dziennie, Calomel, Adonis vernalis 6'00 na 200'00., Tra. stroph., Kali nitratum itp. Nadto można próbować środków przeczyszczających, jeżeli nie ma przeciwwskazania: Kali. jodat. 10'00:200'00 na wewnątrz 2—3 łyżek pro die.

Tam, gdzie wypocina ropna, należy zrobić resekcję żebra i ropę wypuścić, jeżeli zaś chory nie chce, to przynajmniej punkcję i aspirację płynu przyrządem Potaina lub Dieulafoy. Punkcja nadto jest wskazana, jeżeli znaczna bardzo duszność grozi życiu chorego.

Po przebyciu zapalenia opłucnej, wyjazd na świeże powietrze, w góry, odżywianie forsonne, gimnastyka odpowiednia i leczenie w gabinetach pneumatycznych.

Zresztą leczyć należy chorobę główną, która dała powód do zapalenia opłucnej, a tą jest najczęściej gruźlica płuc.

**745.** *Dec. cort. chinæ*  
e 10'00 ad 150'00,  
*Natri salicyl* 3'00,  
*Syrup aurant.* 20'00.

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

Dzieciom Natr. salic. 0'10—0'30 pro dosi. Co 2—4 godz.

**746.** *Chloroformii* 10'00,  
*Ol. hyosc.*  
*Ol. olivar. āā.* 20'00.  
S. Do nacierań.

Przy pozostałym exsudacie:

**747.** *Decoct. ononidinis*  
e 15'00 ad 200'00,  
*Oxymel Scillae* 20'00.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

**748.** *Natr. chlorat.* 5'00,  
*Lithii chlorat.* 1'00,  
*Aqu. petroselin* 130'00,  
*Syrup menth.* 200'00.

S. Co 2 godz. łyżkę.

**749.** *Syrup ferri jodati* 10'00,  
*Syr. simpl.* 20'00.

MDS. 3 razy dz. po 20 kropli  
(dla dziecka 5 l t).

## Pneumonia.

Leków swoistych przeciw pneumonii nie posiadamy. Leczenie więc przeważnie dyetetyczne. Chory powinien leżeć w dużym pokoju o jednostajnej temperaturze, dyeta tylko płynna: bulion, rosół, mleko, winna polewka, wino, rosół z jajem, do picia jakiś kwas lub lemoniada.

W pierwszym okresie zapalenia płuc można postawić suche bańki, zwłaszcza, jeżeli jest kłucie w piersiach, przy bardzo silnem kłociu nawet 2—3 pijałek i okład lodowy lub wstrzyknięcie morfiny. Przy silniejszym kaszlu, męczącym chorego, nieznaczne dawki narkotyków. Jeżeli gorączka bardzo wysoka lub trwa długo, należy przeciwdziałać przez zmywanie ciała letnią wodą lub pół na pół wodą z octem, dalej środki przeciwgorączkowe jak: antypyrinę 1'00—2'00 lub phenacetinę, ale lepiej z dodatkiem coffeiny 0'15—0'20 na dawkę, lub też obok antypiretyków dać jeszcze cognac lub mocne wino. Przy słabem tętnie, lichej akcyi serca, podać digitalis, strophantus lub sparteinę.

W objawach zapadu na wewnątrz camphora 0'1 w kieliszku wina lub podskórną strzykawkę



ol. camphorat.; wreszcie, pod-  
skórnice eter.

**750.** *Infus Valerianae*  
e 5'00 ad 200'00.

*Aether sulph.* 2'00,

*Syr. aurant.* 20'00.

S. Co godzinę łyżkę.

Chorem, przyzwyczajonym do nadużywania wyskoku, należy nie szczędzić wina, cognacu, ażeby nie wybuchło delirium. W razie delirium, opium, morfina lub chloralhydrat (2—3 grm.).

W okresie rozdzielania się nacieku: środki wykrztuśne, rozdzielające jak: woda giesshübel-ska, selterska, szczawnicka.

**751.** *Infus ipecac.*

e 0'30 ad 180'00,

*Aqu. lauroc.* 2'00,

*Syr. altheae* 20'00.

DS. Co 2 godziny łyżkę.

**752.** *Infus. senegae*

e 10'00 ad 200'00,

*Natri benzoici* 1'00,

*Liquor ammon. anis.* 2'00,

*Syrup simpl.* 20'00.

S. Co 2 godziny łyżkę.

Pulv. Doveri 0'25, 2 lub 3 dawki, Stib. sulphur. aurant 0'01—0'02 na dawkę, 2—3 razy na dzień itp. W razie trudnego rozdzielania się nacieku: okłady wysychające, okłady ciepłe, kataplazmy, dyeta pożywna, wino, cognac.

U dzieci: regularne żywienie, mleko, rosół, do napoju kwaski, Acid mur. 1 $\frac{1}{2}$ ‰. Ac. phosph. 1 $\frac{1}{2}$ ‰ zimne okłady na głowę. Środków przeciwgorączkowych silnych a zwłaszcza digitalis unikać.

Przeciw objawom ze strony mózgu lub żołądka: Calomel (0'05—0'10). W razie zapadu, osłabienia serca, czarna kawa, cognac, szampan, kamfora. Wezwanie znacznego spadku ciepłoty, wino. Po przełonię choroby środków wykrztuśne.

## **Pneumonia catarrhalis zob. Bronchopneumonia.**

### **Poliomyelitis anterior acuta.**

Rzadko można widzieć pierwszego okresu, w tym razie zimne okłady na głowę i kręgosłup, środki przeczyszczające (calom.). W drugim okresie t. j. (porażenia) pędzlowanie jodem, prąd stały (po 5 minut), Anoda szerepka na kręgi szyjne, katoda guziczkowa na porażone mięśnie. Gimnastyka lecznicza, środki wzmacniające: żelazo, podskórne wstrzykiwania strychnin. mur. (0'001) pro dosi 2 razy na tydzień. Nacierania części porażonych wyskokowymi, aromatycznymi przetworami. W końcu leczenie ortopedyczne.

### **Pollutiones.**

Uwzględnić: Phimosi, Balaniti, Urethritis, Obstipatio, Helminthiasis, Onanię, Anaemię. Dobre odżywianie, unikanie wybryków in Baccho et Venere. Pościel niezbyt miękka i lekkie przykrycie. Kąpiele nasiadowe letnie na 20—25°. Elektroterapia. Hydroterapia. Kąpiele rzeczne. Pobyt na świeżym powietrzu, wcześnie wstanie, unikać spania na wznak.

Nerwowym: Natrum bromatum 2—3 grm. dziennie, osłabionym chinina, żelazo, arsen.

**753.** *Extr. secal. corn.* 5'00,

*Sacchari* 15'00,

*Mfp. div. in dos.* N. 20.

DS. Rano i wieczór proszek.

**754.** *Ferri bromati* 0'30,

*Natri brom.* 5'00,

*Aqu. dest.* 60'00,

*Syrup cort. aur.* 30'00.

DS. Rano łyżkę, wiecz. 2—3.

### **Processus puerperalis.**

Zapobiegać przeniesieniu zakażenia z osób chorych na zdro-

we. Ściśle aseptyczne postępowanie podczas porodu, unikanie niepotrzebnego częstego badania rodzącej.

Gdy występuje po porodzie gorączka lekka do  $38^{\circ}$  C. a tętno spokojne, odchody rozłożone: przestrzykiwanie pochwy 1—2 razy dnia rozcżynami: kw. karbolowego, kw. borowego, Creoliny, Thymolu. Posypanie owrzodzeń w przedsionki i na międzykroczu jodoformem, opatrzenie gazą jodoformową. Antipyretica, zaciemniają obraz chorobowy i nie przynoszą korzyści.

Gdy ciepłota i tętno się podnosi po użytem postępowaniu: przestrzykiwanie jamy macicy środkami przeciwnieciennymi. (Acid boricum 3%, Acid carbol. 2—5% itd. zapomocą cewników Bozemannna, Fritscha, Olshausena, 2—3 razy dzien. Gdy po dwóch dniach ciepłota nie opada, postępowania tego zaniechać.

Gdy są objawy podrażnienia otrzewnej: lód na brzuch, opium per anum. Środki rozwalniające (Ol. ricini, Calomel) podawać można, gdy nie ma zdrażnienia otrzewny.

Po rozwinięciu się gorączki połogowej, postępowanie Rungego: mocne wino 1—2 butelek dziennie, cognac. Gdy skłonność do wymiotów, wino szampańskie z lodu.

**755.** *Cocaini muriat.* 0.10,  
*Aqu. dest.* 100.00.

DS. Co pół godz. łyżeczkę.

Gdy wstręt do wina, to cognac, rum.

**756.** *Spir. vini cognac. optimi*  
*Aqu. dest. aa.* 60.00,  
*Vitell. ovi unius*  
*Syr. simpl.* 20.00.

DS. Co pół godz. 1—2 łyżek.

Mleko, herbata, czarna kawa, silne rosoły, Beeftea; do na-

poju: woda z dodatkiem białka kurzego jednego jaja na szklankę (przecedzić). Gdy tętno szybko: Coffeina interne. Jeżeli nie ma podrażnienia otrzewny, kąpiele letne ( $22-24^{\circ}$  R.) 5—10 minut 1—2 razy dziennie.

Postępowanie przeciwgorączkowe: Gdy ciepłota dochodzi do  $39.5^{\circ}$  C., zmywania całego ciała kilka razy dziennie, gdy dochodzi do  $40^{\circ}$  C. zawijanie w mokre, w letniej wodzie maczane prześcieradła; zawijanie takie można powtórzyć 2—3—4 razy, aż do opadnięcia ciepłoty, 1—2 razy dziennie. Zimny okład na głowę. Uważać na tętno i w razie zapadu, środki podniecające.

## Proctitis.

Leczenie ogranicza się do stosowania lewatyw oczyszczających i zawierających środki ściągające i przeciwniecienne, zwłaszcza kw. borowy 2% lub Natr. Salicyl., obok tego z powodu towarzyszącego parcia na stolec czopki ze środkami odurzającymi i letnie kąpiele nasiadowe. Najważniejszym jest jednak leczenie przyczynowe.

**757.** *Zinci sulph.* 1.00,  
*Dent. tal. dos.* X.

DS. Jeden proszek w pół litra wody letniej rozpuścić i użyć jako lewatywy.

**758.** *Acid. tannici* 0.05,  
*Butyri Cacao* 1.00,  
*Mf. supposit. dent. tal. dos.*  
N. X.

DS. 2—3 czopki dziennie.

**759.** *Morph. mur.* 0.01,  
*Extr. Bellad.* 0.02,  
*Butyri Cacao* 1.00,  
*f. supposit. dent. tal. dos.* X.  
S. 2—3 czopki na dobę użyć.

**Prosopalgia vide Neuralgia trigemini.**

## Prurigo.

Leczenie wewnętrzne:

**760.** *Acid. carbolici* 5'00,

*Extr. et pulv. gent. q. s. ut*  
*f. pil. N. 50.*

*Consp. pulv. Lycopod.*

DS. 3—5 pigulek 2 razy dnia.

Jeżeli choroba jest skutkiem anaemii, kaheksyi lub żółtów, to podawać na wewnątrz: tran, jod, żelazo. W lecie Rábka, Iwoniecz.

Leczenie zewnętrzne:

Kąpiele siarczane lub zwykłe z dodatkiem Sol. Flemingx. Nacierania maścią Wilkinsona przez kilka lub kilkanaście dni. Nacierania dziegieciem i zmywanie tegoż w kąpieli. W ostatnich czasach z bardzo dobrym skutkiem używa się maść Naftol-B u dorosłych 4—5% u dzieci 2%. Maść tę naciera się pędzlem szczeciniowym, zasypuje pudrem i zostawia na noc, z rana bierze chory kąpiel. W bardzo łagodnych przypadkach u dzieci, kąpie się co dzień dziecko w wodzie przepuszczonej przez otręby, po kąpieli naciera się skórę białem, a czasem tylko wobec silniejszej reakcyi przez 8—10 dni maścią naftolową 2%.

Z dobrym skutkiem używano:

**761.** *Tiopheni* 5—10'00,

*Vaselini*

*Lanolini* āā. 50'00.

Mfu. S. Maść.

Ihle poleca:

**762.** *Oesypi*

*Ol. olivar.* āā. 10'00,

*Zinci oxydati*

*(Amyli tritici)* q. s.

*f. pasta mollis.*

## Prurigo ferox.

Przez 8—14 dni zmywanie skóry mydłem szarem w kąpieli i

następnie nacieranie maścią Wilkinsona. Później należy przez 6 tygodni nacierać skórę cienką warstwą maści naftol. (4—5%).

W dalszym ciągu, kiedy swędzenie znacznie ustąpi, 2 razy w tygodniu kąpiel letnia i nacieranie skóry białem. Po kilku miesiącach wystarczy to raz na tydzień wykonać.

## Pruritus ani.

**763.** *Hdrgr. bichlor.* 0'03.

*Ammon. chlorati* 0'12,

*Acidi carbol.* 4'00,

*Glycerin* 60'00,

*Aq. rosar.* 115'00.

MDS. Rano i wiecz. posmarować, gdy skóra zgrubiała, posmarować raz kreozotem.

Przy Pr. ani, unikać picia kawy.

## Pruritus cutaneus.

Leczenie przyczyn wywołujących: choroby żołądka, wątroby.

Kąpiele zimne, siarczane ze sodą, alunem.

**764.** *Natr. salic.* 5'00,

*Aqu. dest.* 180'00,

*Syrup rubid.* 20'00.

MDS. 3 razy dz. po 2 łyżki.

Obmywanie 3% roztworem spirytusowym mentholu.

**765.** *Cocaini* 1'00,

*Mentholi* 1'00,

*Lanolin* 50'00.

MDS. Do nacierania.

**766.** *Menthol.* 2'50,

*Bals. peruv.* 5'00,

*Ung. Wilsonii*

*Lanolin* āā. 50'00.

Mfu. S. Do nacierania.

## Pruritus senilis.

Kąpiele z otrębami, zmywania wodą gorącą (40°), do której dodać roztworu:

**767.** *Acid. carbol.* 4'00,

*Aceti arom.* 200'00.

2 łyżki, po czem zapudrować.



**768.** *Bismut. salicyl* 20'00,  
*Amyli* 90'00.  
 MDS. Puder.

**769.** *Oesypi*  
*Ol. olivar. āā.* 10'00,  
*Zinci oxyd.*  
*Amyli tritici āā. q. s.*  
*f. pasta moll.*  
 S. Maść.

## Pruritus vulvae.

Uwzględnić przyczyny: Vulvitis, vaginitis, obstipatio, diabetes. Unikać drapania, kąpiele nasiadowe (24—26°), okłady z wody karbol. 3‰, Sublimat (0'50: 1000'00). Laseczka mentolowa.

**770.** *Acidi carbol. crist.* 5—10'00,  
*Ol. olivar.* 100'00.  
 DS. Do smarowania.

**771.** *Chloroformii* 5'00,  
*Ol. olivar.* 50'00.  
 MDS. Do pędzlowań.

**772.** *Natri subsulphur.* 30'00,  
*Acid. carbol.* 5'00,  
*Glycerini* 2'00,  
*Aqu. dest.* 500'00.  
 MDS. Do obmywań, rozgrzewa-  
 szy poprzednio płyn.

**773.** *Cocain* 1'00,  
*Lanolin* 20'00.  
 Mf. ungu. S. Do smarowań.

## Pseudocroup-Laryngitis stridula.

Wziewanie pary wodnej lub słabych rozczyńców soli, Natr. carbon., Ammon. mur. jużto z inhalatora, jużto trzymając dzieci nad parą. Ciepłe okłady na szyję, kataplaizmy. Podawać dużo ciepłych napojów, herbaty, mleka, w ostateczności środki wymiotne.

**774.** *Inf. ipecac. e* 2'00 ad 40'00,  
*Tart. stib.* 0'05,  
*Syrup* 10'00.  
 MDS. Co 10 minut łyżeczkę.

**775.** *Cupri sulphur.* 0'20,  
*Aqu. dest.* 40'00,  
*Syrup* 15'00.  
 DS. Co 10 minut łyżeczkę.

Dzieci skłonne do P. w czasie niepogody trzymać w domu.

## Psoriasis.

Leczenie musi być wewnętrzne i zewnętrzne.

Leezenie wewnętrzne:

**776.** *Solutio Fowleri*  
*Trae malatis ferri āā.* 10'00.

Z rozczynu powyższego daje się po obiedzie i po kolacyi z początku po 6 kropli, 4-go dnia zwiększa się dawkę o 2 krople pro die, zwiększając następnie co 3 dni dawkę o 2 krople, dochodzi się aż do 24 kropli pro die. Odtąd zwiększa się dawkę co 5 dni o 2 krople i dochodzi się do tej ilości, przy której, zmiany w sposób widoczny zaczynają ustępować (zwykle przy 40-tu kroplach pro die) i teraz w ten sam sposób zmniejsza się dawkę stopniowo, schodząc do początkowej ilości.

Polecają też wody arsenikalne: Gubera, Levico i t. d.

Można także podawać arszenik w postaci pigułek.

(*Pillulae asiaticae*).

**777.** *Acid. arsen.* 0'75!!  
*Pulv. piper. nigri* 6'00,  
*Gummi arab.* 1'50,  
*Rad. althaeae pulv.* 2'00,  
*M. c. aq. dest. q. s. ut f. pil.*  
*N.* 100.

Pigułek używa się albo po obiedzie i kolacyi lub bezpośrednio przed niemi. Rozpoczyna się od 2 pigułek pro die, które się przed obiadem zażywa. Co 5-ty dzień podwyższa się dawkę o jedną pigułkę pro die, dochodzi się do 8—10 pigułek dziennie.

Skoro się dojdzie do 5-ciu pigułek, rozdziela się je na dwie dawki, t. j. 3 pigułki po obiedzie 2 po kolacyi i t. d.

W razie wystąpienia biegunki, bólu brzucha, nudności, zmniejsza się ilość pigułek.

Jeżeli chodzi o szybkie usunięcie zmian, robi się iniekcye z Sol. Fowleri.

**778.** *Sol. arsen. Fowleri* 2'00,  
*Aqu. dest.* 10'00.

MDS. Do iniekcji, jedną strzykawkę Prawaza.

Z innych środków wewnętrznych mniej skutecznych są używane:

**779.** *Aq. picis*  
*Aq. fontis āā.* 250'00.

MDS.  $\frac{1}{2}$  litra dziennie wypić.

**780.** *Acid. carbol.* 10'00,  
*Extr. et pulv. Liquir āā. q. s. ut f. pil. N. 100.*

DS. 5—10 pigułek dziennie.

Leczenie zewnętrzne:

Wskazania: 1) usunąć łuski, 2) znieść naciek, 3) usunąć zaczerwienienie.

Co do 1-go: zmywania mydłem szarem 5—6 krotnie połączone z kąpielą.

Co do 2-go: — Środki liczne, najlepszy kwas pyrogalusowy.

**781.** *Acidi pyrogal.* 10'00,  
*Ung. simpl.* 100'00.

Mf. ungu. S. Maść.

Uważać na objawy zatrucia, charakteryzują się one moczem oliwkowym.

W celu usunięcia zaczerwienienia, przepisuje się dziegieć, (który się wciera pędzlem szczecinowym) pozostawia się przez godzinę na skórze, a następnie daje się kąpiel.

W celu uniknięcia zatrucia przy rozległych zmianach na skórze, pędzluje się tylko część

miejsce schorzałych, później dopiero wszystkie.

Psoriasis skóry głowy:

Usuwa się łuski oliwą, następnie zmywa się 2 razy dnia spirytusem mydlanym i wciera się następnie pomadę:

**782.** *Hydrarg. praecip. albi*  
1'00,

*Ungu. emolient.* 12'00.

Mf. ungu. S. Pomada.

Po 8—10 dniach robi się to tylko raz dziennie.

W wyjątkowych razach, gdy leczenie to nie pomaga, wtedy używamy naftolu.

**783.** *Naphtol-B* 15'00,  
*Vasellini albi* 100'00,  
*Sap. viridis* 20'00.

Mf. S. Maść.

W okresie wybuchowym ostrym nie używać środków zewnętrznych, gdyż można wywołać wyprysk,

## Pustula maligna (Anthrax).

W celu zniesienia napięcia i uwolnienia ropy, zrobić kilka głębokich cięć krzyżujących się, przepłukać kwasem karbolowym 4%, między brzegi nacieć założyć paški gazy jodoformowej i posypać jodoformem, nadto robi się okład wysychający z płynu Burowa, zamoczywszy w nim watę Bruns, na wierzch daje się papier kauczukowy, lub ceratkę i przymocowuje bandażem,

## Pyæmia.

Należy usunąć pierwotne ognisko lub przynajmniej zapewnić wydzielinie należyty odpływ.

Pożywienie winno być podawane w formie łatwo strawnej a posilnej; cognac, stare wino. Ogniska przerzutowe należy rychło otworzyć i ropę z nich wypuścić. Z lekarstw najlepiej

ograniczyć się do przetworów chininy i coffeiny.

**784.** *Coffein citr.* 1'00,

*Aqu. cinamom.* 150'00.

S. Co 2 godziny łyżkę zażyć.

## Pyelitis.

Jeżeli jest okres ostry zapalny: Chory ma leżeć w łóżku, suche bańki w okolicę nerek, dyeta tylko płynna, przeważnie mleczna, najlepiej mleko pół na pół z wodą wapienną, picie wody: Bilińska, Giesshüber, wystrzagać się kawy, herbaty, korzennych zapraw i napitków wyskokowych.

Przy cierpieniu przewlekłym dyeta mniej ścisła, z unikaniem jednak wszelkich napojów wyskokowych i korzeni.

Ze środków wewnętrznych można polecić odwar: Fol. uvae ursi 15'0 na 300'0 z tego co godzina łyżkę, lub filiżankami pić. Lub Arbutini 2—3 grm. pro die w proszkach (środek drogi mało skuteczny).

Ol. ligni Santali 3 razy po 10—15 kropli w kawie lub mleku.

Kali chloric. 4—6'0 na 200'0 z tego co godzinę łyżkę.

Dobrze też działa Tannina z opium:

**785.** *Tannini* 0'30,

*Opii* 0'02,

*Mfp. d. tal. dos. N. X.*

S. 3—4 proszki dziennie.

Polecić też można do picia wodę sodową kwaśną (Rząca i Chmurski). Kąpiele nasiadowe ciepłe, okłady wysychające, w razie bólów na wewnątrz lub podskórnio morfing. Zresztą trzeba leczyć główną przyczynę choroby.

## Rachitis. Krzywica.

Najwięcej pomaga baczność na pielęgnowanie i żywienie.

Dzieci z krzywicą powinny być jak najwięcej na powietrzu, ubranie lekkie, zamiast pierza materace z włosia, przy Cranio-tabes: poduszeczka z włosia z wyciętym otworem na głowę. Przy skrzywieniach kręgosłupa i załamaniu kończyn, niepozwalając dzieciom bez podpory siedzieć, a próby ze staniem i chodzeniem bardzo ostrożnie zaczynać. W razie obfitych potów zmywać ciało kilka razy gąbką zamoczaną w zimnej wodzie i do brzo wycisnąć, a zwłaszcza tyłogłowie. Matka słaba nie powinna karmić dziecka z krzywicą.

Dziecko z krzywicą powinno już w 4-tym miesiącu dostawać nieco solonego rosolu, o ile można, nie dawać pokarmów skrobiowych. Po odłączeniu głównym pokarmem (po ósmym miesiącu) mięso z wyjątkiem wieprzowego, jaja, nieco wina, mleko.

Starszym dzieciom nie dawać wiele legumin, a zwłaszcza cukrów.

Drugim ważnym czynnikiem są kąpiele, jeżeli nieżyt oskrzeli nie przeszkadza.

Daje się w połączeniu ze słodem ( $\frac{1}{2}$  litra) i solą ( $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  do 1 funta na 20 litrów) z dodatkiem ziół aromatycznych, w razie anaemii sole żelaziste, kąpiele (26<sup>o</sup> R.) z soli borowinowej (Mattoniego), na tydzień 2—3 razy, nigdy na noc.

Regulować objawy niestrawności, jużto dodatkiem kwasów lub alkali. Nieżyt oskrzeli leczyć naparem Ipecac, Senegae, Liquor ammonii anis.

Kurczowi głóśni energicznie zapobiegać, (zob. Laryngospasmus). Skrzywienia kończyn wymagają leczenia gimnastycznego, ortopedycznego, szyn, gorsetów



itp. — U małych dzieci najlepiej rozpocząć leczenie żelazem.

*Aqu. pyrophosphatis ferri et sodae.*

3 r. dziennie łyżeczkę, dalej:

**786.** *Trac ferri chlorati.*

5—10·00.

3 razy dziennie po 5 kropli we wodzie.

**787.** *Ferri pyrophosphor.* 0·05,  
—0·10,

*Sacchari lactis* 0·20,

*Mfp. dtur. tal. dos. N. 15.*

S. 2 pr. dziennie.

**788.** *Calcii phosphor. pulv.*

30·00.

Parę razy dziennie na koniec noża do pokarmów.

**789.** *Calcar. phosphor.* 30·00,

*Ferri lactici* 2·00,

*Sacch. lactis* 30·00.

*Mfp.* S. 3 razy dz. na koniec noża.

**790.** *Bismut subnitrici*

*Carbonat calcar.* āā. 1·50,

*Mfp. div. in dos. N. 10.*

S. Co 4 godziny proszek (w razie uporeczywego nieżytu przewodu pokarmowego).

**791.** *Ol. jecor aselli* 2·00—4·00,

*Mucilag. gum. arab.*

*Aqu. dest. q. s. f. l. a.*

*Mixt. oleosa col.* 80·00,

*Syrup simpl.* 10·00.

DS. 3 razy dz. łyżkę.

**792.** *Ol. jecor aselli* 150·00,

*Limaturae ferri* 20·00,

*stent in macerat per 24 horas, deinde decant.*

DS. Rano łyżeczkę.

**793.** *Phosphori* 0·01,

*Ol. amygdal. dulc.* 30·00,

*Gum. arab.*

*Sacchari āā.* 15·00,

*Aqu. dest.* 40·00.

DS. Jedną łyżeczkę na dzień.

**794.** *Phosphori* 0·01,

*Ol. jecor aselli* 100·00.

DS. 1—2 łyżeczek dziennie.

**795.** *Phosphori* 0·01,

*Liparin* 30·00,

*Pulv. gi. ar.*

*Sacchar.* āā. 15·00,

*Aqu. dest.* 40·00.

DS. 1—2 łyżeczek dziennie.

**796.** *Phosphori* 0·06,

*Alcohol.* 20·00,

*Spir. menth.* 0·50,

*Glycerin.* 60·00.

DS. 3 razy dziennie po 6 kropli. — (Co tydzień o kroplę więcej aż do 10).

Dzieciom z nieżytem kiszek stanowczo fosforu nie podawać.

**797.** *Butyri recent.* 200·00,

*Kali jodati* 0·15,

*Kali bromati* 0·50,

*Natri chlorati* 5·00,

*Phosphori* 0·01.

Tę ilość użyć w ciągu 3 dni, kilka razy dziennie podając na chlebie.

## Ranula.

Przeprowadzić nitkę jedwabną przez torebkę. Wycięcie przedniej ściany torbiela i przyżeganie lapisem. (Drugiej metody unikać u małych dzieci — gdyż przez to nie mogą ssać).

## Rheumatismus articulatorum acutus.

Chory bezwarunkowo ma tak długo pozostać w łóżku, dopóki gorączka nie minie, obrzęki się nie zmniejszą i bóle nie ustąpią.

Ze środków najprędzej działających polecam: Antipyrinę, z *Natr. salicylicum* po 0·50, dziennie takich proszków 4—6. Jeżeli obawiamy się zapadu po silnych dawkach antipyriny, to lepiej dodać do każdego proszka 0·15 *Coffeini natrosalicylici*.

Dalej stosować można samo *Natr. salicyl.* 5·0—6·0 pr. die, *Acid. salicyl.* 4·0—5·0 pr. die, *Phenacetin* po 0·50, 4—5 pro-

szków dziennie — Antifebrin po 0·25—0·50, 3—4 proszki na dzień, Salol 1·0, 5—6 proszków na dzień, Betol 0·3—0·5, 3—4 razy na dzień.

**798.** *Salipyrin* 0·50,  
Kilka razy dziennie proszek.

*Euphorin* po 0·40,  
Kilka razy dziennie.

*Phenocollum hydrochl.* 1—1·50  
pro die.

*Methacetin* 0·20—0·30 pro dosi.  
Kilka razy dziennie.

Nadto okłady lodowe na bolesne stawy, lub ciepłe okłady. Pędzlowanie jodyną i zawijania w watę. Smarowanie stawów męszanką chloroformową lub ichtyolem.

Nadto leczenie wszelkich powikłań w odpowiedni sposób, zwłaszcza zapaleń wsierdza, opłucnej i t. p.

Jeżeli jest okres przewlekły, to obok środków wyżej wymienionych i kali jodatum 2—3·0 pro die, polecić ciepłe kąpiele, kąpiele ze soli borowinowej (Mattoniego), pędzlowanie jodyną, massage stawów maścią jodową, ruchy bierne, lub wysłać chorego do czeskich Cieplic, Trenczyna, Piszczan, Swoszowic, Krzeszowic, Truskawca, Buska i t. d.

**799.** *Ichtyoli* 10·00,  
*Ungu. parafin.* 90·00.  
Mf. ungu. DS. Maść.

**800.** *Ichtyoli* 5·00,  
*Ungu. emolient.* 50·00.  
Mf. ungu. S. Wcieranie.

**801.** *Ammon. sulfoichtyol*  
*Spir. aether. aa.* 10·00,  
*Collodii* 20·00.  
DS. Do pędzlowania stawów.

**802.** *Trae Colchici* 10·00,  
„ *Aconit.* 3·00,  
„ *Opii* 2·00.  
DS. 3—4 r. po 15—20 kropli.

**803.** *Exalgin* 2·50,  
*Alcohol menth.* 15·00,  
*Aqu. dest.* 190·00,  
*Syrup simpl.* 30·00.  
S. Co godzinę łyżkę.  
(Jedna łyżka 0·20 *Exalg.* 0·80  
pro die).

## Rheumatismus musculorum.

Na wewnątrz można podać mierne dawki *Natr. salicylicum*, *Antipyriny*, *Phenacetyny* a obok tego działać miejscowo przez wcieranie maści kojących, męszanki chloroformowej. Kąpiele ciepłe, zawijania w koce, łaźnia parowa, massage, prąd elektryczny, kąpiele siarczane, Cieplice w Czechach, na Węgrzech i t. p. miejscowościach.

**804.** *Chloroformii*  
*Glycerini aa.* 50·00.  
DS. Wcieranie.

**805.** *Trae Bellad.* 1·50,  
*Bals. vitae Hoffman.* 80·00,  
*Chloroformii* 20·00.  
DS. Do wcierań.

**806.** *Veratrin* 0·30,  
*Chloroform* 15·00,  
*Mixt. oleos. balsam.* 80·00.  
DS. Do wcierań.

**807.** *Spir. sapon* 30·00,  
*Trae opii* 2·00.  
DS. Do wcierań.

## Sarcomphalus.

Przyżęgać codziennie lapisem i zasypywać pudrem salicylowym (0·25:50·0). Większe narośle podwiązać jedwabiem lub Catgutem.

## Scabies.

Po kąpieli i wymyciu szarem mydłem, wcierać przez parę wieczorów jedną z podanych maści. Głównie nasmarować grzbiet rąk i nóg i miejsca, gdzie najwięcej lubią się gnieździć świerzby, na 3-ci dzień kąpiel.

**808. Flor. sulphur.***Ol. Fagi* āā. 20'00,*Sapon. virid.**Axungiae* āā. 40'00,*Cretae albae pulv.* 5'00.

Mf. ungu. S. Do nacierań.

**809. Naphtoli** 15'00,*Ungu. simpl.* 100'00,*Sapon. virid.* 50'00,*Cretae albae* 5'00.

Mf. ungu. S. Do nacierań.

**810. Styrac. liquid.** 5'00,*Petrolei* 20'00,*Bals. peruv.**Flor. sulphur.* āā. 2'50,*Spir. Sapo. Kalini* 10'00.

Mf. ungu. S. Do nacierań.

**811. Ol. Lavandulae***Ol. Caryophyllor* āā. 1'50,*Kali carbon.* 35'00,*Lactis sulphur.* 100'00,*Axungiae v. Lanolin q. s. ut*  
*f. unguentum.*

Dla dzieci:

**812. Bals. peruv.***Sulphur depur.* āā. 5'00,*Vaselinæ* 50'00.

Mf. ungu. S. Do nacierań.

**813. Styrac. liquid.***Ol. olivarum* āā. 50'00.

MDS. Do nacierań.

**814. Naphtholi** 4'00,*Sapo Kalin* 25'00,*Axungiae* 50'00,*Cretae albae* 5'00.

Mfu. S. Do nacierań.

**815. Creolini** 2'50,*Vaselin* 50'00.

Mfung. S. Maść.

Również skuteczne natarcie czystym balsamem peruwiańskim. Suknie i bielizna muszą być wyparzone.

W praktyce ubogich używa się Solutio Vleminckx, natarcie dwukrotne.

**Scarlatina.**

Ścisłe odłączenie chorych, aż do zupełnego zluszczenia t. j.

5—6 tygodni, poczem należy mieszkanie odwieńczyć, okna, podłogi wymyć 5% kw. karbowym. Dzieci szkolne w mieszkaniu będące, do szkoły nie poyść.

Pokój troskliwie przewietrzać, ciepłota 13—14° R. wystarcza, bieliznę można często zmieniać.

Za pożywienie: mleko, rosół, po ustąpieniu gorączki dyeta pożywniejsza, lecz nie zaraz mięsna. Za napój podawać można czystą wodę, kwaski.

Płukanie gardła częste 2% kw. borowym, 2% kali chloricum. W razie silnej gorączki zimne okłady na głowę, chinina, antypyrina (ostrożnie), Natr. salicyl.

Na obrzęki gruczołów okłady z liquor aluminii acet., wcierańia szarej maści. Skoro tylko wystąpi chęłbotanie, przecinać.

W razie znacznego świądu:

**816. Lanolin anhydric.** 50'00,*Vaselin. americ.* 20'00,*Aqu. dest.* 25'00.*M. terendo f. ung.*

S. Do nacierań.

Drgawki, majaczenia uspakać okładami z lodu, lewatywami z chloralu (0'50:50'0).

Wśród objawów zapadu, osłabienia serca, Cognac, mocne wino, czarna kawa, kamfora.

Powikłania z błonicą (dyfterya), wysiękiem w opłucnej, błony brzusznej, zapaleniem stawów, chorobami ucha, rakiem wodnym, zapaleniem nerek — zob. odpowiednie rozdziały.

**817. Chinini muriat.** 0'30,*Dtur. tal. dos.* 10.

S. Rano i wieczór proszek.

**818. Antipyrin** 0'25,*Dtur. tal. dos.* N. X.

S. Co 4 godz. proszek.

**819. Natr. salicyl.** 0'30,*Dtur. tal. dos.* N. X.

S. Co 3 godz. proszek.



**820.** *Natr. salicyl.* 5'00,  
*Aqu. dest.* 100'00,  
*Syrup rubid.* 20'00.  
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

**821.** *Liquor ammon. anis.*  
*Aether. sulphur. āā.* 5'00.  
 MDS. Co 2 godz. po 10 kropli  
 w czarnej kawie.

**822.** *Camphorae* 0'50,  
*Spir. vini*  
*Aqu. dest. āā.* 5'00.  
 MDS. Do podskórnych wstrzy-  
 kiwań.

**823.** *Acidi benzoici* 0'20,  
*Sacchari* 2'00,  
*Mfp. div. in dos. N. X.*  
 S. Co 2 godz. proszek.

Od początku szkarlatyny na-  
 leży mocz codziennie badać. Od  
 pierwszej chwili zapalenia ne-  
 rek podawać dużo mleka.

Przy zaparciu stolca 2—3 da-  
 wek Calomelu; w razie bólu  
 w okolicy nerek, postawić 6—10  
 suchych baniek. Dopóki w osa-  
 dzie z moczu znajduje się wiele  
 ciałek krwi i wałeczków, nie  
 dawać leków moczopędnych,  
 lecz ściągające.

**824.** *Acidi tannici* 0'50,  
*Chinin. sulphur.* 1'00,  
*Sacchari* 2'00,  
*Mfp. div. in dos. N. G.*  
 S. 3 proszki dziennie.

**825.** *Chinini tannici* 4'00,  
*Div. in dos. N. X.*  
 S. 3 razy dziennie proszek.

**826.** *Solut. acid. tannici*  
 2'00 ad 100'00,  
*Solut. natri bicarb. q. s. ad*  
*react. alcal.*  
*Syrup rubid.* 20'00.  
 MDS. Co 3 godziny łyżeczkę.

W razie silnego krwawienia:

**827.** *Liquor ferri sesquichl.*  
 gtts. X.  
*Aq. cinamom.*  
*Syrup simpl. āā.* 50'00.  
 S. Co godz. łyżeczkę.

Jeżeli się pojawia znaczna pu-  
 chlina, lub ucisk na płuca, po-  
 dawać wcześniej leki moczopę-  
 dne a przy towarzyszącej anae-  
 mii żelazo n. p. Tra. ferri po-  
 mati, 3 r. dzien. po 15 kropli.

**828.** *Infus. fol. digital.*  
 e 0'20 ad 100'00,  
*Liquor Kali acet. gtts. XX.*  
*Syrup simpl.* 15'00.  
 MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.

**829.** *Deti equiset. e* 3'00 ad 100'00,  
*Liquor Kali acet. gtts. XX.*  
*Syrup simpl.* 15'00.  
 MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.

Można też używać w razie  
 dłużej trwającej puchliny, ką-  
 pieli na 29° R., 5—10 minut i za-  
 wijania w koce na 2—3 godziny;  
 przeciwskazanie stanowi tylko  
 stan zapalny płuc lub osłabienie  
 serca, w kąpieli dawać zimne  
 okłady na głowę.

Uraemia: zob. pod tytuł. Ne-  
 phritis i Uraemia.

**Sclerosis** (wrzód twardy  
 p. Syphilis).

**Scorbutus.**

Dobre powietrze i dobre po-  
 żywienie, podawać dużo zielo-  
 nej jarzyny (sałata, szpinak itp.)  
 owoce, lemoniada z cytryn. Mle-  
 ko w dużych ilościach. Wino,  
 piwo. Letnie kąpiele. Płukanie  
 ust roztworami lekko ściągają-  
 cemi (kali chloricum, acidum bo-  
 ricum). Pędzlowanie: Tra. Myrh-  
 hae, Tra. ratanh. Nacieki krwa-  
 we smarować oliwą z chloroform.  
 W ciężkich przypadkach  
 leki pobudzające, kamfora, eter,  
 wino często podawać

**830.** *Det. cort. chinae e* 10'00  
 ad 150'00,  
*Acidi sulphur. dil.* 2'00,  
*Syrup rubid.* 20'00.  
 MDS. Co godz. łyżkę.

W razie krwotoków:

**831.** *Liquor ferri sesquichl.* 2'00,  
*Aq. cinamom.* 200'00,  
*Syrup Sacchari* 20'00.

MDS. Co 2 godziny łyżkę.

Dzieciom:

**832.** *Liquor ferri sesquichl.*  
*gtts.* X.

*Trae opii gtts* 1—5,

*Aqu. dest.* 100'00,

*Syrup simpl.* 20'00.

MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.

Leczenie następowe wymaga dłuższego podawania: żelaza, przetworów chinowych, dobrego żywienia i kąpieli.

## Scrophulosis.

Dzieciom małym przy piersi, jeżeli się pokażą gruczoły powiększone, zacząć dodawać osolone rosoły. Starsze dzieci żywić mięsem, mlekiem, kawą żółtą, dać nieco wina czerwonego, owoce, jarzyny łżejsze, Suche mieszkanie przewietrzane. Kąpiele, zmywania wodą są koniecznymi.

Dzieci tłuste powinny dostawać pożywienie chude, łatwo strawne, mleko, mięso, ekstrakt mięsny, używać dużo ruchu.

Dzieci blade, chude, mogą używać więcej tłuszczów, tutaj więc podać tran, najlepiej w porze jesiennej i zimowej. Lepiej odżywionym tran z dodatkiem *Trae. jodi*. Zaprzestać jednak tranu przy braku apetytu, biegunce, gorączce. Tran dawać w godzinę po jedzeniu  $\frac{1}{2}$ —1 łyżki, małym dzieciom w emulsyi, po 3 tygodniach zrobić przerwę kilkudniową.

Jeżeli dzieci nie znoszą tranu lub są przeciwwskazania, podawać przetwory jodu z żelazem, herbatę z liści orzecha, masło jodo-bromowe (zob. rachitis), ekstrakt słodowy (1—2 łyżeczek 2 razy dziennie.

W lecie pobyt na świeżem powietrzu, wody mineralne jodobromowe lub słone — (Iwonicz, Rabka, Rymanów) tak do kąpieli, jak i do picia.

Kąpiele ze soli z dodatkiem soli iwonickiej, rabezańskiej, soli borowinowej Mattoniego (po  $\frac{1}{2}$ —1—2 funtów), kąpiel na 27° R. przez 15—20 minut.

W obrzmiałe gruczoły wetrzeć na wieczór łyżeczkę mydła szarego (*Sapo kalin*) i zmyć rano i tak przez szereg dni dopóki nie będzie większej bolesności.

Choroby towarzyszące jak: *Conjunctivitis*, *Keratitis*, *Otitis*, i t. p. obok ogólnego leczenia leczyć miejscowo (zob. pod odpowiednimi rozdziałami).

**833.** *Ol. jecor. aselli* 10'00,

*Mucil. gum. ar. q. s.*

*Aqu. dest.* 60'00,

*Syrup Melissa* 10'00.

MDS. 3 razy dzien. łyżeczkę.

**834.** *Syrup ferri jodati* 20'00,

*Syrup sacchari* 40'00.

MDS. 3 razy dzien. łyżeczkę.

**835.** *Kali arsenicos solut.*

*Aqu. cinamom. āā.* 10'00.

MDS. 3 razy dziennie po 3—6 kropli.

**836.** *Ferri jodati sacchar.* 0'50,

*Sacchari* 5'00,

*Mfp. div. in dos.* N. XX.

S. 3 proszki dziennie.

**837.** *Trae jodi gtts.* X.

*Kali jodati* 1'00,

*Aq. menth. pip.*

*Glycerin. āā.* 50'00.

MDS. 3 razy dzien. łyżeczkę.

**838.** *Ol. jecor. aselli*

*Aq. Calcar. āā.* 100'00,

*Mf. linim. adde*

*Trae chinae comp.* 20'00,

„ *Rhei vin.* 15'00,

„ *Calami* 5'00.

MDS. 2—3 razy dziennie łyżeczkę do 1 łyżki.

Prof. Sommerbrodt radzi da-  
wać wytrwale kreozot od paru  
kropli dziennie do 1 grama w wi-  
nie lub kapsułkach, zaraz po  
jedzeniu.

**839.** *Creosoti* 1'00,  
*Ol. jecor. aselli* 150'00.

DS. Łyżeczkę na godzinę przed  
jedzeniem.

**840.** *Creosoti* 1'00,  
*Tinct. gentian* 2'00,  
*Spiritus* 25'00,  
*Vini Xerens. q. s. ad* 100'00.  
DS. 2—3 łyżeczek dziennie  
do  $\frac{1}{2}$  szklanki wody.

### Seborrhoea.

Rozmięczenie strupów oliwą,  
tranem i następnie zmywania  
mydłem szarem.

**Seborrhoea capilitii** zob.  
**Alopecia e seborrhoea.**

### Seborrhoea glandis penis.

Zmywanie wodą borową 20/0  
i zakładanie waty z maściami  
ściągającymi.

**841.** *Zinci oxydati* 0'25,  
*Ungu. simpl.* 20'00.  
Mf. ungu. DS. Maść.

Obok leczenia miejscowego,  
leczenie środkami wewnętrznymi  
istniejącej anaemii, dyspep-  
syi, żółtów, a więc tran, wody  
żelaziste, Roncegn 2—4 łyżek  
dziennie) rheum, wody alkali-  
czne.

### Singultus.

Uwzględnić powody:

Anaemia, hysterya, choroby  
przewodu pokarmowego, zimne  
lub gorące okłady, synapizmy  
na okolicę żołądka, elektryzo-  
wanie nerv. phrenici. Jako po-  
jedynczy środek może służyć:  
Wetknąć palce do uszów i sil-  
nie przyciskać, równocześnie po-  
dawana wodę powoli przełykać.

Również z dobrym skutkiem  
polecają: wstrzymać oddech po  
głębokim wdechu, uciskanie n. n.  
phrenicus i vagus, sonda żo-  
łądkowa.

**842.** *Trae Valerian. aether.*  
*Trae nuc. vomicae* āā. 5'00.  
MDS. Po 10 kropli na cukrze.

**843.** *Chloral hydratis* 2'00,  
*Aqu. dest.* 50'00,  
*Mucilag. gum. arab.*  
*Syrup aurant.* āā. 20'00.  
MDS. Co godzinę łyżkę.

**844.** *Codeini phosphorici* 0'03,  
*Aq. lauroc.* 20'00.  
MDS. Co godzinę po 10 kropli  
(dla dziecka od 2—5 lat).

### Soor.

Czyste utrzymanie ust, prze-  
mywać po pokarmach, dobre po-  
kojowe powietrze.

Po usunięciu mechanicznem  
grzybków (miękkim płutnem  
zwilżonem w zimnej wodzie)  
pędzlować:

**845.** *Kali hypermang.* 0'12,  
*Aqu. dest.* 15'00.  
MDS. Do pędzlowania.

**846.** *Saccharini* 1'00,  
*Spir. vini* 50'00.  
DS. Łyżeczkę rozpuścić w  $\frac{1}{2}$   
szklanki wody i 5 r. dzien-  
nie pędzlować.

**847.** *Resorcin.* 0'50,  
*Aqu. dest.* 90'00,  
*Syrup* 10'00.  
MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.  
(Dla dziecka od 1—2 lat).

Do przemywania ust: Borax  
(1'50:100'0 Aq. destil.) kali chlo-  
ricum, Bicarb. sodae (0'50:150'0).

### Spasmus glottidis.

U dorosłych tylko jako objaw  
hysteryi, wówczas skrapianie  
twarzy zimną wodą.



**848.** *Chloral hydratis* 4'00,  
*Natr. bromati* 2'00,  
*Aqu. dest.* 100'00,  
*Syrup rubid.*  
*Mucilag. gum. arab.* āā. 20'00.  
 MDS. Co 2 godziny łyżkę.

U dzieci:

W chwilach napadu włożywszy palec do ust dziecka, dotknąć nagle, przez co wzbudza się wymioty, poczem następuje głęboki wdech. Kurt radzi chorągiewkę pióra zmaczaną w mięszaniu chininy z cukrem wprowadzić do nosa.

Tryskać zimną wodą na twarz. Dziecko trzymać na rękach, zrzuciwszy wszystkie ubrania. Po napadzie unikać podrażnienia dziecka, chronić przed silnem światłem i łoskotem. Jeżeli się napady powtarzają co parę godzin, lewatywę z rumianku samego, lub z dodatkiem *Asa foetida* (0'50, jako emulsia z żółtkiem).

Uwzględnić powody: zaburzenia w trawieniu, nieżyt krtani, początek chorób zakaźnych, głównie zaś krzywicę (zob.).

**849.** *Chloral hydratis* 1'00,  
*Natr. bromati* 2'00,  
*Aqu. dest.* 60'00,  
*Syrup rubid.*  
*Mucil. gum. ar.* āā. 15'00.  
 MDS. Co 3 godziny łyżeczkę.

**850.** *Ammon. bromati* 1'00,  
*Urethani* 1'00,  
*Aqu. dest.* 80'00,  
*Syrup simpl.* 20'00.

MDS. Co godzinę łyżeczkę.

**851.** *Infus. Valerianae*  
*e 10'0 ad 100'00,*  
*Trae asae foetid.* 2'00,  
*Vitell. ovi unius.*

MDS. Na 2 lewatywy.

**852.** *Antipyrin* 0'12,  
*Dtur. tal. dos. N. 6.*  
 S. Co godzinę proszek.

## Spermatorrhoea.

Leczenie przyczynowe przy istnieniu kamieni pęcherzowych lub chorób kiszek oddechowej. Leczenie rzerzączki, unikanie wzruszeń płciowych, nadmiernej pracy umysłowej i fizycznej. Kąpiele morskie lub rzeczne, leczenie hydropatyczne.

Pożywienie strawne, nie używać napojów wysokokowych, kawy, herbaty. Wieczera powinna być weześnie spożywana i nie obfita. Poślanie łóżka twarde, przykrycie lekkie, leżenie nie na wznak, lecz na bok.

W anemii żelazo, chinina.

Przy neurasthenii — *Natrum bromatum* 3—4'0 pro die czasem dobrze działa.

**853.** *Extr. secalis corn.* 1'00,  
*Sacchari albi* 3'00,  
*Mfp. Div. in dos. N. X.*  
 DS. 3 proszki dziennie.

Miejscowo: Wprowadzenie grubych sond metalowych lub używanie psychroforu.

## Spina bifida. Tarń dwudzielna.

Chronić od urazów, założywszy opatrunk ochronny, zdarza się bowiem dobrowolne wyleczenie.

Nakłócie worka i wstrzyknięcie jodu lub wyłuszczenie worka.

## Stenocardia.

Leczenie samego napadu polega na wygodnem ułożeniu chorego w jasnym niedusznym pokoju, usunięcie uciskającego ubrania — podać choremu trochę czarnej kawy, łyżkę wina lub cognacu.

Podsłócznie wstrzyknąć morfinę lub wziewać trochę chloroformu.

Na okolicę serca synapizma, okład gorący, rozcierać kończy, dać lewatywę z soli. Można też wziewać kilka kropli Amylnitritu lub Pyridin.

Polecają też na wewnątrz wśród napadu: Nitroglicerynę z rozczyynu 0·01 na 10·0 z tego 10—20 kropli na raz, lub pastylki nitroglicerynowe po 0·001 wyrobu Bełdowskiego, Mutniańskiego i innych.

Następnie leczyć chorobę przyczynową, najczęściej więc: wady sercowe, choroby nerwowe i zatrucia przewlekłe tytoniem, kawą i herbatą.

*Exalgin* 2·50,  
*Alcohol menth.* 15·00,  
*Aqu. dest.* 190·00,  
*Syrup.* 30·00.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

## **Stomatitis aphthosa vide Aphthae.**

## **Stomatitis catarrhalis.**

Czyste utrzymywanie jamy ustnej, wymywanie ust chłodną wodą. Pędzlowanie: 2% kwasem borowym, 1% rozczyнем kali chloric. Dzieciom starszym zimne pokarmy, mleko z lodu. Wyrwać psujące się zęby, które są częstym powodem St.

**854.** *Boracis* 5·00,  
*Mel. rosat.* 20·00,  
*Aq. rosar.* 10·00.  
MDS. Do pędzlowania.

## **Stomatitis ulcerosa. Stomatocace.**

Pędzlowanie pojedynczych owrzodzeń rozczyнем kali hypermang (0·12:15·0) 5—6 razy dzien.

**855.** *Acidi borici* 1·00,  
*Kali chlorici* 0·75,  
*Succi citri* 15·00,  
*Glycerini* 10·00.

DS. Do pędzlowań.

Wewnętrznie: kali chloricum (1·0—3·0 na 120·0 Aquae, pr. die).

**856.** *Decoct. cort. chinæ*  
e 5·00 ad 100·00,  
*Kali chlorici* 2·00,  
*Syrup simpl.* 20·00.  
MDS. Co godzinę łyżeczkę.

## **Stomatitis mercurialis.**

Zaprzestać używania przetworów rtęci. Płukanie 2% rozczyнем kali chloric., 3% kwasem borowym, 2% kw. salicylowym, Sublimat 1:4000 do płukania.

Pędzlowanie owrzodzeń rozczyнем Tra jodi aa. cum Tra gallarum.

## **Struma.**

Na wewnątrz podajemy mierne dawki jodu i wód jodowych lub gąbki morskiej zawierającej jod; na zewnątrz zaś stosujemy masę jodową.

Jeżeli leczenie to nie odnosi skutku, usuwamy cierpienie drogą operacyjną i to albo przez wstrzykiwania miąższowe (jodu i jodoformu) lub przez podwiązanie tętnie, wyłuszczenie, resekcję i t. p.

**857.** *Kal. jodat.* 5·00—10·00,  
*Aqu. dest.* 200·00.  
S. 3 łyżki dziennie.

**858.** *Natr. jodat.* 5·00—10·00,  
*Aqu. dest.* 200·00.  
S. 3 łyżki dziennie.

**859.** *Kal. jodat.* 5·00,  
*Jodi puri* 0·50,  
*Ungu. simpl.* 50·00.  
Mf. ungu. S. Maść.

**860.** *Kali jodati* 5·00,  
*Glycerin q. s. ad solut.*  
*Sapon virid.* 50·00.  
Mf. ungu. S. Maść.

**861.** *Spongiae tostae* 5·00,  
*Div. in dos. N. X.*  
S. Rano i wieczór proszek.

**862.** *Trae jodi* 30·00.  
S. Do wstrzykiwań.

**863.** *Jodoformii* 1'00,  
*Aether sulph.* 5'00,  
*Ol. olivar.* 9'00.  
 S. Do wstrzykiwań.

**864.** *Jodoformii* 1'00,  
*Aeth. sulph.*  
*Ol. olivar.* āā. 7'00.  
 S. Do wstrzykiwań.

## Sudamina, Miliaria. Potówka.

Unikać zbyt ciepłego ubierania dzieci w lecie. Posypywać pudrem lub:

**865.** *Amyl. oriz.*  
*Zinci oxydati* āā. 10'00.  
 DS. Puder.

## Sycosis.

Profilaktyka: Brzytwa i ręce golącego powinny być kw. karbolowym wymyte, którejto ostrożności golarze nie zachowują.

Gdy skóra nacieкла, pokryta strupami, krostami i guzkami, należy włosy jaknajkrócej obciąć i na rozmięczenie strupów przykładać oliwę lub masę Hebry. Po zmyciu strupów zarost ogolić, włosy szczypcami powrywać nie tylko chore, lecz i przyległe zdrowe, skórę następnie 2 razy dnia mydłem szarem zmywać, a po zmyciu nacierać sublimatem 1—2:1000. Kromayer radzi w celu zapobieżenia ciągłej autoinfekcji odbywającej się przez pryskórek zmywanie 2 razy dziennie:

**866.** *Sublimati corr.* 1'00,  
*Spir. vini rectif.* 90'00.  
 DS. Do zmywań.

W 1/2 godziny po tem przykłada się znowu masę Hebry.

**867.** *Acidi tannici* 2'00,  
*Sulph. praecip.* 4'00,  
*Zinci oxydati*  
*Amyli tritici* āā. 2'00,  
*Vaselin. flav.* 20'00.  
 Mf. pasta. S. Masę.

Ropnie istniejące otworzyć. Leczenie to trwa tak długo, dopóki naciek nie ustąpi i nowe krosty nie występują.

W niższych stopniach Sycosis, zarostu się nie goli, lecz wyrwa się włosy, wciera się sublimat, a po tem masę z praecipit. album 1:20.

## Syphilis universalis.

I. Kiła nabyta.

A. Kiła pierwotna.

Wycięcie zmiany pierwotnej, jeżeli usadowienie jej na to pozwala, z zabranieniem jaknajobfitszem zdrowej tkanki (metoda ta ma zaletę szybkiego gojenia, a z nią nie tak łatwego przenoszenia choroby) lub wypalenie cum Kali caustico.

Gdy wycięcie zmiany pierwotnej nie nastąpiło:

a) Ekorkoryacja czysta polyskująca, obmywanie takowej rozczynem sublimatu 1:1000 i następnie przykładanie raz dziennie emplastr. hydrargyri americanum supra linteam extens.

b) Wrzód lub ekorkoryacja z zagłębieniem w centrum szarą wy. pociągą pokryte:

Zmywanie rozczynem sublimatu 1:1000 i zasypywanie jodoformem lub jodolem, aristolem (bezwonny, lecz mniej skuteczny od jodoformu). Obecnie zalecają posypywania c. hdrag. sozodolico. Gdy powierzchownia wrzodu pod wpływem tych środków się oczyści, przykłada się empl. hydrargyri americanum.

c) Wrzód fagedeniczny lub dyfteryczny: Obmywanie kwasem karbolowym 2/0 i zasypywanie jodoformem, na wewnątrz środków wzmacniające, unikać środków merykuryalnych.

Leczenie ogólne środkami merkurialnymi w okresie kiły pierwszorzędnej może mieć miejsce:



1) Gdy pacjent jest zresztą zupełnie zdrow.

2) Gdy dyagnoza kiły pierwotnej jest zupełnie pewną.

3) Gdy zmiany pierwotnej nie wycięto.

4) Gdy zmiana pierwotna nie komplikuje się z fagedenizmem lub dyfteryą.

Ilość rtęci wprowadzona do organizmu nie może być znaczną, najlepszym w tej mierze preparatem jest:

**868.** *Hydrargyri oxydulati tannici* 5'00,  
*Glycerini puri* 1'50,  
*Extr. et pulv. Liquir āā.* 4'00,  
*Mfpil. N. 100.*

DS. 3—6 pigułek dziennie.

**869.** *Hydrargyri oxydulati tannici* 0'10,  
*Acidi tannici* 0'05,  
*Extr. opii aquosi* 0'005,  
*Sacchari albi* 0'20,  
*Mfp. Dtur. tal. dos. N. XX.*

DS. 2 proszki dziennie.

Preparat ten używa się tak długo, dopóki stwardnienie zmiany pierwotnej nie ustąpi. Inne preparaty w tym celu używane na wewnątrz są: Sublimat 0'01 pro die, protojoduretum hydrargiri 0'20 pro die.

*Dyetetyka przy używaniu rtęci* czy to na wewnątrz, czy przez wcierania lub iniekcye:

Chory nie powinien się narażać na zaziębienie, nie przeciążać się pracą ani fizyczną ani umysłową, nie palić tytoniu, prowadzić życie spokojne, dobrze się odżywiać i wysypiać. Mieszkanie powinno być nawet w zimie wietrzone. Pokarmów kwaśnych i trudnostrawnych należy unikać. Stolec powinien być raz dziennie. Jama ust i zęby powinny być jaknajczęściej utrzymywane.

Do płukania daje się:

**870.** *Kali chlorici* 10'00,  
*Aqu. dest.* 50'00.

MDS. W ciągu doby wypłukać

**871.** *Kali chlorici* 40'00,  
*Aluminis crudi* 20'00,  
*Acid. borici* 6'00.

DS. Łyzeczkę od kawy, do szklanki wody do płukania.

Jako proszek do zębów zapisuje się:

**872.** *Calcariae carbon.* 30'00,  
*Camphorae rasae subtilissime pulver.* 3'00.

MS. Proszek do zębów.

**873.** *Calcar. carbon. praecip. dep. Lapid. pumici sbl. pulver. Kali chlorici Cort. chinae rubr. pulver. āā.* 16'00,

*Pulv. rad. Ratanh.* 10'00,

*Sapon. medic.* 23'00,

*Ol. menth. pip.* 3'00.

*M. s. p. subl. terendo.*

S. Pasta do zębów.

Do pędzlowania dziąseł po wymyciu jamy ust używa się:

**874.** *Trae Ratanhae Trae Myrrhae āā.* 25'00.

DS. Pędzlowanie.

Intoksykacja rtęcią objawia się jako: *Enteritis*. W tym razie należy natychmiast przestać używać podawanego dotąd preparatu rtęciowego, podać łyżkę olejku rycinowego a następnego dnia laudanum 3 razy dzień, po 0'02, dopóki biegunka nie ustąpi.

*Stomatitis mercurialis* 1-szy stopień (dziąsła obrzękłe, rozpuchnięte, odstają nieco od zębów, broczą przy dotknięciu, sprawiają ból przy żuciu). W tym stopniu nie potrzeba usuwać preparatów rtęciowych i przestrzegać tylko pilnego płukania ust)

2-gi stopień (obok powyższych objawów: obrzęk języka, ślinotok, smak metalowy w ustach,

cuchnienie z ust, chwianie się zębów). Usunąć preparat rtęciowy, dokładne wietrzenie mieszkania, płukanie ust.

**875.** *Tannini puri* 5'00,  
*Aqu. dest.* 400'00,  
*Spir. vini gallici* 100'00.  
MDS. Płukanie.

Pędzlowanie dziąseł cum:

**876.** *Tra Ratanhae*  
„ *Galliarum āā.* 25'00.  
MDS. 3 razy dz. pędzlować.

Celem usunięcia przykrej woni z ust:

**877.** *Chlorinae liquidae* 10'00,  
*Aqu. dest.* 500'00,  
*Mellis rosati* 50'00.  
MDS. Płukanie..

3-ci stopień (nacięć na dziąsłach, policzku, języku, przechodzący w nekrozę i wrzody). Usunięcie natychmiastowe używanego dotąd preparatu rtęciowego, świeże powietrze, dobre odżywianie.

Do płukania:

**878.** *Camphorae rasae subtil.*  
*pulv.* 3'00,  
*Emuls. amygdal* 300'00.  
MDS. Płukanie.

Jakoteż płukanie dziąseł powyższym roztworem taniny. Największą ulgę jednak sprawia obok płukania przyżeganie owrzodzeń azotanem srebrowym w roztworze (1:2) lub in substantia.

Jeżeli się rtęć w kile pierwotnej nie podaje, należy przed wystąpieniem kiły wtórnej przygotować pacjenta do następnego leczenia, usunąć anemię, podając żelazo z arsenikiem, przygotować jamę ust do leczenia przyszłego rtęciowego, a więc zęby karyetyczne wyrwać lub zaplombować, odzwyczaić od palenia tytoniu.

Przetworów jodu używa się w kile pierwotnej tylko wtedy,

gdy gruczolę limfatyczne są zbyt powiększone, jak się to zdarza u ludzi skrofalicznych.

### *B. Kiła drugorzędna.*

Leczenie rtęcią wskazane w przypadkach kiły płamistej, guzkowej i łuskowej. W wysypkach chrostkowych tylko wtedy stosuje się leczenie rtęcią, gdy takowa jest wynikiem złośliwego jadru, a nie słabej konstytucji, w tym ostatnim przypadku należy najprzód ogólne odżywienie poprawić.

Metody leczenia:

1) Środki wewnętrzne p. kiły pierwotna.

2) Iniekcye podskórne, do których wskazania następujące: łagodna forma kiły wtórnej, lub gdy pacjent ze względów towarzyskich weierania robić nie może, lub w porze zimowej, w czasie weierania, w domu pozostawać nie może.

Najpewniejszym środkiem jest Sublimat.

**879.** *Sublimati corrosiv* 0'10,  
*Natr. chlorati* 1'00,  
*Aqu. dest.* 10'00.

MDS. Iniekcye.

Zroczyny powyższego wstrzykuje się codziennie jedną strzykawkę Pravaza, zwykłą i najmniejszą ilość iniekcji w liczbie dwudziestu.

3) Weierania szarej maści.

Wskazania:

a) W przypadkach, w których podawanie przetworów rtęci na wewnątrz dla słabego przewodnictwa pokarmowego są przeciwwskazane, a iniekcye sublimatowe dla neurastenii nie mogą być robione.

b) W przypadkach ciężkiego przebiegu kiły, niebędącego następstwem słabej konstytucji.

c) W przypadkach odnawiającej się kiły drugorzędnej, jeżeli takowa występuje w formie cięższej od 1-go wybuchu.

d) U ciężarnych i dotkniętych gruźlicą płuc.

e) Gdy wystąpią zmiany w organach ważnych dla życia lub grożące oszpeceniem.

Do jednego weierania używa się u dorosłych 3:00—4:00 szaruchy u dzieci 1:00.

#### *Sposób robienia weierań:*

Przed rozpoczęciem weierań bierze chory kilkakrotną kąpiel, zmywając ciało mydłem, w celu otworzenia ujść gruczołów potnych i łojowych. Przed weieraniem korzystnym jest spocenie się chorego pod przykryciem, co nie powinno nastąpić po skutecznym weieraniu. Bezpośrednio przed rozpoczęciem weierania, osusza się z potu część ciała, w którą ma być weieranie robione.

Przy weieraniu nie należy całą ilość szaruchy mającej być wtartą na raz wetrzeć, lecz ubierać z niej po troszce (wielkości soczewicy) i zajmować jaknajwiększą powierzchnię skóry.

Weieranie odbywa się tak długo, dopóki palec przeprowadzony po miejscu weierania pozostawia smugę jaśniejszą (20—30 minut w jedną połowę ciała).

#### *Miejsce weierań.*

Weierać po  $\frac{3}{2}$  gram. szaruchy w jedną połowę:

- I. dzień obie łydki,
- II. „ oba uda,
- III. „ prawy bok klatki piersiowej i prawa połowa brzucha,
- IV. „ lewy bok klatki piersiowej etc.,
- V. „ plecy (jeżeli nie sam pacjent robi weierania).

Weierań używa się najmniej 20, najwięcej 50.

Prof. Rosner jest zdania, że najrzadziej występują zmiany 3-rzędne, jeżeli się mimo braku recydyw zastosuje po 6 miesiącach powtórne leczenie weieraniami w liczbie 20, a po roku trzeci raz robi się 20 weierań.

Jod używa się w kile 2-rzędnej:

1) Przy równoczesnem zakażeniu żółzowem.

2) Gdy po wyleczeniu zmian kilowych 2-rzędnych na skórze występują na błonach śluzowych, kłykciny sączące.

3) Gdy oprócz zmian na skórze i bł. śluzowych występują zmiany chorobowe w układzie kostnym. Najlepszym przetworem jodu jest:

**SS0.** *Natri jodati* 10:00,

*Aqu. dest.* 200:00.

MDS. 2 łyżki stołowe dziennie (w mleku) zażywać.

**SS1.** *Natri jodati* 10:00,

*Glycerini* 1:00,

*Extr. et pulv. Quassiae aa.*  
*q. s. ut f. pil. N. centum.*

DS. Rano i wiecz. po 5 pigułek.

**SS2.** *Jodoformii subt. pulver.*

2:00,

*Extr. Quassiae q. s. ut f.*  
*pil. N. 20.*

DS. Rano i wiecz. jedną pig.

*Leczenie zmian miejscowych w kile 2-rzędnej.*

Kłykciny sączące stanowiące znaczne nacieki wystające, w stoleu i na częściach rodnych, pędzluje się sublimatem 1:100, w jamie ust sublimatem 1:600 lub kwasem chromowym 2<sup>o</sup>/<sub>o</sub>. Kłykciny z mniejszym naciekiem, płaskie, pozbawione przyskórki, pędzluje się roztworem azotanu srebrowego 1:30; skoro się pokryją przyskórkiem, usuwa się resztę nacieku plastrem



merkuralnym, który się codzien zmienia.

**883.** *Empl. hydrargyri*  
*Empl. saponati* āā. 15'00,  
*Extende supra linteum.*

*Iritis syphilitica.*

Obok leczenia ogólnego wymaga także wczesnego zapuszczenia atropiny, by się synechie nie wytworzyły.

*Psoriasis palmaris et plantaris:*

Okłady wysychające w celu rozmiękczenia i usunięcia przyskórka pokrywającego naciek — ten zaś ostatni ustępuje pod plastrem rtęciowym.

Chrostkowe nacieki skóry głowy i brody, po usunięciu strupów oliwą, naciera się maścią:

**884.** *Mercur. praecipit. albi*  
 2'00,  
*Sublimati corrosivi* 0'10,  
*Vasellini* 20'00,  
*Olei rosarum gtt. tres.*  
 S. Pomada.

*C. Kiła 3 rzędna.*

Wskazania:

W formach lżejszych daje się jod, w cięższych rtęć, a nawet rtęć i jod.

Leczenie miejscowe w kile 3-ciorzędnej:

*Ozaena syphilitica:*

Przeplukiwanie nosa 2% kwasem borowym, słabym roztworem kali permanganicum (0'20:500) i pędzlować roztworem:

**885.** *Jodi puri* 0'20,  
*Kali jodati* 2'00,  
*Glycerini* 20'00.  
 MDS. Zewnętrznie.

*Sarcocele syphilitica.*

Plaster rtęciowy.

*Periostitis.*

Sprowadzająca silny ból wymaga pędzlowania jodem.

**886.** *Trae jodi*  
 „ *Belladonae*  
 „ *Gallarum* āā. 10'00.  
 MDS. Zewnętrznie.

Gdyby ten roztwór drażnił skórę, daje się wtedy do pędzlowania roztwór:

**887.** *Jodi puri* 0'20,  
*Kali jodati* 5'00,  
*Glycerini puri* 20'00.  
 MDS. Zewnętrznie.

*Kilaki skórne.*

Tak wrzodzące jak nie wrzodzące, ustępują pod plastrem rtęciowym. Przy kilakach nie wrzodzących, często nawet wobec już istniejącej fluktuacji może nastąpić resorbeyca, wrzodzące goją się także pod plastrem rtęciowym lub jodoformem.

Zdarzają się przypadki kily, w których ani jod ani rtęć skutków nie wywierają, a to są wypadki ciężkiej złośliwej kily u indywiduów kachetycznych, często przedtem energicznie rządzoną leczonych.

W tych razach w pierwszym rzędzie starać się musimy o poprawienie stanu ogólnego. Działanie to wzmacniające posiada Decoctum Zittmanni. Pod wpływem tego środka poprawia się apetyt, wygląd chorego i waga ciała się zwiększa.

Sposób podawania tego środka jest następujący:

Na czczo w łóżku wypija chorey 300 gramów Decoct. Zittmanni fortius, ciepłego, a tę samą ilość Decoct. Zittmanni mitius chłodnego, po południu.

Przy używaniu tego środka należy unikać wszelkich pokarmów mogących wywołać biegunkę.

U niektórych ludzi po wyleczeniu kily środkami rtęciowymi, rozwija się anaemia i uporczywie się utrzymuje. W przypadkach tych przepisuje się

kąpiele parowe z tuszami, 2 razy na tydzień, lub wysyła się takich chorych do kąpiel siarczanych lub zakładu hydropatycznego (nigdy wobec jeszcze istniejących zmian kiłowych).

## II. Kiła dziedziczna.

W pierwszych czterech tygodniach występującą kiłę, leczę się kąpielami sublimatowymi:

### SSS. Sublimati corross.

*Ammon. muriat.* āā. 2'00,

*Aqu. dest.* 100'00.

MDS. Do jednej kąpeli.

Jeżeli dziecko ma 6 tygodni lub więcej, robi się wcierania z szaruchy.

U dzieci 6-tygod. 0'30 pr. dosi

" " 8 " 0'40 " "

" " 10 " 0'50 " "

" " 12 " 1'0 " "

Usta należy wymywać kwasem borowym 1%.

Mniej pewnie działa według prof. Rosnera Calomel na wewnątrz podany.

### SS9. Calomel. laevigati 0'15,

*Sacchari lactis* 4'00,

*Mfp. Div. in dos. N. XII.*

DS. Rano i wieczór jeden proszek w mleku podać.

Po 6 dniach robi się pauzę, i znów przez 6 dni podaje się Calomel, aż do ustąpienia zmian chorobowych.

Środek ten wywołuje często bardzo katar przewodu pokarmowego, czego wcierania nie czynią.

W ostatnim czasie polecają:

### 890. Hydrarg. thymol. acet. 1'00,

*Glycerin* 10'00,

*Cocain mur.* 0'10.

S. Raz na tydzień wstrzyknięcie wśródmięśniowe, w ilości 10—12 strzykawek.

### 891. Hydrarg. oxydulati nigr. pur. 1'00,

*Ol. olivaceum* 10'00.

S. Co 2-gi dzień strzykawkę (30—40 wstrzyknięć).

### 892. Hydrarg. salicyl. 1'00,

*Paraffin. liquid.* 10'00.

DS. Co 5 dni wstrzyknąć w pośladek.

### 893. Hydrarg. salicyl. 1'00,

*Vasellini* 30'00.

Mfn. S. Na wrzody syf.

### 894. Hydrarg. salicyl. 1'00,

*Magnes carb.* 20'00.

S. Puder.

*Empl. hydrarg. oleinic.*

Plastrem tym pokrywa się ko-  
lejno: przedudzia, ramiona itp.  
większe części na 8 dni, poczem  
kąpiel i nowy plaster.

## Syphilis congenita p. Syphilis.

### Tabes dorsualis.

Jeżeli tabes na tle kiłowym,  
to wciarki i kali jodat.

W innych przypadkach kąpiele  
letnie lub ciepłe, procedury hy-  
dropatyczne, elektryzowanie sto-  
su pacierzowego, prądem galwa-  
nicznym, mniej polecane prą-  
dem faradycznym.

Na wewnątrz Arg. nitricum  
0'01—0'02 w pigułkach, kali jo-  
datum 10:200, Arsen po 0'001,  
Ergotyna po 0'1—0'5 2—3 razy  
dziennie, Fosfor po  $\frac{1}{10}$  miligr.  
do 1 miligr., w rozcżynach olei-  
stych, mały dają rezultat dodatni.

Wieszanie chorego sposobem  
Mocutkowskiego i Charcota ma-  
łe korzyści przynosi.

Zresztą leczenie symptomaty-  
czne zwłaszcza kojenie bólu środ-  
kami narkotycznymi, phenace-  
tina po 0'50 2—3 razy dziennie,  
exalgina po 0'25, 2 do 3 proszków  
na dzień, antipyrina 1'0, 3—4 na  
dzień, wstrzykiwania morfiny.

Chorych zamożniejszych wy-  
słać do Nauheim, Teplitz, Wild-

bad, Ragaz, Pyrmont, Elster, Gastein, I szeczany, Trenczyn.

**895.** *Liniment volatil* 30'00,  
*Chloroform* 20'00.

MS. Do nacierań.

## Taenia.

Leczenie poprzedzić środkiem czyszczącym, zachować dyetę. Polecają dnia poprzedniego pokarmy słone: śledzie, szynkę, sałatę, poziomki. Rano na czczo można nieco osłodzonej czarnej kawy. Po użyciu lekarstwa powinien chory spokojnie leżeć, aby uniknąć wymiotów.

**896.** *Extr. filic. mar.*  
*Pulv. rad. filic. mar. āā.* 10'00,  
*f. l. a. boli* N. 10.  
*Consp. cynamom.*

S. W przeciagu 2 godzin użyć.

**897.** *Ol. Crotonis gttam unam*  
*Chloroform.* 4'00,  
*Glycerin* 30'00.

DS. Użyć na czczo.

**898.** *Extr. filic. mar. aether.*  
8'00,  
*Calomelanos* 0'80,  
*Div. in capsul.* N. XVI.

S. Na czczo co 5 minut kapsułkę w łyżce wody osłodzonej.

Jeżeli po 2 godzinach po użyciu ostatniej kapsułki tasiemiec nie odchodzi, dać 80'0 Syrup aetheris, a gdyby jeszcze po 2 godzinach dalszych nie odszedł podać 40'00 *Ol. ricini* w czarnej kawie.

**899.** *Flor. Koso* 30'00,  
*Kamalaē* 15'00,  
*Extr. fil. mar. aeth.* 4'00,  
*Mel. depur. q. s. f. boli*  
N. 60.

DS. Na wieczór 30, rano 10—20 sztuk użyć.

**900.** *Pelletierin tannic.* 1'00,  
*solve in*

*Infus. sennae* 100'00.

DS W małych dozach użyć w przeciagu 1/2 godziny.

Najlepsza pora do leczenia tasiemca jest wówczas, gdy odchodzą większe kawałki. W czasie osłabienia, ciąży, karmienia, miesiączki, nie należy rozpoczynać leczenia.

Dzieciom przed ukończeniem 1 roku życia nie wolno spędzać tasiemca; również w czasie zabkowania.

**901.** *Extr. filic. mar.* 2—5'00,  
*Mucilag. gum. ar.* 10'00,  
*Syrup simpl.* 15'00.  
MDS. Na 2 razy użyć.

**902.** *Koussini* 0'50—1'00,  
*Extr. filic. mar. aet.* 2—5'00,  
*Pulv. althaeae q. s. f. pasta*  
*div. in dos.* N. 3.  
DS. Co 1/2 godziny doza.

**903.** *Kamal.* 3'00,  
*Pulpae tamarind.* 20'00,  
*Mf. elect.*  
DS. Rano w przeciagu 1/2 godziny na 2 razy użyć.

**904.** *Pelletierin tannici* 0'30,  
*Aqu. dest.* 40'00,  
*Syrup rhei* 10'00.  
MDS. W przeciagu 1/2 godziny na 2 razy użyć.

Po użyciu środków wymienionych należy dać w godzinę 20—30 gramów olejku ryćyn. najlepiej w mocno osolonym rosole.

Skuteczne też bywają nasiona dyni (*Semina cucurbitae maximae*) utarte z cukrem na emulsię (100 gramów), użyć w ciągu dnia, na 2 razy, po 3 godzinach po 2 dawce nieco *ol. ric.* Mirowskich z Ameryki podaje 4—8 grainów (zapewne 0'30 do 0'60) *naphthalinum puriss.* na jednorazową dawkę, poczem: *ol. ric.*



lub

**905.** *Naphthalin* 0'30,

*Ol. ricini* 15'00,

*Ol. Bergamot gtt's duas.*

MDS. Na raz na czczo podać.

**906.** *Strontium lactic.* 20'00,

*Aq. dest.* 120'00,

*Glycerin q. s.*

DS. W pięciu dniach biorąc co rano 2 łyżki, wyżyć.

## Tetanus.

Usunięcie powodów: oczyszczenie ran i wrzodów, wydobycie ciał obcych, odszczepów kostnych.

Wstrzykiwania podskórne w pobliżu rany co 2 godz. 0'02 acid. carbol. Wstrzykiwać morfinę w małych dawkach, chloroformowanie. Chloral w lewatywach lub wewnątrznie z Cognakiem.

**907.** *Sulphonali* 1'00,

*Dtur. tal. dos. N. 5.*

S. 3 do 4 pr. dziennie (rozpuściwszy w 200 gramach herbaty lub rosołu).

**908.** *Urethani* 1'00,

*tal. dos. N. 6.*

2 do 3 razy dziennie proszek we wodzie.

**909.** *Pilocarpin hydrochlor.*

0'10,

*Aqu. dest.* 10'00.

MDS. Do wstrzykiwań (2—3 strzykawek dziennie).

Acid salicyl. w dużych dawkach, kali bromatum 5—10 grm. dziennie.

W razie osłabienia serca, podskórne wstrzykiwanie eteru, kamfory.

**910.** *Antipyrin* 0'50,

*Dtur. tal. dos. N. X.*

DS. Co 3 godziny proszek.

**Tic douloureux zob. Neuralgia trigemini.**

## Tonsillitis.

Podczas gorączki leżenie w łóżku, okłady wysychające na szyję, letnie napoje, płukanki c. kali chlorico. Wczesne nacięcia, gdy się chelbotanie okaże. W cięższych formach połykanie kawałków lodu, mniej płukać.

**911.** *Saloli* 0'50,

*Tal. dos. 15.*

DS. Co 3 godz. proszek.

## Trichinosis.

Środki przeczyszczające: infus Sennae, Calomel, Glycerina co godzina łyżkę. Benzyna w kapsułkach żelatynowych po 0'50 do 5 gramów dziennie.

Bóle mięśniowe łagodzić zastrzyknięciem morfiny, kąpiele ciepłe, wcierania chloroformu.

**912.** *Benzin* 6'00,

*Mucilag. gum. arab.*

*Solut. Succ. liquir. conc.*

*āā. 25'00,*

*Aqu. menth. crisp. 100'00.*

MDS. Co 2 godziny łyżkę.

**912. b.** *Benzoli* 0'50,

*ad capsul. gelat. N. 50.*

Rano na czczo i popołudniu po 5 kapsułek, w godzinę po każdym zażyciu łyżeczkę pulv. rad. rhei et pulvis liquir comp. aa. p. aequ. kuracya ma trwać kilka dni.

## Trismus et Tetanus neonatorum.

Główną uwagę zwrócić na pępek, opatrunek przeciwnilny.

Chloral po 0'05 pro dosi, kilka razy dziennie, w mleku, wlać do nosa lub w lewatywie (w podwójnej dawce), Sulfonal 0'20 p. dosi w lewatywie po każdym napadzie. Sole bromowe po 0'50 na dzień. Continum hydrobromicum (aż do 0'05 pro die). Ciepłe kąpiele 28° R. kilka razy dzien-

nie. Karmić mlekiem, również przez nos. Lewatywy odżywcze z mleka po 50 ctm. sześć. co 2 godziny.

### **Tuberculosis laryngis.**

Dobre żywienie, szanowanie głosu, unikać pyłu i t. p. szkodliwości. Zaraz z początku cierpienia kreozot do wewnątrz, prócz tego żelazo, arsen; zamownych wysłać na zimę na południe na Riviere, do Wenecyi, Kairu, w lecie Görbersdorf, Davos.

**913.** *Resorcin* 5'00,

*Aqa. dest.* 500'00.

S. Do inhalacji.

**914.** *Jodoformii* 2'00,

*Acid. borici* 1—8'00.

S. Do wdmuchiwań.

**915.** *Morphii muriat.* 1'00,

*Pulv. gum. ar.*

*Sacch. lactis* 3—5'00.

S. Do wdmuchiwań.

**916.** *Cocain muriat.* 1'00,

*Sacch. lactis* 2'00.

S. Do wdmuchiwań.

**917.** *Cocain mur.* 0'50—1'00,

*Aqu. dest.* 10'00.

S. Do pędzlowań.

**918.** *Acidi lactici* 20'00,

*Aqu. dest.* 20—40—80'00.

S. Do pędzlowań.

### **Tuberculosis pulmonum.**

W przypadkach dziedzicznie obciążonych, należy zwrócić całą uwagę na higieniczne wychowanie, przebywanie jak najwięcej na świeżem powietrzu, gimnastyka, wysypianie się, dobre odżywianie, nie obciążanie pracą umysłową lub fizyczną, unikanie zaziębień, hartowanie skóry przez zimne nacierania słoną wodą, zwłaszcza: szyi i klatki piersiowej.

W pierwszych początkach suchot przedewszystkiem uważać na podniesienie odżywienia cho-

rego, forsownie go żywić. Polecieć picie mleka w lecie, tranu w zimie, tłuszczów jak najwięcej, o ile tylko żołądek znośi. Pobyt kilkomiesięczny w górskim powietrzu podczas lata, na zimę zaś polecieć wyjazd do jednej ze stacyj klimatycznych.

Ze środków leczniczych stosować kreozot, guajakol, arsen, zresztą leczenie symptomatyczne jak przy bronchitis.

W późniejszych okresach obok powyższych poleceń pilnie uważać na pojawiające się krwioplucia i stosownie je wstrzymywać. Zmniejszać wydzielanie płwocin przez środki balsamiczne, usuwać gorączkę przez podawanie miernych dawek antypiretyków, jak antypiryny po 0'50, 2—3 proszki na dzień, w razie potrzeby. Toż samo phenacetyny lub antifebriny po 0'25.

Usuwanie mocnych potów przez zmywanie ciała winnym octem, cognakiem, wodą kolońską lub na wewnątrz cognac z mlekiem, lub atropina po 0'001 na noc, Agaricin bardzo słabo działa.

**919.** *Acidi agaricin* 0'01—0'05,

*Sacchari* 0'30,

*Mfp. dtur. tal. dos.* X.

S. 2 proszki dziennie.

**920.** *Extr. fluid. hydrast. Canad.* 10'00.

S. Na wieczór 30 kropli.

W razie krwotoków bezwzględny spokój, okład lodowy na piersi, polykanie lodu, pokarmy tylko chłodne, wstrzyknięcie Ergotini Bombelon 0'50 do 1'0 na raz, podanie większych dawek morfiny dla zapobieżenia kaszlowi.

Przy tętnie przyspieszonym dać: *Fol. Digitalis* 0'05 z morfiną 0'01 co 2—3 godz. proszek.

W ciężkich przypadkach krwotoku, wstrzyknąć atropinę (0'10:

10:0) z tego pół strzykawki na raz, lub Acid. sclerotinici 1:10: wody, z tego co godzinę strzykawkę.

Przeciw biegunce leki osłaniające z dodatkiem opiatów:

**921.** *Plumb. acet.*

*Laudani āā. 0·03.*

*Mfp. dtur tal. dos. 10.*

S. 2—3 razy dziennie.

Pigułki kreozotowe używać bez balsamu tolutańskiego. Dziennie można dojść do 3 grm.

Z wyrobów krajowych. pigułki Beldowskiego i Mańkowskiego, z zagranicznych dobre są Jaspersa (Berlin). W rozczy nie dobrze jest zapisywać kreozot z Tra amara lub Tra gent.

**922.** *Kreozoti e bit. fagi 3·00,*

*Trae gent. 30·00.*

DS. Po jedzeniu 20—30 kr. w kieliszku wody lub wina.

**923.** *Kreozoti e bit. fagi 1·00,*

*Trae gent. 2·50.*

*Spir. vini rectif. 25·00,*

*Vini Xerens 100·00.*

DS. 3 razy dziennie po łyżeczce w szklance wody.

**924.** *Benzosol 0·25,*

*Tal. dos. N. 20.*

S. 4—6 proszków dziennie (u osób, które kreozotu nie znoszą).

Pigułki guajakolowe po 0·05 wyrobu Beldowskiego i Zachradnika, w tych samych dawkach co kreozot.

U dzieci: Niedozwalać suchoćnikom karmić dzieci, zmywania chłodne, na lato pobyt w górzystej lesistej okolicy. Przeciw gorączce Chinin (0·25—0·30) Acid. salicyl. 0·25 pro dosi.

**925.** *Acid. salicyl. 2·00,*

*Aqu. dest. 100·00,*

*Cognaci 5·00,*

*Syrup 20·00.*

DS. Co godzinę łyżeczkę.

**926.** *Kreosoti gtts. 5,*

*Aqu. dest. 70·00,*

*Syrup 15·00.*

DS. Co 3 godziny łyżeczkę.

**927.** *Kreosoti 1·50,*

*Solv. in Ol. amygd. 30·00,*

*Gu. ar. 20·00,*

*Aqu. dest. 80·00,*

*Syr. amygd. 20·00.*

*Mf. emuls.*

DS. 2 razy dzien. łyżeczkę.

**928.** *Guajacol 1·00,*

*Trae chinae 2·00,*

*Vini Malac. 100·00.*

MDS. 3 razy dziennie łyżeczkę po jedzeniu.

**929.** *Guajacol 2·00,*

*Spir. vini rectif.*

*Aq. menth. pip. āā. 50·00,*

*Ol. jecor. 50·00.*

MDS. Skłóciwszy, 4 razy dziennie podać łyżeczkę.

W razie krwioplucia: spokój, lodowe okłady na klatkę piersiową.

Plumb. acet. (0·03 pr. dos.) kilka razy dziennie.

Extr. secal. cornuti, przy kaszlu Codeina, morfina. W razie biegunki Aq. Calcis z mlekiem.

## Tumor albus.

W pierwszym okresie zaleca się absolutny spokój kończyny zajętej, staw należy ustalić w położeniu prawidłowym, (opatrunk gipsowy lub organtynowy).

Kąpiele słone lub słono-jodowe ułatwiają osiągnięcie wyniku korzystnego. W przypadkach dalej posuniętych, ograniczamy się u dzieci, do operacyj mniejszych atypowych (wyskrobanie tkanek schorzałych Arthrotomia), w wieku zaś późniejszym zmuszeni zwykle jesteśmy decydować się na resekcję stawu, a często i amputację.

Główny nacisk w tego rodzaju chorobach należy położyć na



poprawę ogólnego stanu odżywienia.

### Tyloma. Modzel. Clavus. Od-cisk.

Zeskrobać zgrubiałą warstwę, wypuścić ropę, opatrzyć, później maść lub plastry.

**930.** *Acid. salicyl.* 5'00,  
*Collodii* 50'00,  
*Extr. canab. ind.* 1'00.

MDS. Przez kilka dni pędzlować.

**931.** *Praecipit. albi*  
*Zinci oxyd. āā.* 2'00,  
*Ungu. simpl.* 20'00.  
S. Maść na modzele.

**932.** *Empl. Diachyl.* 15'00,  
*Aeruginis*  
*Camphorae āā.* 1'00.  
Mf. emplastrum.

Plaster turystów (Touristenpflaster).

### Typhlitis et Perityphlitis.

Leczenie zewnętrzne polega na stosowaniu środków przeciwpalnych i odwodzących, okład lodowy, pijawki, smarowanie jodyną. W przypadkach, gdy chory nie znosi okładów lodowych — okład wysychający.

Wewnętrznie przetwory mawkowca, a w razie gwałtownych bólów, podskórne wstrzyknięcie morfiny. Dyeta wyłącznie płynna, bezwzględny spokój.

Gdy okres zapalenia minie, środki przyspieszające wessanie wypociny są wskazane, więc: okłady ciepłe, wcierania maści jodowych. Jeżeli stolce w tym okresie dobrowolnie nie nastąpią, należy je ułatwić za pomocą lewatyw. Zresztą leczenie czysto przypadkowe, w razie silnych wymiotów, kawałki lodu do polykania, Cocainą.

W razie zapadu napoje wyskokowe, eter podskórnie.

**933.** *Trac. opii simpl.* 10'00.

DS. 3 razy dziennie po 5—10 kropli.

**934.** *Extr. opii* 0'02,  
*Sacchari albi* 0'30,  
*Dent. t. dos.* XII.

DS. 3 proszki dziennie.

W razie silnych wymiotów:

**935.** *Cocain muriat.* 0'20,  
*Aqu. dest.* 10'00.

MDS. W razie wymiotów 10 kropli zażyć.

**936.** *Morphii mur.* 1'00,  
*Spir. vini* 5'00,  
*Glycerin* 10'00,  
*Aq. dest. ad* 30'00.

DS. Do podskór. wstrzykiwań (Rozczyn bardzo trwały).

Jako przyspieszające wessanie:

**937.** *Ung. Kali jodati* 25'00.  
DS. Do wcierania.

**938.** *Kali jodati* 2'00,  
*Extr. bellad.* 0'50,  
*Ung. simpl.* 30'00.  
MDS. Do wcierania.

W razie parcia na stolce lub mocz:

**939.** *Morph. mur.* 0'20,  
*Butyri Cacao* 10'00,  
*Mf. l. a. supposit.* N. X.  
S. 2—3 na dobę użyć.

### Typhus.

Leczenie przypadkowe, polegające na zwalczaniu zagrażających objawów. Przy pierwszym podejrzeniu na T. abd. purgans, najlepiej Calomel po 0'50 2—3 dawki aż do skutku.

Gorączkę należy obniżać za pomocą chłodnych zmywań całego ciała, wodą czystą lub z dodatkiem octu, letniemi kąpielami i środkami przeciwgorączkowymi, ale ostrożnie.

Skrzeplone akcje serca napojami wysokowymi, a gdy te nie są dostateczne, środkami nasercowymi.

W razie silnej biegunki, przetwory makowca i środki ściągające; w razie zaparcia stolca w pierwszym okresie choroby, środki czyszczące, w późniejszych okresach lepiej lewatywy stosować.

W razie krwotoków jelitowych okład lodowy na brzuch i środki przeciwkrwotokowe.

Przytem należy pamiętać o należytem przewietrzaniu mieszkania, dezynfekcyi stołców i bielizny. Dyeta powinna być wyłącznie płynna, zwłaszcza mleko, rosół, wino czerwone.

W razie nieżytu oskrzeli, bańki suche.

**940.** *Chinin. mur. 0'40,*  
*Dtur. tal. dos. XII.*  
S. 2—5 pr. dziennie.

**941.** *Natr. salicyl 5'00,*  
*Aqu. dest. 200'00,*  
*Syr. simpl. 15'00.*  
DS. Co 2 godziny łyżkę.

Gdy chodzi o znaczne obniżenie ciepłoty ciała:

**942.** *Antipyrin 0'50,*  
*Dtur. tal. dos. X.*  
DS. Co godzinę proszek aż do obniżenia ciepłoty.

**943.** *Phenacetin 0'50,*  
*Dent. tal. dos. X.*  
DS. Co godzinę proszek aż do obniżenia ciepłoty.

Dzieciom niepodawać antypiryny ani Antifebriny, lecz w razie gorączki znacznej:

**944.** *Chinin mur. 0'15,*  
*Sacchari 0'50,*  
*Mfp. dtur tal. dos. 10.*  
S. 3 proszki dziennie.

lub:

**945.** *Thallini sulphur. 1'00,*  
*Aq. dest. 80'00,*  
*Syr. flor. aur. 10'00.*  
MDS. Co godzinę łyżeczkę  
(dla dziecka 3-letniego).

W razie silnej biegunki:

**946.** *Decoct. salep 0'50 ad 200'00,*  
*Trae opii simpl. gtts. 10,*  
*Syr. rub. Idei 15'00.*  
DS. Co godzinę łyżkę zażyć.

**947.** *Chinin mur. 2'00,*  
*Pulv. Doweri 3'00,*  
*Mfp. div. in dos. XII.*  
DS. 3 proszki dziennie.

**948.** *Mixt gum. 200'00,*  
*Extr. Laudani aquos 0'10.*  
MDS. Co godzinę łyżkę.

**949.** *Naphthalini 0'20,*  
*Mag. Bism. 0'15,*  
*Chinin sulph. 0'25,*  
*Mfp. tal. dos. 15.*  
S. 3 proszki dziennie.

W razie zapadu:

**950.** *Camphor. trit. opt.*  
*alcohol. 0'05,*  
*Coffeini natrosalicyl. 0'10,*  
*Chinini mur. 0'20,*  
*Mfp. Dent. tal. dos. XII.*  
DS. 4—5 proszków dziennie.

**951.** *Naphtol-B*  
*Bismuth. salicyl āā. 0'20.*  
Mfp. S. 10 proszków na 24 godziny w razie biegunki.

**952.** *Naphtol-B*  
*Magnes. salicyl āā. 0'20.*  
S. ut supra.  
(w razie zaparcia stolca).

Nareszcie w razie silnego podrażnienia mózgu:

**953.** *Natri bromati 0'50,*  
*Sacchari 10'00.*  
Rozpuściwszy we wodzie, wypić w ciągu dnia.

**954.** *Camphor. 0'50,*  
*Chloralhydrat. 1'00,*  
*Aqu. dest. 60'00,*  
*Vitell. ovi unius.*  
S. Co 2 godziny łyżeczkę.

**Typhus exanthematicus.**

według tych samych prawideł.

Dzieci małe karmić wyłącznie piersią, lub odpowiednio roz-

cieńczonem mlekiem, starsze dostają herbatę z mlekiem, rosół z jajem.

Gdy gorączka ustaje Cacao, rosół z tapioką.

Pragnienie gasić kwaskami (Ac. mur., Ac. phosphoricum 1:200 — z syropem, co godzinę łyżeczkę) przemywać usta 3% boraxem.

Na początku choroby Calomel — przeczyszczyć (0.02—0.05 pro dosi).

Ze środków przeciwgorączk.

Chinin 0.25—0.50 do wewnątrz lub w lewatywie, Antipyrin (1:120 z dodatkiem Cognacu 10.0) co 2 godziny łyżeczkę.

W razie czyszczenia:

*Chinin. tannic. 0.15 p. dosi.*

Przeciw krwotokom: okład lodowy na brzuch, liquor ferri sesquichl. ergotin.

Przeciw bezsenności, rzucaniu się — lewatywy z chloralu (1—2.0 na dawkę).

W razie osłabienia serca, stygnięcia kończyn: czarna kawa z Cognakiem, eter podskórnice, szampan.

## Ulcera.

Przy wrzodach cuchnących i zgorzelinowych najlepiej nadaje się posypka jodoformowa i zmywania kreoliną. Z maści zalecają się jodoformowa, arystolowa, a gdy się wrzód zupełnie oczyści, maść lapisowa, borowa, cynkowa. Na wrzody kiłowe należy stosować maść rteciovą, przeciw wrzodom skrofalicznym najlepiej i najpewniej użyć ostrej łyżki, a następnie ranę leczyć jodoformem. Płaskie wrzody rakowe można usunąć przez wyskrobanie i następne przypalenie ługiem potasowym (po poprzednim zatamowaniu krwotoku).

Rozległe wrzody wymagają dość często zabiegu operacyjnego

(okrojenie, transplantacja przyskórka, operacje plastyczne lub wreszcie amputacja). Przeciw wrzodom żyłkowym należy radzić noszenie opaski gumowej Martina.

**955** *Creolin* 20.00.

S. Kilka kropli do szklanki wody.

**956.** *Jodoform*

*Sacch. lact. āā. 5.00.*

S. Zewnętrznie.

**957.** *Jodoformi* 2.00,

*Ungu. simpl. 20.00.*

Mf. ungu. S. Maść.

**958.** *Aristol* 1—2.00,

*Ungu. simpl. 20.00.*

\* **958.** *Dermatol* 10.00,

*Vaselin* 90.00.

Mfung. S. Maść.

*Dermatol* 10.00,

*Talci* 50.00,

*Amyli* 10.00.

Mfp. S. Do posypywania.

**959.** *Argent. nitr.* 1.00,

*Bals. peruv.* 10.00,

*Ungu. simpl.* 100.00.

Mf. ungu. S. Maść.

**960.** *Ac. boric.*

*Ol. olivar.*

*Cerae alb. āā. 15.00,*

*Ungu. simpl.* 100.00.

Mf. ungu. S. Maść.

**961.** *Zinc. oxyd.* 10.00,

*Ungu simpl.* 80.00.

Mf. ungu. S. Maść.

**962.** *Kali caust. in bac. fus.*

5.00,

*D. in vitro epistom. vitro clauso.*

## Ulcus contagiosum. (Wrzód miękki).

Zasada jest, by wrzód miękki zamienić na ranę czystą; środków żrących nie należy używać: jeśli gruczoły limfatyczne są bolesne lub gdy do wrzo-



du przystąpiła dyfterya lub fagedenizm. By wrzód zamienić na ranę czystą, używa się środków żrących, z których najlepszym jest sulfas cupri 1:3 lub jednorazowe przyłożenie na 24 godzin:

**963.** *Zinci chlorati* 5·00,  
*Zinci oxydati*  
*Aq. dest. āā.* 5·00.  
Mf. Pasta.

Wypalanie tym rozczynek powtórzyć należy w odstępach 3 godzinnych 3 do 4 razy. Po odpadnięciu strupa w przeciągu 24—48 godzin pokazuje się dno czyste, wtedy zasypuje się jodoform, który, mając na względzie bezwonnosc, może zastąpić: dermatol, jodol, euophen, aristol (wszystkie te środki używają się in substantia). J. Koch zaleca Hdr. Soziodolicum w maści 1%. Gdy po pewnym czasie dno czyste, brodawkowe, ropy nie wydziela, przykładają się maść z azotanu srebrnego.

**964.** *Nitratis argenti* 6·10,  
*Balsam. peruv.* 1·00,  
*Vaselin. flav.* 10·00.  
Mf. ungu. S. Maść.

Fagedenizm i dyfterya.

Środków żrących się nie używa, lecz oczyszcza się dokładnie wrzód wodą borową 2% lub sublimatem 1:1000 2—3 razy dziennie i zasypuje jodoformem. Jeżeli przyczyną tych komplikacji jest kacheksja lub anaemia, należy używać odpowiednich środków wewnętrznych obok leczenia miejscowego.

**Ulcus corneae, (zob. Keratitis).**

**Ulcera intestini tuberculosa.**

Leczenie czysto przypadkowe, polega na podawaniu środków odurzających wewnętrznie lub

w postaci wstrzykiwań podskórnych. W razie silniejszych bólów na podawaniu przetworów makowca wraz ze środkami ściągającymi i przeciwnieżylnymi z powodu zwykle towarzyszącej biegunki. Przytem należy starać się podnieść odżywienie chorego zapomocą odpowiedniej diety.

**965.** *Tinct. opii simpl.* 10·00.  
DS. 2—3 razy dnia po 5—10 kropli.

**966.** *Laudani puri* 0·02,  
*Tannini* 0·10,  
*Naphtalini* 0·25,  
*Sacch. alb.* 0·30,  
*Mfp. dent. tal. dos.* XII.  
DS. 2—3 proszki dziennie.

**967.** *Extr. opii* 0·02,  
*Resorcini* 0·20,  
*Sacch. alb.* 0·30,  
*Mfp. dent. tal. dos.* XII.  
DS. 2—3 proszki dziennie.

**Ulcera laryngis syphilitica.**

Leczenie ogólne przeciwkłowe. W dysfonii przy kile drugorzędnej:

**968.** *Kali jodati* 10·00,  
*Kali brom.* 20·00,  
*Aqu. dest.* 200·00,  
*Syrup cort. aur.* 100·00.  
S. 2 łyżki dziennie.

**969.** *Calomelanos* 1·00,  
*Pulv. gummosi* 5—10·00.  
S. Do wdmuchiwania.

**970.** *Sublimati* 0·20,  
*Aqu. dest.*  
*Spir. vini āā.* 20—50·00.  
Do pędzlowań.

**971.** *Jodi puri* 0·50,  
*Kali iod.* 1·00,  
*Glycerini* 50·00.  
S. Do pędzlowań.

**Ulcus ventriculi. Wrzód żołądka okrągły.**

Przy świeżym wrzodzie zalecić ścisłą dietę, okłady lodowe

na żołądek, spokój bezwzględny, opium. Dalsze leczenie polega na podawaniu środków alkalicznych, czy to w postaci wód mineralnych, czy też soli alkalicznych.

Korzystne wyniki leczenia dają przepłukiwania wodą karlsbadzką lub rozczyinami soli karlsbadzkiej prawdziwej lub sztucznej, które mają i tę zaletę, że je stosować można i w razach, gdzie picie wody karlsbadzkiej z innych powodów jest przeciwwskazaniem. W razie silnych bólów lub wymiotów są wskazane środki odurzające, w razie krwotoków żołądkowych postępowanie lecznicze jak przy Haematemesis. Obok tego postępowania leczniczego dyeta powinna być pożywna a lekko strawną z wykluczeniem wszelkich napoi wysokowych lub CO<sub>2</sub> zawierających, kwasów, tłuszczów i pokarmów korzennych. Gdy chorego z powodu silnych bólów, gwałtownych wymiotów lub żołądkowych krwotoków nie można stosownie żywić, wskazane są lewatywy odżywcze.

Często towarzyszące zaparcie stolca usuwać należy lewatywami.

**972.** *Sal. therm. Carolin.* 100·00.

DS. Co dzień na czczo łyżeczkę w  $\frac{1}{2}$  szklanki letniej wody zażyć.

**973.** *Natr. bicarb.*

*Magn. ustae aa.* 15·00.

MDS. 3—4 razy dziennie na koniec noża zażyć.

**974.** *Natr. bicarb.* 5·00,

*Morph. mur.* 0·10,

*Mfp. div. in dos.* XII.

DS. 3 proszki dziennie.

**975.** *Morph. muriat.* 0·10,

*Aqu. laurocer.* 10·00.

DS. W razie bólów 10 kropli zażyć.

**976.** *Codeini* 0·02,

*Natr. bicarb.* 0·50,

*f. p. dent. t. dos.* XII.

S. 2—3 proszki dzien. zażyć.

**977.** *Magister. bismuth.* 5·00,

*Codeini* 0·20,

*Mfp. div. in dos.* X.

S. 3 proszki dziennie.

**978.** *Morph. mur.* 0·10,

*Aqu. dest.*

*Glycerini aa.* 5·00.

MDS. Do podskórnych wstrzykiwań. W jednej strzykawce 0·01 morfiny.

## Uraemia.

Starszym, dobrze odżywionym, mierny upust krwi, dzieciom kilka pijawek za uszami. Zimne okłady na głowę, środki silnie czyszczące. Lewatywy z octu i wody. W razie silnych, długotrwałych drgawek, lekkie zachloroformowanie, lewatywy z chlorału. Jeżeli są objawy zapadu, tętno szybkie, nieregularne, kończyny chłodne, wino, camphora podskórnio, kąpiel ciepła (30° R.) i zawijanie w koce. Pilocarpin (0·005—0·01) 2 razy dziennie, jednak ostrożnie, bo czasem wywołuje zapad.

**979.** *Chloral hydrat.* 3·00,

*Aqu. dest.* 150·00.

S. Do lewatywy (starszym).

Dzieciom 0·50—1·0:50·0.

## Urticaria.

Usuwać przyczyny wywołujące; z zewnętrznych: ukąszenie owadów, płuskiwy, uwzględnić nieżyty żołądka, zaburzenia płciowe i t. d.

Zmywania zimną wodą, pudrowanie, kąpiele z dodatkiem sody, alunu, sublimatu, watroby siarczanej. W celu usunięcia świądu: zmywanie octem, eterem, 1—2% kw. karbolowym.

**980.** *Spir. lavand.* 100'00,  
*Spir. vini gall.* 150'00,  
*Aether. sulphur.* 2'50,  
*Aconitini* 1'00.

MDS. Do nacierań.

**981.** *Chloralhydrat* 5'00,  
*Aqu. laurocer.* 50'00,  
*Aqu. dest.* 20'00.

DS. Do nacierań.

**982.** *Chlorali hydrat.* 8'00,  
*Acidi borici* 12'00,  
*Aq. dest.* 400'00.

S. Do nacierań skóry.

**983.** *Chinin. muriat.*  
*Ergotin. āā.* 0'05,  
*Extr. bellad.* 0'002,  
*Glycer. q. s. f. pil. 1. tal. N. 10.*

DS. Co 3 godziny pigułkę.

**984.** *Tinct. strophanti* 10'00.

S. Dwa razy dziennie po 10 kropli.

## Vaginismus.

Usunięcie zmian chorobowych miejscowych jak owrzodzeń, zapalenia i t. d. jeżeli się znachodzą. Poprawa stanu ogólnego i podawanie środków uspakajających ustrój nerwowy. Gdy objawy niezbyt jeszcze gwałtowne a przyczyną choroby jest niedokładny stosunek płciowy, wpływ moralny, środki znieczulające miejscowo, aby umożliwić coitum.

**985.** *Cocaini muriat.* 1'00,  
*Aqu. dest.* 3'00,  
*Spir. vini rect.* 2'00.

DS. Do pędzlowania  
 albo:

**986.** *Extr. bellad.* 1'00,  
*Vaselini* 15'00.

Mf. ungu. DS. Na wacie między wargi na noc zakładać. Zasypywanie jodoformu. — Rozszerzanie powolne wnijścia pochwowego rozszerzaczami.

Jeżeli przypadki gwałtowne: wycięcie błony dziewiczej i nagle rozciągnięcie wnijścia pochwowego sposobem tępym po poprzednim zachloroformowaniu chorej.

## Variola.

W okresie zwiastunów, przeczyszczenie. Przewietrzać pomieszkowanie, ciepłota pokoju 14—15° R., lekkie przykrycie chorego, dyeta pożywna płynna, mleko, mocny rosół z żółtkiem. Dużo wody, orszada, woda z winem. Przeciw bólowi głowy lodowe okłady. Napięcie skóry łagodzić smarowaniem tłuszczów (oliwa, vaselina, 5% maść borowa). Kąpiele ciepłe, a gdy to niemożliwe, zmywania ciepłą wodą, zwłaszcza twarz i powieki. Płukanie: 2% Kali chloricum, 3% kw. borowy.

**987.** *Kali chloric.* 5'00, *solve in*  
*Infus. flor. tiliae* 300'00,  
*Trae laudan.* 1'00,  
*Mell. rosati* 10'00.

DS. Płukanie.

**988.** *Tannin. puri* 1'00,  
*Alumin.* 0'50,  
*Kali bromat.* 5'00,  
*Mucilag. gum. ar.* 25'00,  
*Aqu. dest.* 200'00.

DS. Płukanie.

Przeciw wymiotom pigułki lodawe lub wstrzyknięcie morfiny w okolicę dołka podsercowego.

W razie bezsenności:

**989.** *Chloralhydrat* 5'00,  
*Aqu. dest.* 50'00,  
*Syrup rubid.*  
*Mucilag. gum. ar. āā.* 20'00.

DS. Połowę na raz użyć.

**990.** *Sulfonali* 1'00,  
*Dtur. tal. dos. N. 5.*  
 S. Na noc proszek w herbacie lub rosole.

Zaraz po wybuchu wysypki dać na głowę, twarz i szyję



maskę z płótna, pozostawiwszy otwory na nos, oczy i usta, posmarowaną pastą:

**991.** *Acid. carbol* 3'00,  
*Amyli*  
*Ol. amygdal. dulc. āā.* 50'00.

Resztę ciała smarować często:

**992.** *Acid. salicyl* 3'00,  
*Amyli* 30'00,  
*Glicerini neutr.* 70'00.  
Mf. Pasta.

A oprócz tych środków:

**993.** *Ol. amygd. dulc.* 15'00,  
*Syrup flor. aurant.* 30'00,  
*Aqu. lauroc.* 10'00,  
*Chinin. hydrochlor.* 0'50,  
*Solve in acid. hydrochlor. q. s. f. emulsio.*  
S. Co kwadrans do 1½ godz.  
po kilka kropli (Levitaner  
z Konstantynopola).

Wstrzymuje też rozwój wysypki Cocaina, jużto 3—4 wstrzyknięcie podskórnych roztworem 20/0, już też (0,20:125 mixt. gum.) w przeciągu 24 godzin podana. Ciepłota ma spadać szybko i rozwój wysypki ustaje.

W osłabieniu serca: kamfora, wino, cognac na pół z wodą z żółtkiem i cukrem, co godz. łyżkę. Równie wcześnie otwierać.

## Verucca.

Najlepiej wyciąć nożyczkami lub wypalić c. acido nitrico fumanti, ferro sesquichlor., solutione Plenckii (Rp. Sublimati corrosivi, aluminis, cerussae, camphorae, spiritus vini aa 5,00) lub kw. octowym. Do wewnątrz podawać arsen 3 razy dziennie po 2 krople.

**994.** *Acid. salicyl.* 5'00,  
*Acid. boric.* 10'00,  
*Calom.* 30'00.

DS. 3 razy dziennie wetrzeć w brodawkę.

## Vitia Cordis.

Stosowne żywienie, mleko, mięso bez korzeni, osobom chudym więcej tłuszczów, otyłym tychże zabronić.

Wzbronione również napoje wyskokowe, prócz lekkich win. Ruch, a mianowicie po równi, lub po miernych wzniesieniach gór, z wyjątkiem, gdy chorzy dostają duszności, zawrotów głowy, lub nieregularności tętna, gimnastyka lecznicza, kąpiele solne letnie. Unikać wstrząszeń. Uregulować stolec.

Wobec braku kompensaty:

**995.** *Infus. digitalis e* 1'00  
ad 150'00,  
*Syrup simpl.* 20'00.  
MDS. Co 2 godz. łyżkę.

**996.** *Trae digital.* 2'50,  
*Aqu. lauroc.* 8'00.

MDS. 3 razy dz. po 15 kropli.

**997.** *Pulv. fol. digitalis*  
0'50—1'00,  
*Sacchari* 3'00,

*Mfp. div. in dos. N. 10.*

S. Co 2 godziny proszek.

Jeżeli po użyciu Digital. tętno mocniejsze, regularniejsze, ilość moczu większa, to przestać na parę dni podawać.

**998.** *Trae strophanti*  
*Aqu. lauroc. āā.* 10'00.

S. 3 razy dzien. po 10 kropli  
(Dzieciom od 5—10 lat do 5 kropli dziennie).

**999.** *Coffeini citrici* 0'50,  
*Dtur. tal. dos. N. X.*

S. Rano i w południe proszek  
Na noc nie podawać, aby nie wywołać bezsenności.

**1000.** *Coffeini natro-benz.* 1'00,  
*Sacchari* 3'00,  
*Mfp. div. in dos. 10.*  
S. 3 proszki dziennie.

**1001.** *Theobromin natro-benz.*  
0·10,

*Sacchari albi* 0·20,

*Mfp. d. tal. dos.* 20.

S. Co 2 godziny proszek.

**1002.** *Trochisci Nitroglycerin*  
à 0·001,

*Tal. dos.* 10.

S. W razie napadu duszności  
osłabienia akeyi serca  $\frac{1}{2}$ —1  
pastylki.

**1003.** *Infus. adonis. vern.* e 5·00,  
ad 180·00,

*Syrup rubid.* 200·00.

S. Co 2 godziny łyżkę.

**1004.** *Sparteïn. sulphur.* 0·10,  
*Aqu. dest.* 180·00,

*Syrup sacchar.* 20·00.

MDS. Co 2 godziny łyżkę.

Przeciw puchlinie (zob. ascites)  
nacięcia obrzęklej skóry, jużto  
lancetem lub małym trójkątce,  
po czem opatrunek aseptyczny.  
W razie duszności, gorczyzniki  
na okolicę serca, moczenie nóg  
w gorącej wodzie, wstrzykiwanie  
morfiny, w razie silnego bicia  
serca blaszanka z zimną wodą  
na okolicę serca.

**1005.** *Tinct. lobeliae* 5·00,

*Aqu. lauroc.* 10·00.

DS. Co godzinę 10 kropli.

Przy objawach obrzęku płuc:

**1006.** *Inf. flor. arnicæ* e 7·50  
ad 150·00,

*Liquor ammonii anis.* 2·00,

*Syrup aurant.* 15·00.

MDS. Co godzinę łyżkę.

**1007.** *Flor. benzoës* 2·00,

*Camphor.* 0·50,

*Sacchar.* 3·00,

*Mfp. div. in dos. N.* 10.

S. Co 3 godziny proszek.

Na pobudzenie apetytu, środki  
gorzkie (*Tra amar. Tinct. chin.*  
*comp.*) acid. mur. Przy omdle-  
niach, zawrotach głowy skut-  
kiem anaemii mózgu, wino, eter.

## Vulnus.

Rane należy wmyć jednym  
z podanych niżej rozczyńców  
przeciwgnilnych i to tem ener-  
giczniej, im większe podejrze-  
nie na zanieczyszczenie. Części  
obumarłe najlepiej od razu usu-  
nać. Naczynia krwawiące należy  
pódwiązać, okłóć itp. a ranę,  
o ile to jest możliwem i w da-  
nym przypadku dozwołonem,  
zespoić zapomocą szwów po e-  
wentualnem założeniu szachków.  
Na wierzch należy położyć opa-  
trunek przeciwgnilny a całą  
część chorobą dotkniętą, wedle  
możności ustalić.

Wobec ran postrzałowych na-  
leży się w zasadzie ograniczyć  
do desinfekeyi okolicy rany i  
pokrycia jej opatrunkiem prze-  
ciwgnilnym.

**1008.** *Ac. carbol.* 10—50 00,

*Aqu. dest.* 1000 00.

S. Woda karbolowa 1—5‰.

**1009.** *Sublim. corros.* 1·00,

*Aqu. dest.* 1000·00.

S. Sublimat 1‰.

**1010.** *Sublim. corros.* 1·00,

*Acid. tartar.* 5·00,

*Aqu. dest.* 1000·00.

S. Rozczyn kwaśny subl. 1‰.

**1011.** *Aseptol* 30—50·00,

*Aqu. dest.* 1·00·00.

S. 3—5‰ rozczyń aseptolu.

**1012.** *Zinc. chlorat.* 80·00,

*Aqu. dest.* 1000·00.

S. 8‰ rozczyń chlorku cynku.

**1013.** *Thymol.* 1·00,

*Aqu. dest.* 1000·00.

S. Rozczyn tymolu 1‰.

**1014.** *Ac. salicyl.* 3·00,

*Aqu. dest.* 1000·00.

S. Przed użyciem ogrzać.

**1015.** *Acid. boric.* 30—40·00,

*Aqu. dest.* 1000·00.

S. 3—4‰ rozczyń kwasu bo-  
rowego.

**1016.** *Creolin* 20'00.  
S. Kilka kropli do szklanki wody.

**1017.** *Jodoform* 5'00.  
S. Do posypywania ran.

**1018.** *Jodoform*  
*Sacchar. lact. āā.* 5'00.  
S. Do posypywania ran.

**1019.** *Jodoform* 2'00,  
*Collod.* 20'00.  
S. *Collodium jodoformowe.*

**1020.** *Jodol* 1'00,  
*Aeth. sulph.* 5'00,  
*Collod.* 10'00.  
S. *Collodium jodolowe.*

**1021.** *Jodoform* 2'00,  
*Aeth. sulph.* 20'00.  
S. *Eter jodoformowy.*

**1022.** *Jodoform* 2'00,  
*Glycerin* 20'00.  
S. *Zawiesina jodoformowa.*

**1023.** *Jodol* 2'00,  
*Aeth. sulph.* 20'00.  
S. *Eter jodolowy.*

Na rany pokryte czystą ziarniną, stosujemy masę lapisową:

**1024.** *Argent. nitr.* 1'00,  
*Bals. peruv.* 10'00,  
*Ungu. simpl.* 100'00.  
Mf. ungu. S. *Maść.*

Opatrunek przeciwgnilny składa się z gazy antyseptycznej (jodoformowej, jodolowej, sublimatowej lub t. p.) z warstwy wysajającej (wata Brunsa, wełna drzewna, worki napelnione trocinami itp. i z opaski ustalającej i przytrzymującej.

## Vulvo-Vaginitis.

Troskliwe oczyszczenie części płciowych, ciepłe kąpiele nasiadowe. Przestrzykiwania pochwy sublimatem (0'10%), kw. karbol. 1—2%, *Zinc. sulph.* (0'50%), alunem (5%) 3 razy dziennie. Zasyпки jodoformem lub pręciki jodoformowe. Nadżerki na wargach sromnych opatrzyć masą salicyłową lub pudrem salicylowym zasypać. Ropnie przecinać.

Przyczyny, jak anaemię, zołży leczyć środkami żelazistemi. jodowymi, tranem itp.







## NOWE LEKI.

### Acidum camphoricum.

Białe, krystaliczne igiełki, smaku kwaśnego, w letniej wodzie (8:100) w ol. tłustych i wysoko łatwo rozpuszczalne. Działa ściągająco na bł. śluzowe. W laryngitis i tracheitis  $\frac{1}{4}\%$  rozczyń do rozpylania. W ostrym nieżycie bł. śluz. nosa tampon napojony  $\frac{2}{10}\%$  rozez. Działa również przeciw potom suchotników (1—2° na noc).

(100 grm. 4 złr.)\*

### Aethyl pyoctaninum.

Działa silniej, niż pyoctanina (zob.) Prof. Stilling poleca przy chirurgicznym leczeniu guzów.

### Aethylenum bromatum.

Środek mocno trujący, odróżnić należy od Aethylum bromatum. Dr. Donath w Peszcie poleca go przeciw epilepsji.

*Rp. Aethyleni bromati 5'00,  
ad emuls. oleos 100'00,  
Ol. menth. pip gtts. 2.*

z tej emulsji 2—3 r. dz. po 30 kropli w  $\frac{1}{3}$  szklanki wody z cukrem. Co drugi dzień postępować po 10 kropli więcej, aż do 70. Dzieci od 8—10 lat rozpoczynają od 10 kropli. W razie podrażnienia żołądka (odbijania), zmniejszyć dawkę lub dodać 0'10 Extr. opii, do emulsji. Można też podać w kapsułkach.

*Rp. Aethyleni bromati gtts. 3.*

*Ol. amygdal. dulc. gtts. 6.*

*Dtur. tal. dos. in capsul gelatinosis N. 100.*

S. 2 razy dz. po 2—4 kapsułek.

### Agathinum (Salicyl-*a*-Methylphenyl hydrazon).

Łuski drobne, białe-zielonawe bez smaku i zapachu, w wodzie nierozpuszczalne, natomiast łatwo w eterze i wysoku. Podawano z dobrym skutkiem w cierpieniach reumatycznych, nerwobólach, Ischias i t. p. Czasami po zażyciu proszka występuje przemijający wkrótce ból głowy. Zazwyczaj po użyciu 4—6 grm. następuje skutek.

Dawka 3 razy dzień. po 0'50 w opłatku.

(10 grm. 2 złr. 25 ct.)

### Amylenhydrat. Amylenum hydratum.

Płyn przezroczysty, oleisty, zapachu kamfory i mięty. Rozpuszcza się w 8 cz. wody. Przeciw bezsenności w dawce 3—5 grm. w wodzie ocukrzanej, piwie, kapsułkach lub lewatywie. Działa słabiej, niż chloral, silniej od Paraldehydu. W przypadkach, gdzie chcemy koić ból, podać go można z dodatkiem

\*) Ceny przy niektórych lekach podane, wyjęte są z cennika miesięcznego: Pezolda et Süssa we Wiedniu.

morfiny. Sen następuje w  $\frac{1}{2}$  godziny po użyciu i trwa 7—9 godz.

Pro dosi: 4·00, pro die 8·00.

(100 grm. 2 złr.).

*Rp. Amylen hydrat. 7·00,*

*Aqu. dest. 60·00,*

*Extr. liquid. 10·00.*

MDS. Przed spaniem połowę.

## Analgenum.

Środek polecany przeciw nerwobólom i reumatyzmowi w 1 gram. dawkach. Nie przedstawia żadnych szczególnych zalet.

## Antitherminum.

Środek przeciwgorączkowy, działający silnie na nerwy naczyńioruchowe. Drobner ze Lwowa próbował w chorobach gorączkowych i m. Brighti z nieszczególnym skutkiem. Wobec niepewnych skutków a niebezpiecznych objawów występujących przy używaniu, należałoby jeszcze czekać na dalsze doświadczenia.

Dawka 0·50 pro dosi.

## Antiseptol. (Cinchoninum jodosulfuricum)

zawiera 50% jodu, proszek bez zapachu, rozpuszczalny tylko w wyskoku i chloroformie. Służy jako środek antyseptyczny i zastępuje jodoform.

## Anthrarobinum.

Działa podobnie jak Chrysarobina, lecz słabiej i powolniej, za to zaś o wiele mniej szkodliwa i znacznie tańsza. Kwalifikuje się przeto do użycia na twarz i części płciowe. Z dobrym skutkiem stosowano przeciw:

*Herpes tonsurans, Pityriasis, Erythema, Eczema marg. i t. d.*

*Rp. Anthrarobin 10·00,*

*Ol. olivar. 30·00,*

*Lanolin 60·00.*

W roztworze wyskok. 10:80, lub 10% roztworze gliceryny, wreszcie z Collodium 1:10.

## Apocodeinum hydrochloric.

Działanie podobne do Apomorfiny. Środek wykrztuśny używa się w nieżytach oskrzeli zwłaszcza przewłocznych. Można dłuższy czas podawać, jużto w kroplach, (n. p. 1% roztworu po 10—20—30), w pigułkach lub podskórnie 10—20 kropli 2% roztworu.

## Aristol.

Różowo-żółty, prawie bezwonnny proszek. Nie rozpuszcza się ani we wodzie, ani wyskoku, natomiast w eterze i chloroformie. Zawiera 45% jodu. Używa się w chorobach skóry, owrzodzeniach i wszędzie może zastąpić Jodoform. Zapisuje się w postaci zasypki, maści, pre-cików, czopków.

*Rp. Aristol 0·30,*

*Sapo Kalin. 3·00,*

*Aether 5·00,*

*Alcohol 5·00.*

Mf. ungu. S. Maść na wóle.

Wetrzeć na wieczór i okład wysychający.

*Rp. Aristoli 3·00,*

*Ol. oliv. 20·00,*

*Lanolin 80·00.*

Mf. ungu. S. Na oparzeliny.

(100 grm. 11 złr.).

## Asaprol.

Proszek białawy rozpuszczalny we wodzie i wyskoku. W dawce 1—4 grm. przeciwgorączkowy i kojący, zwłaszcza w ostrym reumatyzmie. Bompert podaje w 1-szym dniu 2 grm., w drugim 3·00 w następnych 4·00, dopóki ból i gorączka nie ustąpi, po czym dla zabezpieczenia od nawrotu choroby zmniejsza dawkę do 1 grm.

*Rp. Asaprol 2—400,*

*Syrup*

*Aqu. dest. āā. 30'00.*

MDS. Użyć w przeciągu dnia, biorąc po łyżeczek w kawie lub piwie.

W proszkach po 0'50, lub lewatywie:

*Asaprol 2—7'00.*

*Laud. Sydenh. gtts IV.*

*Vitelli ovi N. 1.*

*Det. Salep 100'00.*

MDS. Na jedną lewatywę.

## **Benzanilid.**

Proszek biały krystaliczny, w wodzie nierozpuszczalny. Środek przeciwgorączkowy, polecany w praktyce dziecięcej. Ciężkość spada, jak przy antyfebrynie, a jej podwyższenie się powolniejsze. Dla dzieci w proszkach z cukrem pro dosi 0'10 do 0'40, dorosłym 0'60 do 1'00.

## **Benzolguajacol czyli Benzosol. (Acidum benzoic. i Guajacol).**

Proszek bezbarwny, używany w miejsce kreozotu przy gruźlicy płuc. Zapisuje się w proszkach z eleosacch. menth. po 0'25—0'80 trzy razy dziennie po jedzeniu.

*Rp. Benzosol 5'00,*

*Ol. menth. pip. 0'10,*

*f. trochisci Nr. 20.*

S. 3 razy dz. pastylkę po jedzeniu, przez 2-gi, 3-ci i 4-ty tydzień po 2, w 5-tym tygodniu po jednej, 6-ty tydzień wypocząć i na nowo tak samo.

(100 grm. 6 złr. 75 ct.).

## **Benzonaphtholum. (Acid. benzoic. i Naphthol).**

Proszek biały bez smaku i zapachu, trudno, we wodzie rozpuszczalny. Środek antysepty-

czny podobnie jak Betol. Polecają głównie w chorobach przewodu pokarmowego. Dawka 0'50 pro dosi, 5'00 pro die. Dzieciom 2 grm pro die (podaje się jako proszek w opłatku).

(100 grm. 1 złr. 75 ct.).

## **Betolum. Betol. Naphthosolol.**

(Połączenie kwasu Salicylow. z Naphtolem). Proszek bez smaku i zapachu. Środek antyseptyczny i przeciwgorączkowy. Kobert poleca B. przeciw reumatyzmowi stawów i nieżytowi pęcherza. Dawka: 0'30—0'40 cztery razy dziennie w pigułkach lub opłatku. Zewnętrznie przeciw rzeżączce w postaci przecieków 1 cz. Betolu. 4 części Butyr. Cacao.

(100 grm. 2 złr. 40 ct.).

## **Bismut subbenzoic. v. benzoicum.**

Biały delikatny proszek, używany zamiast jodoformu, zwłaszcza jako zasypka na wrzód miękkiej. Finger poleca zasypywanie wrzodu 2 razy dziennie przez 3—6 dni. Pierwsze posypanie sprawia nieco pieczenia.

## **Bromamidum.**

zawiera 70% bromu, proszek krystaliczny nierozpuszczalny we wodzie. Analgeticum i Antihermicum. Podaje się w proszku lub zawiesinie w ilości po 0'6—1'00, dorosłym, i od 0'06—0'03 dzieciom, kilka razy dziennie.

## **Bromoform.**

Płyn przeźroczysty, słodkawy, w wysoku łatwo rozpuszczalny, w wodzie opada w perełkach na dno i nie rozpuszcza się. Specyfik na koklusz. (Jak i inne specyfiki zawodny) zob. Pertusis.

(100 grm. 1 złr. 50 ct.).



## Bromol = Tribromphenol.

Jeszcze przez Rademackera używany środek, obecnie polecany przeciw dyfteryi do pędzlowań 1:25 gliceryny. Jako maść na owrzodzenia 1:10 maści. Przy cholera infantum 0·005—0·015.

## Butylchloralum.

(Fałszywie Crotonchloral hydratem zwany). Krystaliczne blaszki, aromatycznego smaku i zapachu. Rozpuszcza się we wodzie dość trudno (1:20), łatwo w wysokoku.

Środek nasenny i kojący, zwłaszcza w neuralgiach n. trigemini (co 2 godz. po 0·20—0·40). Jako nasenny (0·50—2·00). Zewnętrznie: przeciw bólom zębów wraz z równą ilością kw. karbolowego.

## Bryonia alba.

Polecona w ostatnich czasach przeciw krwotokom. Extractum w pigułkach po 1—2—3·00 pro die. Tinctura 2—3·00 pro die.

## Cactus grandiflorus.

W ostatnim roku czyniono wiele doświadczeń, z których wynika, iż C. g. (w homeopatyi już dawniej używany) skutecznym się okazał przy wadach serca, angina pectoris, nerwicach serca, po nadużyciu kawy, herbaty, tytoniu, przy osłabieniu serca po durzycy, w chorobie Basedowa i wogóle tam, gdzie digitalis przeciwskazane. Używano Tinctury, jednak skład też bywa niejednaki. Najpewniejszy preparat jest firmy Parke, Davis et. Co. Fluidextract Cacti grandiflori.

Dawka tegoż 10—30 kropli 3—4 razy dziennie.

## Cantharidinum.

Istota składowa kantaryd, powodująca powstawanie pęcherzy.

Dawniej używano jej jako środka przyszczałego zamiast kantaryd. Obecnie sole kantarydyny zaczęto stosować przeciw gruźlicy — zamiast Tuberculiny. — Środek ten wymaga ostrożności, zdarzały się bowiem już po paru iniekcjach zapalenia pęcherza i nerek. Hennig produkuje *Cocain - Cantharidin*, mieszaninę Kantarydyny z Cocainą (1%). Jestto bezwonny biały proszek ściągającego i szczypiącego smaku, łatwo w gorącej wodzie rozpuszczalny. Używa się w formie wstrzykiwań podsk. przy gruźlicy krtani. Iniekcye niesprawiają zupełnie bólu. Polecają następujące formuły:

I. 0·075 *Cocain cantharid.*

50·00 *Aq. chloroform.*

II. 0·15 *Cocain cantharid.*

50·00 *Aq. chloroform.*

Roztworu I wstrzykuje się 2 przedziałki strzykawki Overlach, II-go 1 przedz. (= 0·0001 *Cantharid.*), dawkę można zwiększyć do 0·0004.

(Wyrób Henniga w fabryce Riedla w Berlinie).

(Dokładne sprawozdanie Demmego Therapeut. Monatshefte H. 3. S. 112, oraz tamże Liebreicha S. 294 z r. 1892).

## Chloramid zob. Chloralformamid.

## Chloralformamid = Chloralamid = Chloralum formamidatum.

Bezbarwne kryształy smaku nieco gorzkiego, we wodzie łatwo rozpuszczalne. Łagodny lek nasenny. Używa się w bezsenności przy neurastenii, gruźlicy itp. chorobach, którym nie towarzyszą boleści. 4·00 pro dosi 8·00 pro die. Sen następuje w 1/2 godziny, trwa 7—9 godzin.

*Rp. Chlor. amid. 10'00,*  
*Aqu. dest. 120'00,*  
*Syrup rub. 30'00.*

DS. Przed spaniem 2—4 łyżek.

Przy dłuższem używaniu dużych dawek pojawia się wysypka z towarzyszącą gorączką.

100 grm. 1 złr. 80 ct.

### **Chloralurethanum = Uralium.**

Powstaje przez rozpuszczanie urethanu w roztworze chloralu. Środek nasenny, dobry, zwłaszcza dla suchotników, nerwowych i umysłowo chorych.

Dawka 2—3'00 pro dosi (w opł.).

### **Cornutin.**

Według Koberta, najskuteczniejszy alkaloid sporyszu. Silnie trujący. Używa się przy krwotokach po poronieniu i wogóle z narządzi moczopłciowych.

Dawka: 4 r. dzień. w proszku lub pigułkach po  $\frac{1}{4}$  etgr.

(1 gramm = 19 złr. 50 ct.).

### **Cytisinum.**

Alkaloid z *Cytisus Laburnum*, silna trucizna, działa podobnie jak *Curare* i *Strychnina*. Środek dotąd niewypróbowany.

### **Dermatol.**

Proszek barwy szafranowej, bezwonny, nierozpuszczalny. Jestto połączenie bismutu z kwasem gallusowym. Użyć go można w miejsce jodoformu, a mianowicie: na oparzeliny, owrzodzenia, na rany, w otoku usznym itp., jakoteż zdaniem Liebknechta zamiast bismutu w uporczywych biegunkach i owrzodzeniach kiszki. Dr Gläser wyraża takie zdanie o Dermatolu: 1. zupełnie nietrujący, 2. niedrażniący, 3. dobry antyseptyk, posiada własności osuszające i dobrze się daje zachować.

Dawka do wewnątrz po 2 grm. pro die.

*Rp. Dermatol 20'00,*  
*Talci veneti 70'00,*  
*Amyli 10'00.*

S. Do posypek (przeciw potowinóg).

*Rp. Dermatol 10'00,*  
*Lanolin 80'00,*  
*Vaselin 10'00.*

Mf. ungu. Maść na wrzody.  
 (100 grm. 2 złr. 40 ct.).

### **Diaphtherinum (Oxychinasetol).**

Proszek żółty we wodzie rozpuszczalny, posiada własności antyseptyczne. Próby w praktyce chirurg. dały dobre wyniki, zwłaszcza że mniej trujący od karbolu i sublimatu, jednak do desinfekcyi narzędzi niestosowny, gdyż je czerni. Używa się w roztworach  $\frac{1}{2}$ —2% do opatrunku.

(100 grm. = 2 złr.).

### **Diuretin.**

Środek moczopędny. Jestto połączenie Theobrom. (48%) z *Natr. Salicyl.* Proszek biały w wodzie rozpuszczalny. Działa moczopędnie, nie wpływa ani na serce, ani narząd oddechowy i nie drażni nerek. Stosuje się w przewłocznych chorobach nerek, mianowicie przeciw puchlinie.

Dawka 1—2 grm. pro dosi do 6 lub 7 grm. pro die.

*Rp. Diuretin 5'00,*  
*Aqu. dest. 90'00,*  
*Aq. menth. pip. 100'00,*  
*Syrup simpl. 10'00.*

DS. Co 2 godziny łyżkę.

(100 grm. kosztuje 7 złr.).

### **Duboisinum sulphuricum.**

Środek nasenny. Lewald zastrzykiwał z roztworu 0'04:20 wody jedną strzykawkę = 0'002. Pierwszym objawem: mydriasis, niepokój, po 10—30 min. sen

trwający 2—7 godzin, czasami jednak przed zaśnięciem zawrót głowy, zmęczenie, zasychanie w gardle, pragnienie.

Dawki 0·002 nie wolno przekraczać. Wewnętrznie użyty nie sprawia skutku.

### **Euphorinum = Phenylurethanium.**

Proszek rozpuszczalny w mieszaninie, wody z wyskokiem (np. winie). Środek przeciwgorączkowy. Działanie trwa 5—7 godzin. Rozpoczynać dawkę od 0·10 i można postąpić do 1—1·50 pro die. W reumatyzmie dawki 1—2·0 usuwają ból, gorączkę i obrzmienie.

Dawka 0·50 do 1·00 pro dosi, 1—2·00 pro die.

(100 grm. 5 złr.).

### **Europhen. (Isobutylortocresoljodid).**

Delikatny żółty proszek rozpuszczalny w wyskoku chloroformie, eterze i oliwie. Środek antyseptyczny, posiada zupełnie te same własności, co jodoform, przewyższa go jednak tem, że jest bezwonny.

*Rp. Europhen 2·00,*

*Vaselin*

*Lanolin āā. 50·00.*

Mfunguent. S. Maść.

(*ulcus cruris*).

### **Exalginum = Methylacetalid.**

Krystaliczne białe igiełki, bez smaku i zapachu, w zimnej wodzie trudno rozpuszczalne, łatwiej w cieplej. Obniża cokolwiek ciepłotę ciała, działa jednak głównie kojąco. Nie wpływa na krążenie i oddychanie (jedynie powyżej 0·75 bywa lekka sinica). Używa się w nerwobólach, zwłaszcza twarzy, u osób

anaemicznych i dotkniętych kłā. Przy migrenie bez skutku. Działa też dobrze w reumatyzmach, kolce nerkowej, Chorea itp.

Dawka 0·10—0·25 dwa lub więcej razy dziennie, do 1·50 pro die. Podaje się jako proszek w opłatku lub np.

*Rp. Exalgin 2·50,*

*Alcohol menth. 15·00,*

*Aqu. dest. 190·00,*

*Syrup 30·00.*

DS. Co 2 godz. łyżkę (1 łyżka zawiera 0·20 exalg.).

(10 grm. 70 ct.).

### **Exodyna.**

Ogłoszona jako silny środek przeciwgorączkowy, w cierpieniach reumatycznych i nerwobólach składa się z 90% Antifebryny, 5% Natr. Salicyl. i 5% Natr. bicarb.

### **Guajacol.**

Płyn barwy żółtawej, ostrego, aromatycznego zapachu. Zmniejsza podrażnienie do kaszlu, ułatwia wykrztuszanie. Używany zamiast kreozotu w gruźlicy płuc.

*Rp. Guajacoli 7·50,*

*Tinct. Chinae 20·00,*

*Vini malacens 1000·00.*

DS. Łyżkę lub 2 przy każdym jedzeniu do 1 gram pro die.

*Rp. Guajacoli 3·00,*

*Ol. jecor. aselli 200·00.*

S. 3 razy dz. łyżkę po jedzeniu, lub też w kapsułkach gelatynowych, albo, gdy po pewnym czasie chorzy znosić nie mogą, w lewatywie:

*Rp. Guajacoli 2·00,*

*Ol. amygdal. 20·00,*

*Gum. ar. 10·00,*

*F. emul. adde*  
*Aqu. dest. 950·00.*

S. Na 4 lewatywy.



## Guajacolum benzoicum et G. carbonicum.

Można użyć w większej od poprzedniego dawce. Identyczne z Benzozozolem.

(100 grm. 4 złr.).

## Haemol i haemogallol.

Nowe, organo-metaliczne związki żelaza, ulegające w ustroju szybkiej resorbeyi, a nie obciążające trawienia. Oba te związki powstają pod wpływem ciał odtleniających na haemoglobinę, a mianowicie Haemol działaniem pyłku cynkowego, Haemogallol przez redukcję pyrogallolem. Haemol jest proszkiem szarym, Haemogallol czerwono-brunatnym.

Dawka po 0·10—0·50 trzy razy dziennie, w opłatku, lub pastylkach. Haemol zawiera ślad cynku, obliczony na gojenie owrzodzeń żołądka i kiszek.

## Hematogen.

Organiczny związek żelaza. Powstaje z rozpuszczenia białka w ługu potasowym, do przesączonego płynu dodaje się winianu żelaza i roztwór osadza, dodając kw. octowego. Osad składa się z organicznego związku żelaza i po wysuszeniu tworzy żółtawy proszek łatwo rozpuszczający się w alkaliach i zawiera 0·7% żelaza.

## Hydraceturum = Pyrocinum.

Białe, bez smaku kryształki, w wodzie trudno, w wysoku łatwo rozpuszczalne, używa się przeciw reumatyzmowi i w chorobach gorączkowych, Ischias, po 0·02—0·05 dwa razy dzień. Również przeciw Psoriasis w maści 10%. Środek trujący, wywołuje czasem Haemoglobinurię, żółtaczkę, zapad.

## Hydrargyrum benzoicum.

Proszek biały, krystaliczny, bez smaku i woni w wodzie nierozpuszczalny; łatwo natomiast w wysoku i roztworze soli kuchennej. Używa się do okładów na wrzody syfilityczne w równej ilości ze solą (0·10:25·00—50·00).

*Rp. Hydrarg. benz.*

*Vaselin aa. 1·00,*

*Ol. Paraffini 8·00.*

S. Do inj. podskór.

100 grm. 30 ct.

## Hydrargyrum carbolicum.

Środek przeciwkłowy podaje się w pigułkach po 0·02—0·03, 3 razy dziennie. Dzieciom po 0·004—0·005 dwa razy dziennie.

*Rp. Hydrarg. carbolicum 1·20,*

*Extr. liquor.*

*Pulv. liq. aa. 3·00,*

*Mfpil. 60. Obduc. Bals. tolu.*

S. 2—4 pig. dziennie.

## Hydrargyrum B. naphtholicum.

Poleceny na rany zadawnione, wysypki skórne itp. Bliższych opisów dotąd nie ma.

## Hydrargyrum salicylicum.

Podaje się do wewnątrz po 0·01—0·025 w pigułkach 2—3 razy dz. przy czem poleca się popić ciepłym mlekiem.

Do iniekcji podskórnych, oraz do okładów, zasypek, maści na wrzody syfilityczne, Condylom. lata itd.

*Rp. Hydrarg. Salicyl. 1·00,*

*Extr. et pulv. liquor. q. s.*

*f. pil. 60.*

S. 3 razy dziennie po jedzeniu 1—2 pig. (Schadek).

*Rp. Hydrarg. Salicyl. 0·20,*

*Mucilag. g. ar. 0·30,*

*Aqu. dest. 60·00.*

S. Do wstrzyk. wśródmięsn.

*Rp. Hydrarg. Salicyl.*

*Kali carbon. āā. 0'10,*

*Aqu. dest. 10'00.*

S. Do podskórnej iniekcji.

*Rp. Hydrarg. Salicyl. 1'00,*

*Vaselin 30'00.*

Mf. ungu.

*Rp. Hydrarg. Salicyl. 1'00,*

*Magnes carbon. 20'00.*

S. Zasyпка. (Plumert).

(100 grm. 2 złr. 80 ct.).

## Hydrargyrum thymoloaceticum.

Środek przeciwkółowy w dawkach 0'005—0'01. W ostatnim czasie używał Tranjen (w Bułgarii) tego przetworu w celu leczenia gruźlicy. Brak dotąd doświadczeń.

*Rp. Hydrarg. thymol. acet. 1'00,*

*Glycerin 10'00,*

*Cocain. hydrochl. 0'10.*

S. Do wstrzykiwań wśródmięśniowych, 1 strzykawka pro dos., raz na tydzień. (Według Loewenthala potrzeba do zupełnego wyleczenia Syfilis 8—10 zastrzyknięć).

## Hydrastininum.

Białe krystaliczne igielki, rozpuszcza się trudno w wodzie; łatwo w wyskoku, eterze. Lepiej używać Hydrochloricum. Falk używał z dobrym skutkiem przy Endometritis, Dysmenorrhoea, nieregularnej miesiączce co dzień po  $\frac{1}{2}$  strzykawki, 10% roztworu t. j. 0'05.

*Rp. Hydrastinin. hydrochl. 1'00,*

*Aqu. dest. 10'00.*

S.  $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki dziennie w razie krwotoku.

(1 grm. 1 złr. 20 ct.).

## Hydroxylaminum. H. hydrochloratum.

Używa się w chorobach skórnych w miejsce chrysarobiny i

kwasu pyrogallusowego, przeciw psoriasis, lupus, w roztworze 1% wysokowym. Środek trujący wymaga wielkiej ostrożności.

*Rp. Hydroxylamin mur. 0'20—*

*0'50,*

*Spir. vini 100'00,*

*Calcar. carb. q. s. ad neutr.*

S. Do pędzlowań.

## Hyoscin, H. muriaticum, H. hydrobromicum, H. hydrojodic.

Rozszerza źrenicę również, jak atropin. tylko prędzej, działanie jednak trwa krócej. Używa się do zakraplań 1:1000 do 1:400; z pierwszego roztworu wkrapla się 10—15 kropli, z drugiego 4—6 kropli. Gdzie chodzi o uspokojenie podrażnienia umysłowo chorych, ma działać wybornie, pisze Rabow. Chorem takim dawał zazwyczaj w wodnym roztworze (a nie podskórnie).

*Rp. Hyoscin. hydrojod. 0'01,*

*Aqu. dest. 10'00.*

Pierwsza dawka 8 kropli ( $= \frac{1}{3}$  mlgr.) w wodzie, mleku lub winie, później można dojść do 12 kropli, a nawet 16 pro die. H. działa silniej, niż Hyoscyamina.

(1 grm. 4 złr.).

## Hyoscyaminum.

Alkaloid z hyoscyamus niger, w postaci błyszczących igielek, bez woni, ostrego smaku. Zwyczajnie sprzedają go w proszku zanieczyszczonym Hyoscina. Używa się jako mydriaticum, zamiast atropiny.

Jako środek nasenny w chorobach umysłowych od 1—3 miligramów, jako anodynum i antispasmodicum,  $\frac{1}{2}$ —1 miligr. w pigułkach, przeciw astmie, kokluszowi, epilepsji.

(1 grm. 6 złr.).

## Hypnalum.

Połączenie antypyryny z chlorałem. Kryształ bez smaku i zapachu, rozpuszczające się w 5—6 częściach wody. Środek nasenny, nie posiada złego smaku i żrących własności chloralu (1 gram = 0.45 chloralu i 0.55 antypyryny). Dawka 0.50 do 1.00 działa silniej, niż równa ilość chloralu. Szczególniej stosowny dla dzieci.

(10 grm. 1 złr. 20 ct.).

Bonnet podaje następujący przepis:

*Rp. Hypnali 10.00,*  
*Aqu. dest. 65.00,*  
*Aq. flor. aurant. 5.00,*  
*Spir. vini 40.00,*  
*Tinct. cort. aur. 20.00,*  
*Syrup simpl. 60.00,*  
*Trae croci gtts. 2.*  
 MDS. 1—2 łyżek użyć.

*Rp. Chartreuse 4.00,*  
*Aqu. dest. 15.00,*  
*Hypnal 1.00.*  
 S. Na raz użyć. Bardet.

## Jambul.

Owoc drzewa Syzygium Jambolanum. W ostatnich latach gorąco polecany jako specyfik w moczowce cukrowej, zmniejszający znacznie ilość wydzielanego moczu i cukru. Podaje się najwygodniej w postaci proszków w opłatku, jako fluidextract, lub Tinctura. Środek nietrujący, można podawać w dość wielkich dawkach. Zwyczajnie rozpoczyna się od 0.25—1.00 — 3 razy dziennie. (Lewaschew podawał 20—40.00 pro die).

(Fruetus Syzygii Jambolani  
 100 grm. = 40 ct.).

## Jodolum.

Żółtawo biały proszek w wodzie trudno rozpuszczalny (1:5000) zawiera 89% jodu, bez sma-

ku, ze zapachu podobny do tymolu. Jako antyseptyk do zasypek. Do wewnątrz, jako środek przeciwiłkowy 1.00 pro die. Ma tę wyższość nad jodoformem, że jest bez woni i mniej trujący. Nie tworzy takiej skorupy, jaka bywa przy jodoformie. W okulistyce używa się w formie maści 2:10, przeciw Conj. chron. et granulosa.

(100 grm. 7 złr.).

## Jodantipyrinum.

Działa raz jako antypyrina, to znowu jak sól jodowa. W durze i gruźlicy działa jak antypyrina. Dotąd niewyjaśniono, czy ma wyższość nad czystą antypyriną. Dawka 0.50—1.50.

## Jodantifebrinum.

Środek zupełnie zbyteczny.

## Jodophenin.

Witkowski przypisuje temu środkowi własności przeciwpłatkowe, dotąd nie podano jednak, w jakim kierunku.

## Jurubeba.

Środek przeczyszczający, w chorobach wątroby i śledziony okazał się według badań Koberta zupełnie bezskutecznym.

## Lipanium.

Składa się z oliwy i 6% wolnego kwasu tłuszczowego. Używa się zamiast tranu i posiada tę zaletę, że dzieci chętnie ją biorą, a skutkiem kwaśnego oddziaływania dobrze się trawi. (Tran jednak zawsze skuteczniejszy i nigdy Lipaniną zastąpić się nie da).

## Lobelinum.

Z liści lub nasienia Lobel. infl. Płyn żółty, oleisty, ostrego smaku. Używa się częściej



jako *Lobelinum sulphuricum* (proszek żółtawy) przeciw astmie i nieżyłtowi oskrzeli.

Dawka: 0·05—0·10 pro dosi 0·20 pro die, dzieciom 0·01—0·05.

Środek niepewny.

## **Losophan.** (Trijodkresol, zawiera 80% jodu.

Białe krystaliczne igielki, rozpuszczalne w chloroformie, eterze. Używano z dość dobrym skutkiem w chorobach skóry: Herpes tonsur., Pityriasis, Eczema chron. Prurigo, Pruritus, Acne, Sycosis. Przeciwwskazanie w ostrych zapaleniach skóry. Używano roztworu 1% do pedzłowań (1:75 Spir. i 25 Aq. dest.). W maści (1:30). Zaspka 1%.

## **Lysol.**

Płyn przeźroczysty, brunatny (oleisty), zapachu kreozotu, miesza się z wodą i nie sprawia zmetnienia. Posiada własności antyseptyczne kw. karbolowego—jest jednak mniej trujący. Zgęszczony nadżera skórę. Ujemna strona L. polega na tem, że skórę i narzędzia czyni ślizkimi, co przy operacjach może być niekorzystnem. Do opatrunku używa się roztworu 1/2—1%. W roztworze 3% posiada własności mydła (pieni się).

(100 grm. = 30 ct.).

## **Methacetinum = Para = Acetanisidin.**

Proszek różowawy, bezwonny i bez smaku, w wodzie rozpuszczalny. Środek przeciwgorączkowy, kjący bóle nerwowe silniej, niż phenacetyna. Działa poniekąd antyseptycznie. Używano ze skutkiem przy gruźlicy, tyfusie, reumatyzmie stawów. Dawka: dzieciom 0·20—0·30, do roslým 0·30—0·40.

## **Methylalum.**

Płyn bezbarwny, lotny, łatwo w wodzie rozpuszczalny, smaku aromatycznego, piekącego, zapach jakby eteru octowego zmieszanego z chloroformem.

Zewnetrznie w linimentach i maściach 5:30 jako środek łagodzący ból. Do wewnątrz: wstosunkū 1:50; jakoteż do wstrzykiwań podskórnych. Ma być doskonałym środkiem nasennym. Używa się przeciw nerwicom żołądka i kiszek, przy delirium tremens, i jako odtrutka przy otruciu strychniną.

Dawka: 1—5 grm. — podskórnie 0·10 (bez dodatku) co 2 godz. (Wstrzykiwania są bolesne).

## **Methylacetanilid zob. Exalgin.**

## **Morrholum.**

Produkt tranu, zawierający znaczne ilości jodu, siarki i fosforu. Gorzki, aromatyczny. Działa jak tran.

Dawka 0·20 (= 5·0 tranu) w kapsułkach, dla dzieci 4, dla dorosłych 6 sztuk dziennie.

(100 grm. 1 złr. 60 ct.).

## **Myrtholum.**

Jest częścią składową olejku z liści myrtyś communis. Ciecz jasna dość znośnej woni. Podaje się w zgorzeli płuc i cuchnącej wydzielinie z oskrzeli. Najlepiej używać w kapsułkach napełnionych po 0·15 myrtolem. Co 2 godziny 2 kapsułki. Skutek ma być często zdumiewający.

(100 grm. 4 złr. 50 ct.).

## **Naphthalolum zob. Betol.**

## **Natrium paracresotinicum.**

Działanie podobne do kw. salicylowego. Demme podawał dzieciom przy gościeu stawowym,

pneum. catarrh, typhus abd. z dobrym skutkiem, stosując małe dawki (0.10 co 2 godz.):

Mianowicie zaś:

od 2—4 lat 0.1 — 0.25 p. d. 0.50—1.0 p. die  
 „ 5—10 „ 0.25—1.00 „ 2.50—3.0 „  
 „ 11—16 „ 1.0 — 1.50 „ 3.50—4.0 „

W razie zapadu: (wyjątkowo) Cognac z wodą.

Najlepszy skutek okazał się przy Catarrhus gastro intestinalis acut. u dzieci, podawano następującą mieszaninę:

*Rp. Natri paracresotini* 0.10—0.20,

*Tinct. Opii gtt.* 2.

*Cognac* 1.00,

*Syrup gummosi* 5.00,

*Aqu. dest.* 25.00.

DS. Co 2 godz. łyżeczkę.

## Oesypus.

Nieczyszczony tłuszcz z wełny owczej (po oczyszczeniu otrzymuje się Lanolinę). Znany jeszcze za Herodota jako kosmetyk i środek do gojenia ran. Obecnie wraca do swoich praw i polecany szczególnie przy eczema:

*Rp. Oesypi*

*Ol. olivar. āā.* 10.00,

*Zinci oxydati*

*Amyl. q s. f. pasta mollis.*

## Oksyna.

Preparat mięsny z mięsa wołowego oczyszczonego z tłuszczu, żył i kości rozdrobionego na papę i zmięsanego z cukrem. Mięszanina ta praży się w temperaturze 40° C. wskutek czego cukier wyciąga części pożywne mięsa i daje preparat bardzo łatwo strawny a posilający.

## Oleum Hydrargyri vel cinereum.

Gęsty olej złożony z 3 części rtęci utartej z Lanoliną i dodat-

kiem 4 części ol. olivar. Używa się do podskórnych wstrzykiwań przy leczeniu kiły. Przed użyciem należy olej ogrzać. Wstrzykiwania uskutecznią się co 5 lub 8 dni po 0.10 do 0.15. Do wyleczenia wystarcza podobno 2—3 tygodni.

## Oleum Gurjun.

Balsamum G. Murell poleca go w miejsce Bals. Copaive, gdyż nie sprawia pieczenia w przełyku i biegunki, ani wysypki nie wywołuje. Służy też jako śr. wykrztuśny przy Bronchitis, w chorobach skóry, zwłaszcza Elephantiasis.

Dawka 2—4.0 dziennie 2 lub 3 razy. W celu poprawienia smaku zapisuje się na 2 części balsamu, 10 części ekstraktu słodow.

## Orexinum v. O. hydrochloricum.

Bezbarwne błyszczące igiełki, rozpuszczają się we wodzie łatwo; smaku gorzkiego. Zostawia uczucie pieczenia na języku i w przełyku. Polecona jako Stomachicum przy braku apetytu, blednicy, gruźlicy, osłabieniach i t. p. Wywołuje uczucie głodu.

Dawka 0.20—0.50 pro die, już to w opłatku, już w pigułkach.

Ze względu na drażniące własności, należy popić większą ilością rosółu, herbaty, mleka, lub kawy. Najlepiej zażywać między 8—9 godz. rano, gdyż skutek pojawia się w 3—4 godzin.

Doświadczenia Dra Podgórskiego w Szpitalu św. Łazarza wykazały niejednostajność działania.

(O. hydrochlor 10 gr. 1 złr. 40 ct.).

## Orthinum, O. hydrochloricum.

Środek przeciwgorączkowy. Ostrzegają jednak przed używa-

niem onegoż Prof. Kobert i Un-verricht, gdyż sprawa dreszcze, nudności, wymioty.

## **Pental** czyli trójmetyetylen

Płyn bezbarwny, nierozpuszczalny we wodzie, natomiast w każdym stosunku w chloroformie, eterze i wysokoku. Łatwo zapalny i niezmiernie lotny, przeto wymaga ostrożności. Używa się do narkozy zapomocą wziewań, jak chloroform (w celu zaoszczędzenia tego dość drogiego środka, najodpowiedniejsza maska Junkera). Zapach podobny do oleju gorzycznego. W celu uspiania na krótki przeciąg czasu wystarcza 5—10·00. Uspienie występuje w 1—3 minut. Doświadczeń o skutkach przy dłużej trwających operacjach dotąd nie ma.

(100 grm. 3 złr.).

## **Phenocollum hydrochloricum**

czyli Amido-acet-para-phenitidin, nowy środek przeciwgorączkowy i przeciwgoścowy na równi z Antipyriną, Phenacetyną.

Proszek biały, rozpuszcza się w 16 cz. wody. Prof. Mering spostrzegł po jedno-gramowej dawce (u chorych z zapal. płuc i tyfusem) spadek ciepłoty o 2° C. bez zapadu i sinicy. Działanie trwa 2 godziny, podwyższanie się ciepłoty występuje bez dreszczu i bez potów. W reumatyzmie po 5 grm. pro die, zmniejsza ból.

Dawka 0·50—1·00 pro dosi (co 2—4 godziny), do 5·00 pro die.

## **Phenylurethan** zob. **Euphorinum.**

## **Photoxylinum.**

Rodzaj Collodium z wełny drzewnej, pozostawia grubszą i mocniejszą warstwę niż zwykłe Collodium.

## **Picrotoxinum.**

Środek mocno trujący zalecony przeciw padaczce, eclampsyi. Odtrutka na morfinę.

Dawka w pigułkach po 0·001—0·005.

## **Piperazinum.**

Przedstawia się w postaci krystalicznych igiełek, łatwo w wodzie rozpuszczalnych. Posiada smak salmiaku — rozpuszcza znaczną ilość kwasu moczowego, używa się przeto w cierpieniach artrytycznych, kamieniach nerkowych i pęcherza. W wielu przypadkach spostrzegano skutek dobry, zachęcający do dalszych prób. Podaje się w dawkach 1 grm. pro die, we wodzie sodowej lub giesshübelskiej (Zapisywać w 1-gram. flaszeczkach, gdyż przyciągając wodę rozplywa się). Do przepłukania pęcherza 1—2‰. Do okładów na artrytyczne obrzęki:

*Rp. Piperazini pur. 1·00,*

*Spir. rectif. 20·00,*

*Aq. dest. 80·00.*

(1 gram 40 ct.).

## **Podophyllotoxinum.**

Głównie działający składnik *Podophyllum peltatum*. Bardzo silnie trujący.

## **Pyoctaninum.**

(Z greckiego pyon: ropa, kteino zabijam). Są to barwiki anilinowe. (*P. coeruleum*: Metylviolet, *P. aureum*: Auramin).

Środki antyseptyczne, sprawiają rychłe powstawanie strupów i zabliznienie. *P. coeruleum* używa się w substancji w roztworze 1:1000—1:100, jako zasypka (2‰), w maści (2‰) na ropiejące rany, eczem i t. p.

*P. aureum* używa się w okulistyce.



Plamy z Pyoctaniny oczyszcza się spirytusem mydlanym.

(10 grm. 42 ct.).

## Pyridinum.

Płyn bezbarwny, przenikliwej woni. Używa się przeciw astmie do inhalacji, wachając go od czasu do czasu z flaszki. Polecają też przeciw rzerzaczce:

*Rp. Pyridini 0·03,*

*Aqu. dest. 90·00.*

DS. Raz na dzień wstrzyknąć.

Rademaker twierdzi, że do leczenia potrzeba 3—4 iniekcji.  
(100 grm. 70 ct.).

## Pyrodinum zob. Hydraceticum.

## Salicylamidum, związek stanowiący amid. kw. Salic.

Krystaliczne żółte blaszki rozpuszczalne w eterze, wysokoku, a w wodzie 1:250. Mocz po użyciu S. można mieszać z zachować bez zepsucia. Bez smaku, łatwiej rozpuszczalny we wodzie, niż kw. Salicylowy, działa podobnie do tegoż i używa się w nerwobólach i chronicznym reumatyzmie.

Dawka po 0·15 co godzina.  
Pro die 1·00.

## Salipyrinum vel Antipyrinum salicylicum.

Jestto biały i bezbarwny proszek krystal. trudno w wodzie rozpuszczalny.

Środek przeciwgorączkowy, zwłaszcza przy reumatyzmie stawowym zachwalany. Sprawia czasem wysypkę.

Dawka pierwsza 2·0 następnie co godzina po 1·0 do 6·0 pr. die.  
(100 gr. 5 złr. 70 ct.).

## Salolum = Phenolsalicylat.

Biały proszek krystaliczny, bez smaku i zapachu, w wodzie

nierozpuszczalny, natomiast łatwo w wysokoku i eterze. Środek antyseptyczny i przeciwgorączkowy. Mocz po użyciu S. zabarwia się, jak przy karbolu. Używa się przeciw cholerze, dysenterji, w chorobach pęcherza, reumatyzmie. Jako antyseptyk w proszku, w maściach podobnie jak jodoform.

Dawka 0·50—1·0 pro dosi (w opłatku) do 5·0 dziennie.

*Rp. Salol 4·00,*

*Cocain mur. 0·25,*

*Vaselin 30·00.*

Mf. ungu. S. Maść na oparzenie.

(100 grm. 2 złr.).

## Salophenum. (Acetylparamidosalol).

zawiera 50% kw. salicylowego. W postaci blaszek krystaliczn., bez smaku i zapachu, rozpuszcza się cokolwiek w wodzie gorącej, znacznie więcej w eterze i wysokoku. Działa podobnie jak kw. salicylowy, jednak słabiej. Dawka dzienna (w proszkach) najmniej 4 grm., można zwiększyć do 6 i 7 gr.

*Rp. Salopheni 1·00,*

*Dtur. tal. dos. X.*

S. Co godz. proszek.

(100 grm. 8 złr. 75 ct.).

## Simulo.

Owoc z *Capparis coreacea*. Tinkturę z nasion polecają przeciw hysteryi i padaczkę.

## Solaninum.

Środek przeciwkureczowy zwłaszcza przeciw bólom u tabetyków w dawce 0·025—0·03 jako nasenny, w pigułkach, proszkach. Podskórnie w roztworze wodnym po 0·01.

Jestto środek mocno trujący.

## Solveol.

Przeźroczysty, obojętny roztwór krezolu, który wraz z fenolem jest produktem z węglikamiennych. Środek ten posiada nader silne własności desinfekcyjne. S. przewyższa w działaniu Creolinę, Lysol a nawet i kw. Karbolowy, oddziaływanie jego jest neutralne, roztwory nie są mętne, a przytem nie trujący. Roztwór 0.5% Solv. daje tesame usługi, co 2% kw. karbolowy. Wobec tych zalet nadaje się do praktyki chirurgicznej.

(1 kilogr. 1 złr, 85 ct.)

## Solutol

jest krezolem przeprowadzonym w stan rozpuszczalny przez dodanie do niego krezolanu sodu. Posiada on silne własności desinfekcyjne. Ze względu na silne alkaliczne własności i formę zewnętrzną nie nadaje się do praktyki chirurgicznej, służy jednak jako wyborny środek do desinfekcyi mieszkań, ulic, sal chorych i t. p.

(1 klgrm. 65 ct.)

## Solvinum.

Środek mocno trujący, służy do rozpuszczania salolu, Naph-tolu, kamfory, przy przyrządzaniu maści.

## Somnal.

Środek nasenny, Według badań, Lutze'go okazało się, że jest szczerem Chloralurethanem, rozpuszczonym w wyskoku. Dawka 2—4 grm. na noc, w wodzie oczyszczanej.

(100 grm. 2 złr. 10 ct.)

## Sozal.

Sól glinu i kw. parafenolsulfonowego. Ziarna krystaliczne smaku ściągającego, zapachu fe-

nolowego. Rozpuszcza się w wodzie i wyskoku. Środek antiseptyczny, posiada te zalety, że roztwory jego nie ulegają zmianom.

## Sozodolum.

Połączenie jodu z karbolem. Kryształki bez zapachu, łatwo rozpuszczalne we wodzie, wyskoku i glicerynie. Środek antiseptyczny, w miejsce jodoformu używany.

Przeważnie jednak polecane są następujące połączenia:

*Hydrargyrum sozodolicum*, proszek pomarańczowej barwy (31% Hdrgr, i 38% Jodu). W maściach 1:50 do 1:10.

*Lithium sozodol.* w reumatyzmie stawów.

*Rp. Lithii sozodol 0.50—1.00,*

*Sacchari 1.00,*

*Tal. dos. 20.*

S. 3 pr. dz.

*Kalium sozodol.* przeważnie w maściach i proszkach.

*Rp. Kali sozodol 3.00,*

*Lanolin 30.00.*

Mfu. S. Maść na rany i oparzenia.

*Rp. Kali sozodol 5.00,*

*Talci venet 50.00.*

S. Puder przeciw potom nóg, eczema, do wdmuchiwania do nosa.

*Natrium sozodol.* Łatwo rozpuszcz. we wodzie.

*Rp. Natri sozodol 2.00,*

*Aqu. dest. 200.00,*

*Aqu. colon. 20.00.*

S. Woda na włosy do przemywania głowy.

*Zincum sozodol.* do zasypek (10:100) lub n. p.

*Rp. Zinci sozodol. 2.00,*

*Aqu. dest. 100.00,*

*Glycerin 5.00.*

S. Do przestrzyk. ucha.

Przetwory sozjodolu używają się głównie do opatrunku ran, w chorobach skóry, krtani, ucha: wewn. przeciw reum. stawów. (Sozjod. natr. 100 gm. 4 złr. 70 c.).

### Strontium bromatum.

Krystaliczne igiełki łatwo rozpuszczalne we wodzie i wysoku. See używał z dobrym skutkiem w chorobach żołądka, dyspepsy, gastralgii.

Dawka 2—4'00 pro die.

*Rp. Strontii bromati 20'00,*

*Aqu. dest. 300'00.*

MDS. 2 do 3 łyżek dziennie.

(100 gm. = 75 ct.).

### Strontium lacticum.

Proszek biały, ziarnisty, we wodzie łatwo rozpuszczalny. Dujardin Beaumetz i Paul stwierdzili skuteczne działanie w chorobach nerek, a mianowicie Nephrit. parenchym., w białkomoczu u ciężarnych i gruźliczych. Ilość wydzielanego białka zmniejsza się b. znacznie, i stan ogólny się poprawia. Labordé uważa Str. l. jako skuteczny środek przeciw tasiemcowi.

*Rp. Strontii lactici 50'00,*

*Aqu. dest. 250'00.*

MDS. 2 do 3 łyżek dziennie.

*Rp. Strontii lactici 30'00,*

*Syrup aurant. 200'00.*

MDS. Łyżka zawiera 3 gm. Str. lac.

*Rp. Strontii lactici 20'00,*

*Aqu. dest. 120'00,*

*Glycerin 30'00.*

MDS. Przez 5 dni po 2 łyżki (przeciw tasiemcowi).

Laborde.

### Strophantin.

Główny składnik z nasienia Strophantusa. Jestto środek bardzo trujący i z powodu braku pewnych doświadczeń, niepowinien być jeszcze używanym.

### Sulphonalum.

Środek nasenny. Biały, krystaliczny proszek, bez smaku i zapachu, rozpuszcza się w 500 cz. wody zimnej, a w 15 gorącej. Środek nieszkodliwy. Działa nie tak szybko, jak chloral, lecz za to dłużej, lepszy od Amylenhydratu lub Paraldehydu. Używany w chorobach umysłowych, nerwowych (Trismus neonator. po 0'20 w lewatywie). Przy Diabetes zmniejsza ilość cukru w moczu. Przeciw potom u suchotników. Dawka 0'25—0'30 w opłatku co 1/2 godziny 3—5 razy. Chorym umysłowo 2—3'00. Diabetykom 1—2 gm. Najwyższa dawka 4'00 pro dosi 6'00 pro die.

Po zażyciu 2 gm. dziennie spostrzegano już czasem czerwono-brunatną barwę moczu — jako objaw zatrucia — w takim razie natychmiast zaprzestać.

*Rp. Sulphonali 4'00,*

*Aqu. dest. 100'00,*

*Syrup aurant 20'00.*

DS. Połowę na raz użyć.

(100 gm. 1 złr. 80 ct.).

### Terpinhydrat.

Środek wykrztuśny. Kryształki trudno w wodzie rozpuszczalne (1:200 zimnej, 1:22 ciepłej) smak i zapach nieco korzenny. Używa się w nieżytach oskrzeli, zwłaszcza przy rozedmie płuc i w suchotach. Dawka 0'10—0'30 w pigułkach i proszkach do 2'00 pro die.

*Rp. Terpini hydrati 2'00,*

*Spir. vin.*

*Aqu. dest.*

*Syrup Sacch. āā. 50'00.*

DS. Co 3 godz. łyżkę.

Polecają też w mieszaniu z antypyriną jako specyfik przeciw kokluszowi, z niepewnym jednak skutkiem.

(100 gm. 1 złr.).



## Terpinolum.

Płyn bezbarwny, lotny, w wodzie nierozpuszczalny. Środek wykrztuśny w nieżytach dróg oddechowych w celu zwiększenia wydzieliny. Dawka 0·10 pro dosi.

*Rp. Terpinoli*

*Natri benzoici* āā. 1·00,

*Sacch. q. s. f. pil.* 10.

S. 5—6 pigułek dziennie.

(100 grm. 1 złr. 80 ct.).

## Thiol = Ichtyolum germanic.

Używa się w chorobach skóry podobnie, jak Ichtyol, jednak temu ostatniemu w dobroci nie dorównywa.

## Thiophendijodid.

Krystaliczne tabletki nierozpuszczalne we wodzie, natomiast w wysoku. Użyć można w miejsce jodoformu w proszku lub w postaci gazy 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

## Thioresorcinum.

Proszek bez zapachu i smaku, ma służyć jako środek antyseptyczny w miejsce jodoformu. Działa czasem trująco.

## Thiosinamin.

Połączenie należące do grupy eterycznego olejku gorczyczanego poleca Hebra (na kongr. dermatolog.) do wstrzykiwań w tkaninę liszaja żrącego (Lupus), jako środka niesprawiającego zaburzeń w organizmie.

## Tribromphenol zob. Bromol.

## Trionalum et Tetronalum.

Kryształy bez smaku i woni w ciepłej wodzie, wysoku rozpuszczalne. Środek nasenny.

Dawka 1—3·00 pro dosi 4·00 pro die.

(10 grm. 2 złr.).

## Tumenolum.

Produkt otrzymany z łupków bitumicznych przez suchą destylację. (Wielkie podobieństwo z Ichtyolem). Stosownie do sposobu, użytego przy wyrabianiu, powstają 3 preparaty: 1) T. venale w postaci gęstej brunatnej cieczy (mieszanki z Tumenol. sulfonu i kw. tumenolo sulfonowego). 2) Tumenolsulfon, nazwany przez Neissera „olejem tumenolowym.” 3) Kwas tumenolosulfonowy. Używa się do gojenia owrzodzeń, nadżerek, eczema, jako środka suszącego i zmniejszającego stan zapalny:

a) w 2—5<sup>0</sup>/<sub>0</sub> roztworze wodnym do okładów.

b) jako pasta 5—10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

*Rp. Tumenoli* 2·50—5·00,

*Flor. zinci*

*Bismut. subnitr.* āā. 2·50,

*Ung. lenientis*

*Ung. simpl.* āā. 25·00.

c) jako tinctury:

*Rp. Tumenoli, Aetheris, Spir.*

*rectif. Aqu. dest.* āā. 15·00.

d) proszek tumenolowy (kwas tumenolosulfon.) do posypek na owrzodzenia (posmarowane poprzednio tłuszczem).

(T. venale 1 klgr. = 18 złr.).

## Thymacetinum.

Derywat Thymolu, w postaci proszku białego, trudno w wodzie rozpuszcz. Działa podobnie jak Phenacetyna.

Dawka 0·25—1·00. Dokładniejszych opisów dotąd niema.

## Uralium zob. Chloralurethanium.

## Urethan.

Białe kryształy bez woni, rozpuszczają się łatwo we wodzie, wysoku i eterze. Łagodny śro-

dek nasenny, zwłaszcza dla starców i dzieci.

Dawka 1—2—5'00 dla dorosłych, 0'50 dla dzieci (w wodzie ocukrzanej) lub:

*Rp. Urethani 1'00,*

*Aq. flor. tiliae*

*Aq. flor. aur.*

*Syr. Sacch. āā. 20'00.*

MDS. Co godzinę łyżeczkę.

(10 grm. 30 ct.).

## Wyciąg z pijawek.

Wytrawia się wyskokiem przednie części pijawek, następnie traktuje się je wodą. Oblicza się 6—10 cm.<sup>3</sup> roztworu na każdą pijawkę. Otrzymuje się płyn bezbarwny, obojętny, niedający osadu. Wyciąg przedstawia własność

przeszkadzania ścinaniu się krwi, wstrzyknięty np. do v. jugular. królika sprawia, iż krew później z innych żył tegoż upuszczona, może być innemu zwierzęciu wstrzyknięta. Również krew świeżo wypuszczona, zaprawiona wyciągiem, nie krzepnie i w tym celu bez szkody dla organizmu wstrzykniętą być może. Ilość wyciągu, odpowiadająca główce jednej pijawki, wystarcza do przeszkodzenia ścięcia się 100 cm.<sup>3</sup> krwi na przeciąg 2 godzin, poczem przez dodanie nowej ilości można utrzymać krew w świeżym stanie. Własność ta wobec nieszkodliwości wyciągu z pijawek dla organizmu, może być przydatną przy transfuzji krwi.





# WAŻNIEJSZE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZAKŁADY

zdrojowo-kąpielowe, wodolecznicze,  
galaktoterapeutyczne, klimatyczne, kąpieliska morskie  
i sanatoria,  
tudzież

WYBÓR NAJODPOWIEDNIEJSZYCH ZDROJOWISK  
do leczenia poszczególnych chorób.

---

Skrócenia: C. = Celsius.

L. Zkł. = lekarz zakładu.

L. L. = lekarze.

m. = miasto.

mtr. = metrów,

n. p. m. = nad powierzchnią morza.

p. kąp. = pora kąpielowa.

p. pob. = pora pobytu.

p. zdroj. = pora zdrojowa

St. k. ż. = stacja kolei żelaznej.

St. klim. = stacja klimatyczna.

wtrz. = wewnątrznie.

wś. = wieś.

Zkł. = zakład.

ztrz. = zewnątrznie.

---

**Abbazia** przy morzu Adryatyckiem, obecnie modna St. klim. zimowa. p. pob. od 15 IX do 15 V.

**Abano** górno Włochy, 10 kilm. od Padwy, 31 mtr. n. p. m. cieplice słono jodobromowe, 36—82° C.

**Abas-Tuman** Ces. rossyjsk. Kaukaz, 195 m. n. p. m. 3 zdroje ciepłocy siarczanej 30—32° C. składem chemicznym zbliżone do francusk. Aix-les-bain albo do Cauterets.

**Aachen** = **Akwizgran** Prusy nadreńskie, 176 mtr. n. p. m. najsilniejsze cieplice alkaliczno muryjatyczno siarczane, 45—50° C. urządzenia kąpielne i na porę zimową.



**Ahrweiler** w Prusach nadreńsk. zdroj znany pod imieniem Apollinarisbrunnen, szczawa alkaliczna, w ogromnej ilości (rocznie do 10 milionów flaszek) na handel rozsyłana przez Towarzystwo akcyjne angielskie, dzierżawiące zdroj wspomniany. Jestto dowód, co może angielska reklama, skoro blachy ten towar tak wielki ma odbyć.

**Acqui** Pijemont, 140 mtr. n. p. m. liczne słono siarczane cieplicze zdroje, 36—82° C.

**Adelheitsquelle = Heilbrunnen** Bawaryja, 774 mtr. n. p. m. szczawa jodobromowa słona, przeważnie do rozsyłki używana.

**Aix-les-Bains** Sabaudyja, 288 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 45° C. znakomite balneotechniczne urządzenia kąpielne przez cały rok do użycia.

**Ajaccio** Korsyka, St. klim. zimowa. p. pob. od 15 X do 30 IV.

**Akwizgran** zob. Aachen.

**Algier** północ. Afryka St. klim. zimowa. p. pob. od 1 XI do 15 IV.

**Amelié-les-Bains** Francya, 222 mtr. n. p. m. słynne z balneotechnicznych swych urządzeń i z łagodnego klimatu cieplice siarczane, 64° C. przez cały rok do użycia.

**Arco** Tyrol południowy, 93 mtr. n. p. m. St. klim. zimowa, niedawno zaprowadzona. p. pob. od 1 IX do 16 V.

**Arnstadt** Turyngja, 300 mtr. n. p. m. silna jodobromowa solanka, 24% soli kuchen. zawierająca.

**Aussee** Styryja (Salzkammergut), 650 mtr. n. p. m. silna solanka, 24.5% soli kuchennej zawierająca.

**Baden pod Wiedniem** czyli Baden rakuski, 218 mtr. n. p. m. cieplice ziemno siarczane, 26—33. 7° C.

**Baden w Szwajcaryi** czyli Baden helwecki, 382 mtr. n. p. m. cieplice ziemno słono siarczane, 48° C.

**Baden-Baden** w W. Ks. Badeńskim, 200 mtr. n. p. m. cieplice solankowe, 65—68° C. najwytworniejsze i najliczniej uczęszczane niemieckie zdrojowisko, klimat bardzo łagodny, licznie używane jako St. klim. przejściowa.

**Badenweiler** w W. ks. Badeńskim, 422 mtr. n. p. m. cieplice obojętne, 26.5% C. klimat łagodny.

**Bagnères de Luchon** Francya (depart. gór. Garonny), 628 mtr. n. p. m. pyrenejskie cieplice siarczane, 16—68° C. znakomite balneotechniczne urządzenia.

**Bardów = Bartfeld** półn. Węgry, na pograniczu Galicyi, 310 mtr. n. p. m. szczawy wapniowo żelaziste, urządzenia balneotechniczne przestarzałe.

**Baréges** Francya, Pyreneje, 1232 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 13—42° C.

**Bex** Szwajcarya, 440 mtr. n. p. m. silna solanka 17%, tudzież St. klim. przejściowa.

**Birsztany** Litwa (gubern. wileńska), solanka od 0 do 3%, wysokość nad p. m. ?

**Biaritz** Francya, w zatoce Biskajskiej, kąpielisko morskie.

**Bockiet** Bawarya, 1 godz. od Kissingen, 195 mtr. n. p. m. silne żelaziste źródło, bardzo zamożne w kwas węglowy.

**Bojarka** wieś, pół godz. od Kijowa, zakład kumysowy.

**Bordighera** półn. Włochy, nad zatoką genueńską, St. klim. zimowa, rywalizująca ze sąsiednią San-Remo. p. pob. od 15 X do 15 IV.

**Bormio** = **Worms** górne Włochy, 1375 mtr. n. p. m. cieplice obojętne, 35--40° C. pora kąpielowa tylko w Lipcu i Sierpniu.

**Botzen** połud. Tyrol, 260 mtr. n. p. m. St. klim. przejściowa (niekorzystna) i winogrodowe uzdrowisko.

**Borżum** Ces. rosyjsk. Kaukaz, 440 mtr. n. p. m. zdroje alkaliczno muryatyczne ciepłe, 23--30° C. składem chemicznym zbliżone do Vichy.

**Buda** = **Ofen** = **Budapest** stolica Węgier, cieplice słabo siarczane, 45--63° C. wspaniałe urządzenie t. z. Kaiserbad, Raitzenbad i Lucasbad, pensjonat w zimowym sezonie od osoby od 2 Złr. dziennie. W pobliżu Budy są bardzo liczne źródła wód gorzkich, najważniejsze: Hunyady, Attila, Deak, Rakoczy i Wiktorya.

**Bourbonne les Bains** Francya (Wogezy), 272 mtr. n. p. m. silne słone cieplice, 58--66° C.

**Burkut** Galicya (obwód Kołomyjski), szczawa alkaliczno-żelazista, dojazd arcytrudny.

**Busko** Król. polskie (powiat Stopnicki), Zakład zdrojowo-kąpielowy wód solno alkaliczno siarczanych, Dr. Dobrzański dzierżawca zakładu, LL. Dr. Dymnicki, Grabowski, Majkowski, L. zakł. i Szpitala, tudzież Dr. Sulimirski.

**Burtscheid** Prusy nadreńskie, niedaleko Akwizgranu, cieplice z akwizgrańskimi identyczne, 59--74° C.

**Cairo** = **Kair** (Afryka Egipt), St. klim. zimowa, powietrze gorące, umiarkowano wilgotne, rano i wieczór gwałtowny spadek ciepłoty. p. pob. od 15 X do 15 IV.

**Cannes** Francya, tuż nad morzem Śródziemnem, St. klim. zimowa znakomita. p. pob. w celu klimatyczn. od 1 X do 1 V, dla kąpiel morskich od 1 V do 30 X.

**Canstadt** Król. wirtemberskie, 218 mtr. n. p. m. solanka od 0 do 2‰, 8--20° C. niemiecka St. klim. przejściowa.

**Carlsbad** = **Karlsbad** Czechy, 386 mtr. n. p. m. najslynniejsze cieplice alkaliczno glauberskie, 42--73° C. Dr. Dr. polacy: Hasiewicz, Prof. Jaworski, Kretowicz, Rosenberg, Stiche i Tugendhat.

**Catania** Sycylia, najcieplejsza miejscowość w Europie, St. klim. zimowa. p. pob. od 15 XI do 30 III.

**Charlottenbrunn** Szląsk pruski, 440 mtr. n. p. m. szczawa ziemno żelazista.

**Churwalden** Szwajcaryja, 1217 mtr. n. p. m. St. klim. górska.

**Cautérets** Francya, (dep. wysok. Pyrenejów), 992 mtr. n. p. m. słynne cieplice siarczane, 15--55° C. p. kąp. od 15 VI do 15 IX.

**Ciechocinek** Król. polskie, st. k. ż. warszaw. bydgoskiej, solanka 0½--4‰, Dr. Dr. Certowicz, Lewenstein, Lębowski, L. Zkł. Pajewski, Ruppert, Stockmann, Taunnenbaum i Wolberg.

**Cieplíce czeskie = Teplitz - Schönan** Czechy, 220 mtr. n. p. m. słynne cieplíce obojętne, 32—48° C. Lek. Dr. Skrzyński.

**Cieplíce trenczyńskie = Trenczyn - Trencsin - Teplitz** Król węgierskie, 259 mtr. n. p. m. cieplíce siarczane, 38—40° C. L. Dr. Filipkiewicz.

**Cieplíce warażyńskie = Töplitz - Warasdin = Waraźdyn** Kroatya, 274 mtr. n. p. m. cieplíce ziemno siarczane, 57° C.

**Colberg = Kołobrzeg** Prusy pomorskie, kąpielisko morskie i solankowe 4—5% soli kuchennej zawierające, wzajemnego połączenia obu rodzajów kąpiel następczące.

**Contrexeville** Francya (Wogezy), 342 mtr. n. p. m. wybitnie ziemne źródła.

**Cranz = Kranzkuhren** po polsku **Koło** Prusy zachodnie, 4 mile od Królewca, morskie kąpiele, bardzo uczęszczane przez Polaków.

**Cudowa = Kudowa** Śląsk pruski, 412 mtr. n. p. m. szczawy alkaliczno ziemno żelaziste.

**Davos** dwie obok siebie miejscowości: Davos-Dörfli i Davos am Platz, Szwajcaryja, 1570 mtr. n. p. m. najznakomitsza klimatyczna alpejska zimowa St. przez cały rok do używania. Pensjonat od osoby 10—15 frank. dziennie. Od dwóch lat jest tu dobrze urządzone Sanatorium Dr. Turbanna.

**Dieppe** Francya (Normandya), wyborne morskie kąpielisko.

**Driburg** Westfalia, 200 mtr. n. p. m. szczawy alkaliczno ziemno żelaziste.

**Dorna — Watra** zwykle **Dorna**, Bukowina w Karpatach, wysokość n. p. m.? silne szczawy alkaliczno żelaziste.

**Druskieniki** Litwa (guber. grodzieńska), 17 kilm. od St. k. ż. warszawsko petersburskiej, 200 mtr. n. p. m. solanka 1%, L. L. Bujakowski i Szepietowski.

**Druźbaki**, niemiec. **Rauschenbach**, węgiers. **Felső-Ruszbach**, dwie wsie: Druźbaki niżnie i wyżnie, Węgry (Spiz), wysokość n. p. m.? cieplíce wapniowa, 24. 2° C. już w r. 1541 opisana przez Wernhnera, a po polsku w r. 1640 przez Petricego, w 17 wieku przez magnatów polskich licznie odwiedzane.

**Eaux-Bonnes** Francya (depart. doln. Pyrenejów) 748 mtr. n. p. m. cieplíce siarczane, 32% C.

**Eaux - chaudes** Francya (depart. doln. Pyrenejów), 675 mtr. n. p. m. cieplíce siarczane, 11—36° C. o 6 klm. od poprzednich odległe.

**Elster** Saksonija, 457 mtr. n. p. m. alkaliczno słono żelaziste wody, identyczne z Francensbadem, wyborne balneotechniczne urządzenia, L. Zakł. Dr. Flechsig, znany balneolog, tudzież polak Dr. Błociszewski.

**Ems** Ks. Nassauskie, 91 mtr. n. p. m. słynne cieplíce słono alkaliczne, 28—46° C. nader wielki export ich wód.

**Ernsdorf** zobacz **Jaworze**.

**Euganejskie źródła** Włochy w zachodniej stronie Padwy, dawniejsze podmorskie wulkaniczne wzgórza ujawniły



tu liczne i silne cieplice ziemno słone, 60—70° C. w miejscowościach: Abano, Bataglii i St. Pietro Montagnone.

**Essentuki** Ces. rossyjsk. Kaukaz, 24 źródeł, stanowiących dwie grupy: zdroje alkaliczno słone, a z tych dwa najważniejsze, oznaczone Nr. 17 i 18, na miejscu i do rozsyłki używane, składem chemicznym zbliżone do Luchaczowic; nadto jest tu źródło siarczany zimny. Dr. Badde tudzież Prof. Prof. Drowie Woskreszynsky i Alexejew podnieśli bardzo ważne ujemne strony źródeł essentuckich mianowicie Nr. 20, 21 i 22 oznaczonych.

**Fachingen** Prusy (okrąg rządowy Wiesbaden), 112 mtr. n. p. m. wyborna czysta alkaliczna szczawa, zamożna w kwas węglowy, mnogo rozsyłana do dyetetycz. i leczniczego użycia.

**Falkenstein** Prusy (prowincyjeya Hessén-Nassau), 440 mtr. n. p. m. Sanatorium dla chorych piersiowych, wzorowo urządzone, kierownik Dr. Dettweiler, pensjonat od osoby 7—11 marek dziennie.

**Fellathalquellen** Karyntyja, 598 mtr. n. p. m. proste alkalicz. szczawy, z niemieckich najzamożniejsze w dwuwęglan sodowy.

**Flinsberg** Szląsk pruski, 528 mtr. n. p. m. szczawy alkalicz. żelaziste, tudzież St. klim. górską leśną.

**Frankenhausen** Turyngija, 115 mtr. n. p. m. solanka 2%, Sanatorium dla skrufulicz. dzieci od 2 do 4 lat, za cztero-tygodniowy pobyt 60 mrk. od chorego.

**Francensbad** Czechy, 3½ klm. od m. Eger, zkał dawna nazwa Eger-Francensbad, 423 mtr. n. p. m. alkaliczno słono żelaziste szczawy, zamożne w kw. węglowy, wzorowe balneotechniczne urządzenia kąpielne. LL. polacy: Dembicki, Frenkel, Kitel i Rosner Jan.

**Fürstenhof** Styryja, prywatny folwark przy m. Kapfenbergu, 533 mtr. n. p. m. Zkł. hydropatyczny Dra Czerwińskiego, przeważnie przez Polaków uczęszczany, pensjonat 30 do 40 Złr. tygodniowo od osoby.

**Gainfarn** przy m. Vöslau pod Wiedniem, 200 mtr. n. p. m. Zakł. hydropatyczny Dra Friedmanna, pensjonat 50 Złr. tygodniowo od osoby.

**Gais** Szwajcarya (kant. Appenzell), 935 mtr. n. p. m. najdawniejszy zkł. galaktoterapeutyczny, pensjonat 4—6½ frank. dziennie od osoby.

**Gastein = Wildbad-Gastein i Hof-Gastein** po pols. Gastuń Austryja (Ks. Salzburgskie), 960 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 24—48° C. klimat czysto alpejski.

**Giesshübl-Puchstein** pod Karlsbadem, Czechy, 340 mtr. n. p. m. prosta szczawa alkaliczna. export roczny do dyetetycznego użytku około 4 milionów flaszek. Jest tu Zkł. hydropatyczny.

**Gleichenberg** Styryja, 248 mtr. n. p. m. szczawy alkalicz. muryatyczne, klimat łagodny, urządzenia balneotechniczne wzorowe, LL. polacy: Brühl i Bulikowski.

**Gmunden** Austryja górna, 415 mtr. n. p. m. St. klim. powietrzna letnia, kąpiele solankowe z wody słonej Ebensee, 24% soli kuchen. zawierającej.

**Goczałkowice** Szląsk pruski,  $\frac{1}{4}$  godz. od St. k. ż. Pszczyny (Pless), 266 mtr. n. p. m. solanka jodobromowa,  $3\frac{0}{10}$  soli kuchennej, znaczny export stężonej solanki i soli zdrojowej.

**Goretszowodzk** Ces. rossyjs. Kaukaz, w górach kabardyńskich, cieplice siarczane  $71^{\circ}$  R. gorące.

**Görbersdorf** Szląsk pruski, 450 mtr. n. p. m. Sanatorium dla chorych piersiowych, ś. p. Dra Brehmera, obecnie pod kierunkiem Dra Achtermanna, cały rok otwarte. Pensjonat czterotygodniowy 300 marek. Obok poprzedniego zakładu jest drugi Dra Römplera nieco tańszy.

**Gräfenberg** Szląsk austriacki, 580 mtr. n. p. m. przez swego założyciela Priessnitza najdawniejszy i powszechnie znany Zkł. hydropatyczny.

**Griess** połudn. Tyrol, 670 mtr. n. p. m.  $\frac{1}{4}$  g. od Botzen, St. klim. zimowa i uzdrowisko winogrodowe. p. pob. od 15 IX do 15 V.

**Griesbach** W. ks. Badeńskie, 496 mtr. n. p. m. szczawy alkalicz. żelaziste.

**Grodzisko** Król. pols., St. k. ż. warszaw. wiedeńskiej, wysokość n. p. m.? Zkł. kąpielowo leczniczy, dom zdrowia z wygodami, żywienie dyetetyczne z kuchni zakładu, L. i właściciel Zkł. Dr. Bojasiński. konsultant Dr. Rzecznowski.

**Hall** Górna Austryja, 376 mtr. n. p. m. jodobromowa solanka  $1\frac{0}{10}$ .

**Hall** austr. Tyrol, 537 mtr. n. p. m. solanka  $26\frac{0}{10}$ , urządzenia kąpielne liche.

**Hall = Schwäbisch Hall** król. Wirtembergs., 190 mtr. n. p. m. solanka  $2\frac{4}{10}$ .

**Hallstadt** Austryja (Salzkammergut przy Ischlu), solanka  $27\frac{0}{10}$ , wysokość n. p. m.?

**Harkany** połud. Węgry, 90 mtr. n. p. m. cieplice siarczane,  $62^{\circ}$  C. Szczególną własnością tutejszej cieplicy jest wydobywający się z niej tleno siarczek węgla (Kohlenoxydsulfid), który zapalony pali się niebieskawą barwą.

**Helgoland** wyspa m. północnego, kąpielisko morskie. p. kap. od 1 VI do 1 X.

**Herkulesbad** zobacz **Mehadia**.

**Homburg** Ks. Nassauskie (okrąg rządowy Wiesbaden), 189 mtr. n. p. m. zdroje żelazisto glaubers. i żelazisto słone, klimat dobry a urządzenia wspaniałe.

**Hyeres** Francya, 1 godz. od Toulonu, 100 mtr. n. p. m. St. klm., dzienne wahania ciepłoty gwałtowne, przeto dla chorych piersiowych miejscowość nieodpowiednia. p. pob. od 1 X do 1 V, jednak najwięcej chorych wyjeżdża już na początku Marca, z powodu panujących o tej porze wiatrów.

**Inowrocław** po niemiecku **Inowrazlaw** Ks. Poznańskie, m. powiatowe, od r. 1876 urządzony Zkł. silnych kąpiel solankowych  $25\frac{0}{10}$ , własność Towarzystwa akcyjnego, zawiązanego staraniem Dr. Dr. Wilkońskiego, Grabowskiego i Rakowskiego. L. L. Krzymiński i Przybyszewski.

**Interlaken** Szwajcaryja (kant. Bem.), 568 mtr. n. p. m. St. klim. podalpejska i uzdrowisko galaktoterapeutyczne.

**Ischl** Austryja (Salzkammergut), 484 mtr. n. p. m. solanka 24<sup>0</sup>/<sub>10</sub>, klimat łagodny, wilgotno ciepły.

**Iwonecz** Galicyja, St. k. ż. transversalnej, 410 mtr. n. p. m. szczawy jodobromowo słone, opisywane od r. 1630, około 400 pokoiów gościnnych, 3 gmachy lazienkowe z 114 wannami do kąpieli, zdroj. Bełkotki słynny gazem bagiennym łatwo zapalnym, L. Zł. Dr. Dembicki, tudzież Dr. Kaden.

**Jastrzębie** niemiec. **Königsdorf - Jastrzemb** Szląsk pruski, 250 mtr. n. p. m. wody słone brom zawierające.

**Jaszczurówka** Galicyja w Tatrach przy Zakopanem, adtynencya wsi Poronina, 909 mtr. n. p. m. jedyna polska cieplica obojętna 21° C. kąpiele w zbiorniku, hotel wygodnie urządzony.

**Jaworze** niemiec. **Ernsdorf** Szląsk austrijski u stóp Beskidu, 1 mila od Bielska, 360 mtr. n. p. m. Zł. wodolecznicy i żętyczny, kierownik Dr. Kowalski.

**Johannisbad** Czechy, 600 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 29° C. St. klim. powietrzna letnia.

**Juliushall** Brunświk, 317 mtr. n. p. m. solanka 6<sup>0</sup>/<sub>10</sub>, St. klimatycz. powietrzna na lato.

**Karlsbad** zobacz **Carlsbad**.

**Kaltenleutgeben** Austryja, 2 godz. od Wiednia, pierwszorzedny w Austrii Zł. hydropatyczny, własność Prof. Dra Winternitza, mogący współcześnie pomieścić około 900 chorych, racjonalnie i wzorowo prowadzony, pensjonat od osoby 50 Zlr. tygodniowo.

**Kamionka** Podole rossyjs. miasteczko nad Dniestrem, jedyne polskie uzdrowisko winogrodowe.

**Kisłowodzk** Ces. rosyjsk. Kaukaz, guber. Stawropolska, 867 mtr. n. p. m., liczne i rozmaite źródła, z tych najważniejszy zdroj. Narsan (w narzecz krajowym ma znaczyć olbrzymie źródło), szczawa alkalicznie słono żelazista z ogromną ilością kwasu węglowego, w analizie zdroju cyfrą niewyrażoną; 83 hektolitrow na 1 minutę wody dostarczająca, pomieszkania i gmachy zdrojowe są odpowiednie a nawet wspaniałe.

**Kissingen** Bawarya, 190 mtr. n. p. m. pierwszorzedne zdrojowisko pod względem balneotechn. urządzeń i komfortu, znakomite szczawy żelazisto słone, 10—20° C. Ł. Dr. Chłapowski.

**Kołobrzeg** zobacz **Colberg**. Dr. Weissenberg (po polsku).

**Königswart** Czechy, 1 godz. od Maryenbadu, 632 mtr. n. p. m. szczawy alkalicz. żelaziste w kw. węglowy zamożne.

**Kösen** Prusy (prow. saska), 110 mtr. n. p. m. solanka 5<sup>0</sup>/<sub>10</sub>, zamożna w siarkany alkaliczne i wapniowe, uznana za północno niemiecki ogródek dziecięcy.

**Köstritz** Saksonija, 170 mtr. n. p. m. 22<sup>0</sup>/<sub>10</sub> solankowe kąpiele, tudzież gorące piaskowe, tak urządzone, iż chory leżąc, na świeżem powietrzu może przebywać.

**Korytnica** Węgry, komitat lipowski, w Karpatach, 796 mtr. n. p. m. zdroje ziemno żelaziste, klimat łącie karpacki.

**Krankenheil** przy Tölz (górna Bawaryja), 666 mtr. n. p. m. jodosodowo siarczane zdroje, z których przyrządzane ką-



piele wzmacniają solą zdrojową i takimże mydłem, bywają zazwyczaj zastósowane zbyt gorąco i długo.

**Krapina-Töplitz** Króacyja, 160 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 41—43° C.

**Krasnobród** w. Król. polskiem, gub. lubelska, pow. zamojski, St. k. ż. nadwiślańskiej Rejowiec, od r. 1888 Zł. kumysowy i uzdrowisko klimatyczne z pensjonatem dla chorych piersiowych, utrzymanie miesięczne z kumysowem leczeniem od 75 do 100 r. s. L. L. Zł. Dr. Dr. A. Rose i Skłodowski.

**Kranz** zobacz **Cranz**.

**Kreuth** Bawaryja, 812 mtr. n. p. m. pierwszorzędny zakład galaktoterapeutyczny niemiecki, idylliczne położenie, pyszne lasy, najstarsze promenady wolne od kurzu, klimat ostry, wachania dziennej ciepłoty gwałtowne, wyborna żentycza.

**Kreuznach** Bawaryja, 106 mtr. n. p. m. słaba solanka, odrobinę jodku i bromku sodu zawierająca, o ciepłocie 8—30° C. zasilana 6 źródłami słonemi, pochodzącymi z miejscowości Münster am Stein, o 25 minut od Kreuznach odległej, ogromny export wyrabianego ługu i soli zdrojowej.

**Krondorf** Czechy, 1 mila od Karlsbadu, prosta szczawa alkaliczna, corocznie około 1 miliona flaszek do dyetetycznego użycia rozsyłana.

**Krynica** Galicyja, St. k. ż. Muszyna-Krynica, 589 mtr. n. p. m. z filialnym źródłem w Slotwinach, nadto zakład hydropatyczny pod kierunkiem Dra Ebersa, z pensjonatem od osoby dziennie 5—7 Złr. tudzież zakład dyetetyczny własność Dra Skórczewskiego, za opłatą tygodniową od osoby 24—42 Złr., 18 źródeł szczawy alkaliczno ziemno żelazistej, bardzo zamożnej w kw. węgl wy, wzorowe urządzenia balneotechniczne kąpieli: mineralnych, borowinowych i suchych gazowych, L. Zł. Dr. Kopff, nadto Dr. Dr. Askenazy, Blatteis, Cercha, Ebers, Godlewski, Lorentski, Kmietowicz, Michalik, Skórczewski i Widmann. 1200 pokoi gościnnych, 2 gmachy łazienne o 100 wannach, klimat podalpejski, na miejscu wyrób pastylek krynickich i wyciągu z igliwia świerkowego na kąpiele balsamiczne.

**Krzeszowice** w ks. Krakowskiem, St. k. ż. 24 kiln. od Krakowa, zakład kąpielny wód siarczanych, Lekarz Zakładu Dr. Dura.

**Kudowa** zobacz **Cudowa**.

**Kumagorsk** Ces. rosyjs. Kaukaz, zdroj siarczany 25° R. ciepły.

**Landeck** Szląsk pruski, 452 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 22—29° C. nieco siarkowodu i siarczku sodu zawierające, L. Zł. Dr. Ostrowicz, Dr. Pomorski wśród sezonu.

**Langenbrücken** W. ks. Badeńskie, 138 mtr. n. p. m. zimne wody siarczane.

**Levico** Tyrol południowy, 533 mtr. n. p. m. zdroje z siarkanem żelaza, zawierające niedokwas miedzi i arsen, używane przeważnie do rozsyłki.

**Libawa** kąpielisko morskie w Bałtyku.

**Lipik** Sławonija, 158 mtr. n. p. m. alkal. muriat. jodowa cieplica, 46—63° C.

**Lippsringe** Prusy (Westwalija), 126 mtr. n. p. m. wody ziemno żelaziste, tutejsze gazy źródłane: z tlenu, azotu i kw. węglowego złożone, używane są do wzięwań.

**Lubień** Galicyja 3 mile od Lwowa, 275 mtr. n. p. m. bardzo obfite zimne źródła siarczane. L. Zkł. Dr. Rygier.

**Lubownia nowa** Węgry (Spiż), 556 mtr. n. p. m. w pięknym i rozległym parku, szczawy alkalicz ziemno żelaziste. Tutejszy zamek pamiętny przytulkiem Jana Kazimierza i wytnieniem J. Sobieskiego w powrocie z pod Wiednia

**Madeira** północ. Afryka z m. Funchal, słynna St. klim. południowa wilgotno gorąca, pobyt tu zwykle wymagany do 2 lat, pensjonat najtańszy tygodniowo 12—15 funt szterl. od osoby.

**Maryenbad** Czechy, 640 mtr. n. p. m. położenie zakładu idylliczne, klimat wilgotny, ranki i wieczory chłodne, alkaliczno glauberskie zimne źródle w g. węglowy zamożne, wzorowe urządzenia balneotechniczne, L. Zkł. Prof. Kisch, znany balneolog, L. L. polacy: Dobieszewski, Jaroszyński Kaufmann i Prager.

**Maryówka** zakład hydropatyczny 6 kiln. od Lwowa, świeżo (1892) a przez cały rok otwarty, własność E. Brajera, kierownik Dr Legeżyński, koszt tygodniowego pobytu od 25 Złr. i wyżej.

**Mehadia = Herkulasbad** przy **Mehagyi** Węgry (Banat), 174 mtr. n. p. m. Słynne cieplice siarczane 39—44° C.

**Meinberg** w ks. Lippe-Detmold, 210 mtr. n. p. m. ziemno i słono siarczane źródle, kąpiele: siarczano mułowe i gazowe.

**Mentona = Mentone** połud. Francyja, 1 godz. k. ż. od Nizy, w zatoce genueskiej, St. klim. nader korzystnie położona, umiarkowano wilgotna a bardzo ciepła, pensjonat dziennie od osoby 10 franków. p. pob. od 1 X do 30 IV.

**Meran** wraz ze sąsiednimi gminami: Ober- i Untermais tudzież Gratsch, połud. Tyrol. 319 mtr. n. p. m. Uznana i znakomita St. klim. zimowa, p. pob. od 15 IX do 15 V, w pensjonatach wyborna kuchnia, 4—5 Złr. dziennie od osoby, wiosną leczenia galaktoterapeutyczne, jesienią winogrodowe. Lekarz polak Dr. Brühl.

**Mergentheim** król. Wirtembergskie 191 mtr. n. p. m. Zakład od miasta 1000 kroków odległy. od swego źródła Carlsquelle, nazwany Carlsbadem, ma wodę słono gorzką, którą w podparowanym stanie na handel rozsyłają.

**Michajłowodzkie** źródła Ces rosyjs. Kaukaz, cieplice siarczane i słono siarczane o temperaturze od 26—55° R.

**Misdroy** Pomeranija, dobre i ulubione kąpielisko morskie, lecznica prywatna dla żołdowych dzieci.

**Mondorf** W. ks. Luxemburskie, 198 mtr. n. p. m. 1—5‰, cieplica bromowo solankowa, 24° C. przeważnie na kąpiele używana.

**Monsummano** Włochy (prowincyja Lucca), oprócz cieplic siarczanych 40—50° C., posiada grootę z naturalną parą, służącą na kąpiele gazowo parowe.

**Mont-Dore** Francyja (depart. Puyde Dome), 1046 mtr. n. p. m. klimat zmienny i ostry, cieplice solankowe 42—45° C. ze śladem arsenu.

**Montreux** Szwajcarya (nad jeziorem Genewskim kant. Waadt), wspólna miejscowość z 20 sąsiednich gmin złożona, 979 mtr., n. p. m. St. klim. zimowa, o wiele chłodniejsza jak Meran. Zetyczne tudzież winogrodowe leczenie. p. pob. od 1 IX do 15 V.

**Morszyn** Galicyja (obwód Stryjski), 316 mtr. n. p. m. oprócz słonych źródeł, znakomite słono gorzkie źródło, wyrób odnośnej soli zdrojowej do picia i na kąpiele, zakład zdrojowy jest własnością „Towarzystwa lekarzy galicyjs.” stanowiąc fundusz wdów i sierót pozostałych po lekarzach. L. Zł. Dr. Medwey.

**Naleczów** Król. polskie, o 10 kilm. od Lublina, źródło ziemno-żelaziste, skąpe w kwas węglowy, zakłady: kąpielny, hydropatyczny (przeważnie) i kumysowy, pensjonat dziennie 3½ do 5 r. s. od osoby, Dr. Chmielewski Dyrektor Zł. tudzież Dr. Dr. Chęłchowski, Doliński i Nusbaum jako specjaliści.

**Nauheim** X. Hessen-Darmstadt, 140 mtr. n. p. m. najsilniejsza niemiecka cieplica solankowa, nader zamożna w kw. węglowy, 35° C. położenie rozkoszne, urządzenia balneotechniczne wyborne.

**Nenndorf** Prusy (prowincja Hessen-Nassau), 71 mtr. n. p. m. zimne wody siarczane, z niemieckich najsilniejsze, tudzież solanka 6‰ wzorowe urządzenia balneotechniczne.

**Nervi** Włochy przy Genui. St. klim. południowa, pensjonat 10—12 frank. dziennie od osoby. p. pob. od 1 X do 1 V.

**Neuenahr** Prusy nadreńskie, 87 mtr. n. p. m. cieplice alkaliczne 20—40° C. analogiczne z Ems i Vichy, klimat łagodny.

**Nieklán** Król. polskie, St. k. ż. iwanogrodzko-dąbrowskiej tegoż nazwiska, świeżo otwarty Zł. hydropatyczny w willech hr. Platera, okolica leśna, kierownik Dr. Misiewicz.

**Niemirów** Galicyja (obwód żółkiewski), zimne siarczane źródło, zakład kąpielny opuszczony.

**Niederlangenau** Szląsk pruski, 359 mtr. n. p. m. szcawa alkaliczno-żelazista.

**Niederselters** zobacz **Selters**.

**Nizza = Nice** Francja (depart. Alp. morskich), tuż przy morzu Śródziemnem, ulubiona St. klimat, południowa, umiarkowano wilgotno ciepła, pensjonat od 10 do 20 frank. dziennie, L. polak Dr. Tymowski. p. pob. od 1 X do 1 V.

**Norderney** Prusy (Hanowers.), wyspa m. północnego, najznakomitsze niemieckie kąpielisko morskie, lecznica dla żołt-zowych chorych, pensjonat w hotelach 50 marek tygodniowo od osoby. p. kap. od 1 V do 15 IX.

**Nowe Miasto nad Pilicą** Król. pols. gubernia Piotrowska. Zakład wodoleczniczy Dra Bilińskiego, pensjonat od 2 r. 20 k. do 3 r. s. dziennie od osoby, L. L. Dr. Dr. Niedzielski i Pawiński.

**Obersalzbrunn** Szląsk pruski, 380 mtr. n. p. m. szcawy słono-alkaliczne, galaktoterapija, klimat przyostry i wilgotny, pobyt tani.

**Oyenhause = Rehme-Oyenhause** Prusy (Westfalia), 134 mtr. n. p. m. cieplice słone w kw. węglowy zamożne, 26—31° C. od 3‰ do 9‰ soli kuchennej zawierające.



**Ostenda = Ostende** Belgija, najwięcej uczęszczane kąpielisko morskie, wspaniałe i zbytkowne urządzenia, pobyt drogi, Zakład zbyt ruchliwy i bez spokoju.

**Palermo** stolica Sycylii, krajobraz pyszny, bogatą roślinnością umajony, klimat ogółem wilgotno ciepły, St. klimat. południowa, pensjonat w hotelu 15 lir. dziennie. p. pob. od 15 X do 30 IV.

**Pau** Francya (depart. niższych Pyrenejów), 207 mtr. n. p. m. St. klimatycz. zimowa, cieplejsza o 2° C. od Meranu, pensjonat 10 frank. od osoby dziennie. p. pob. od 1 X do 15 IV.

**Piätigorsk** Ces. rossyjsk. Kaukaz, guber. Stawropolska, 20 zdrojów siarczanej ciepłicy o temperaturze od 23° do 83° R. tudzież źródła alkaliczno żelaziste 11° R. majace, urządzenia kąpielne należyte nawet zbytkowne, p. pob. od 1 V do 1 X.

**Petersthal** W. ks. Badeńskie, 421 mtr. n. p. m. jedna z t. z. Kniebisbäder, najznakomitsze szczawy alkalicz. ziemno żelaziste.

**Pfäfers** zobacz **Ragatz - Pfäfers**.

**Plombiërs** Francya (Wogezy), 421 mtr. n. p. m. liczne źródła ciepłe obojętnych od 19 do 69° C. kąpiele wybornie urządzone.

**Pontresina** Szwajcaryja (kant. Graubinden), 1828 mtr. n. p. m. Schronisko letnie, mimo wielkiego wyniesienia, klimat łagodny, liczne hotele i pensjonaty, od 6 do 10 frank. dziennie od osoby.

**Prekups** Ces. rossyjs. 50 kilometr. od m. Jekatinodaru, cieplice alkaliczno siarczane od 19° do 42° R. z tych najużywanych od kąpiel źródła: Alexandra, Maryi i Michała.

**Pustomyty** Galicyja, 1 mila ode Lwowa, wody siarczane zimne, od r. 1879 skromny zakładzik zdrojowo kąpielny.

**Pymont** ks. Waldeck, 130 mtr. n. p. m. liczne źródła trzech rodzajów: proste szczawy, wody słone 4‰, a najważniejsze silne żelaziste zdroje, bardzo zamożne w kwas węglowy, pobyt drogi.

**Piszczyany = Pystjan** Węgry (komitat Neutra), 13b mtr. n. p. m. Cieplice siarczane 57—73° C. Tutejszy muł zdrojowy terapeutycznie ważny i bardzo używany na kąpiele.

**Rabka** Galicyja, St. k. ż. transversalnej, 500 mtr. n. p. m. najsilniejsze z europejskich zdroje słono jodobromowe, w tutejszym zakładzie jest od r. 1887 filia Szpitala św. Ludwika dla chorych dzieci; na miejscu wyrób soli zdrojowej i lugu; klimat podgórski, powietrze czyste, L. Zkł. Dr. Gluchowski, i Dr. Po-rembowicz.

**Ragatz-Pfäfers** Szwajcaryja (kant. St. Gallen), dwa zdrojowiska: Pfäfers 685 mtr. a Ragatz 521 mtr. n. p. m. których cieplice obojętne 38° C. służą wspólnie do użycia, pensjonat od 7 do 10 frank. dziennie. Ragatz zajmują osoby zamożne; zaś Pfäfers stanu średniego, spokoju szukające.

**Rehme** zobacz **Oeynhausien**.

**Reichenhall** Bawaryja, 457 mtr. n. p. m. podalpejskie zdrojowisko, stosunki klimatyczne pomyślne, dobra solanka 24‰ do kąpiel, tudzież zdroj pitny solankowy (Trinksoole) i woda

gorzka przyrządzana z żóły reichenhalskiej, g. kw. węglowym wysyconej, nadto wyborna żentycza i soki ze świeżych ziół wyciśnięte, jakoteż znakomity zakład aeropneumatyczny i inhalacyjny do wzięcia solankowych i balsamicznych (własność Macka) pod kierunkiem znakomitego pneumoterapeuty Dr. G. Liebiga będący, a drugi zakład inhalacyjny (własność Lehmana) urządzony według systemu Jahra, służą za środki kuracyjne. Ogółem urządzenia balneotechniczne wzorowe, między lekarzami zdrojowemi polak Dr. Zygm. Goldschmidt.

**Reinerz** Szląsk pruski, 558 mtr. n. p. m. źródło ziemno alkal. żelaziste, wyborna żentycza, klimat górski, kąpiele: mineralne, wodne i borowinowe znakomicie urządzone.

**Roncegno** połud. Tyrol, 535 mtr. n. p. m. źródło arsenowo żelaziste, do picia i do kąpiel na miejscu używany.

**Römerbad** połud. Styryja, 237 mtr. n. p. m. obojętne cieplice 36—38° C. klimat łagodny.

**Royat** Francja (depart. Puy de Dome), 450 mtr. n. p. m. cieplice alkaliczno muryatyczne, 20—35° C. klimat dosyć ostry, częste deszcze i burze, pobyt bardzo drogi, zdrojowisko od arystokracji wielce uczęszczane, urządzenia balneotechniczne znakomite.

**Rożnów = Roznau** Morawia, 400 mtr. n. p. m. zakład żentyczny, dosyć uczęszczany, liche urządzenia.

**Rymanów** Galicyja, (obwód sanocki), St. k. ż. transwersalnej, 3 źródła szczawy alkaliczno słono jodobromowej, od r. 1881 zakład kąpielny, wyrób soli zdrojowej, podczas lata kolonija wakacyjna dla ubogich dzieci ze Lwowa, L. Zł. Dr. Dukiet, nadto Dr. Krzyżkowski i Dr. Regiec.

**Saidschütz** Czechy, źródło wody gorzkiej mnogo rozsyłanej.

**St. Honore** Francja, 272 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 26—31° C. Wspaniałe balneotechniczne urządzenia.

**St. Sauver** Francja, 770 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 20—34° C. Najliczniej uczęszczane francuskie zdrojowisko.

**St. Moritz** Szwajcarya (kant. Graubünden), 1856 mtr. n. p. m. St. klim. alpejska i zakład silnych źródeł żelazistych, bardzo zamożnych w kwas węglowy, p. zdr. od 1 VI do 15 IX.

**Salzbrunn = Obersalzbrunn** Szląsk pruski, 380 mtr. n. p. m. szczawy solno alkalicz. i żelaziste, nadto środki galakto-terapeutyczne, znaczna rozsyłka tutejszych wód, urządzenia znakomite, tani pobyt.

**Salzschlirf** Prusy (prow. Hessen-Nassau), 240 mtr. n. p. m. jodobromowa solanka 10/0, w kw. węglowy zamożna, tudzież źródło gorzkie sodowo siarczany.

**Salzungen** ks. Sasko-Meiningen, 250 mtr. n. p. m. silne solanki 26/0, korzystne klimatyczne położenie uczyniło to zdrojowisko niezmiernie ulubionem letniem schroniskiem dla osób zolżowych i nieżytoom podlegających.

**San-Remo** Włochy (Riviera di Ponente) w zatoce genueńskiej, St. klim. południowa, która co do ochrony od wiatrów i jednostajności ciepłoty powietrznej przewyższa: Nizzę, Cannes i Hyeres. Uzdrowisko klim. zbyt świeże, stąd wiele do życzenia

pozostawia, pensjonat w hotelach 10—12 frk. dziennie od osoby p. pob. od 1 X. do 30 IV. L. Dr. Ostrowicz.

**Saxon = Saxon les Bains** Szwajcarya (kant. Wallis), 620 mtr. n. p. m. klimat niezdrowy, cieplice jodowe 25° C. pensjonat od 5 do 12 fr. dziennie od osoby.

**Schinzach** Szwajcarya (kant. Aargau), 342 mtr. n. p. m. klimat łagodny, cieplice ziemno siarczane 28—34° C. nadto zdroj jodowy z Wildegg, ulubiony zakład od zamożnych, wyborne urządzenia balneotechniczne, L. Zł. Dr. Tymowski.

**Schlangenbad** Prusy (prow. Hessen-Nassau), 313 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 32° C.

**Schwaibach = Langenschwalbach**, 282 mtr. n. p. m. silne szczawy alkal. żelaziste, wyborne urządzenia balneotechniczne, mnoga rozsyłka wód tutejszych.

**Szmeks = Schmecks i Neu Schmecks** po węgiers. Tatra-Füred, Węgry, 1011 mtr. n. p. m. ulubiona węgierska St. klim.-górska, Zł. hydropatyczny, lecznica dla chorych piersiowych na wzór w Davos niedawno tu zaprowadzona, pobyt drogi.

**Selters = Niederselters** Prusy (prow. Hessen-Nassau), wieś, szczawa alkaliczna, export roczny około 4 miliony flaszek, Zł. zdrojowego tutaj niema.

**Ślawinek** Król. polsk. pod Lublinem, wody alkaliczno ziemno żelaziste słabe, pozbawione gazu kwasu węglowego, skromny zakładzik zdrojowo kąpielowy, L. Zł. Dr. Olechowicz.

**Ślawuta** Wołyń, St. k. ż. brzesko-kijowskiej, St. klimat. leśna i zakł. kumysowy, lecznica dla chorób piersiowych pod światłym kierunkiem Dra Dobrzyckiego, Dr. Przesmycki konsultant, pensjonat 6-cio tygodniowy 150 r. s. od osoby.

**Ślotwiny** zobacz **Krynica**.

**Soden** Prusy (prow. Hessen-Nassau), 142 mtr. n. p. m. klimat łagodny, liczne źródła wód słonych w kw. węglowy zamożnych, 15—30° C. wyborne balneotechniczne urządzenia, pensjonat 36—45 mrk. tygodniowo od osoby.

**Solec** Król. polskie (powiat Stopnicki), wieś, zdroj zimny alkal. słono siarczany, z krajowych najsilniejszy co do siarkowodu i połączeń siarki, niesłusznie opuszczony, L. L. Dr. Dr. Daniewski i Siarczyński.

**Spaa = Spa** Belgija, 250 mtr. n. p. m. wytworny zakład kąpielny silnych wód alkalicz. żelazistych, w kwas węglowy zamożnych, dawniej od arystokracji licznie odwiedzany, obecnie po zniesieniu banku gry mało uczęszczany, opłata czyli taxa zdrojowa na sezon od 50 do 100 frk. w miarę ilości osób.

**Steben = Untersteben** Bawaryja (okrąg rządowy Oberfranken), 750 mtr. n. p. m. najwyżżej położone niemieckie zdrojowisko wód żelazistych, w kw. węglowy zamożnych, pobyt tani.

**Swoszowice** Galicyja, 10 kilom. od Krakowa, St. k. ż. transversalnej, dawniej słynne kopalnie siarki, zimne wapniowo siarczane zdroje ze zakładem kąpielnym, od niedawna restytuowanym, L. Zł. Dr. Skrzyński.

**Szczawnica** Galicyja (obwód Nowo-Sandecki), 523 mtr. n. p. m. wieś, 42 kilom. od St. k. ż. transversalnej Stary Sącz,



składa się ze Szawnicy niższej i wyższej tudzież ze środkowej adtynencyi zwanej Miodzius, klimat podgórski, zdrojowisko jest obecnie własnością Akademii Umiejętności, szczawy słono alkaliczne, bogate w kwas węglowy a z europejskich najzamożniejsze w dwuwęglan sodowy, ma: filialny zakład zdrojowo kąpielny na Miodziusiu, Zł. hydropatyczny własność Dra Kołaczkowskiego i Zł. inhalacyjny, należący do spadkobierców Dra Janochy, coroczny export wód około setki tysięcy flaszek, L. Zł. Dr. Ściborowski, nadto Dr. Dr. Doskowski, Gluziński, Hammerschlag, Kołaczkowski, Kruszyński, Nieszkowski, Starachowicz i Zaremba.

**Szkleno** Węgry, 1 godz. od Schemnitz, ziemne cieplice 30—56° C.

**Szliacs** Węgry (komitat Sohl), 300 mtr. n. p. m. proste ciepłe wody żelaziste 11—31° C. w kw. węglowy zamożne

**Szko** Galicyja, 35 kilom. ode Lwowa, zimne wody siarczane, wysokość n. p. m. ? ma 2 Zł. kąpielne: wojskowy i cywilny, urządzenia nędzne Najpierwsza jego monografia Dra Erazma Syxta: „O cieplicach we Szkle wydana w r. 1527.“

**Taraps-Schuls** Szwajcarya (kanton Graubünden), 1300 mtr. n. p. m. klimat alpejski, bogaty zasób źródeł mineralnych: glauberskich i szczaw żelazistych, zamożnych w kw. węglowy, dojazd utrudniony, pensjonat 6—10 frk. dziennie od osoby.

**Töplitz-Schönau** zobacz **Cieplice czeskie.**

**Trenczyn** zobacz **Cieplice trenczyńskie.**

**Truskawiec** Galicyja, wieś 8 kilom. od m. Drohobycza, St. k. ż. transversalnej. 400 mtr. n. p. m. Zł. własność Spółki obywatelskiej jest obecnie w toku rzetelnych ulepszeń balneotechnicznych, rozmaite źródła mineralne: solanka 23<sup>0</sup>/<sub>10</sub>, 3 źródła słonoglauberskie i szczawa magnowo alkaliczna, borowina o cennych własnościach, L. Zł. Dr. Plech nadto Dr. Dekański.

**Tüffer** Styryja, 215 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 35—39° C.

**Vals** Francya (depart. Ardeche), 10 zdrojów alkalicznych, do wód Vichy składem chemicznym bardzo zbliżonych, lubo zimniejszych, 13—16° C. mających, export tych wód wielki, pobyt tańszy jak w Vichy.

**Vevey** Szwajcarya nad jeziorem genewskim, 380 mtr. n. p. m. St. klim. podalpejska, dobra na wiosnę i jesień, z wyjątkiem Lipca i Sierpnia, nieodpowiednia ra zimę dla chorych piśsiowych, leczenia winogrodowe, pensjonat 7—15 frank. dziennie od osoby.

**Vichy** Francya (depart. Allier), 230 mtr. n. p. m. najznakomitsze zdrojowisko francuskie, cieplice alkaliczne, 12—41° C. wspaniałe balneotechniczne urządzenia, ogromny wyrób soli zdrojowej i pastylek, pobyt drogi, rozsyłka wód corocznie do 3 milionów flaszek.

**Vöslau pod Wiedniem**, cieplice obojętne, 24° C. wielce uczęszczane przez zamożnych mieszkańców Wiednia, przede wszystkim pleć żeńską, tudzież leczenia winogrodowe.

**Warmbrunn** Śląsk pruski, 325 mtr. n. p. m. cieplice obojętne, 35—38° C. Urządzenia balneotechniczne dobre.

**Warazdyn** zobacz **Cieplice warazdyńskie.**

**Wenecya** morskie miasto nad Adryatykiem, zaledwo bardzo mało ponad poziomem morza na wyspach i piaszczystych ławicach zbudowane. St. klim. zimowa, średnio ciepła, wilgotna, wolna od kurzu i wichrów, słoneczna. Średnia zimowa ciepłota o 1½ do 2° C. wyższa jak w Meranie lub w Montreux. Styczeń i Luty są na pobyt najodpowiedniejsze. Ujemną stronę stanowi niedobra woda do picia; jesienią są tu dobre morskie kąpiele na Lido, pensjonat 7 frk. dziennie od osoby.

**Weilbach** Prusy (prow. Hessen-Nassau), 137 mtr. n. p. m. zimne wody alkaliczno siarczane, tudzież zdroj sodo-wolitowy.

**Wiesbaden** Prusy, stolica ks. Nassauskiego, 117 mtr. n. p. m. cieplice solankowe, 50–68° C. nietylko na kąpiele ale i do picia zastosowane, 900 gabinetów łaziennych, zdrojowisko używane za stacyę klim. wiosną, jesienią nawet i przez zimę, najliczniej uczęszczane niemieckie zdrojowisko, urządzenia kąpielne i na zimę, pensjonat od osoby miesięcznie od 100 mrk. i wyżej, są tu i leczenia winogradowe.

**Wildbad** król. Wirtembergskie, 400 mtr. n. p. m. obojętne cieplice, 33–37° C. używane na kąpiele i do picia, urządzenia balneotechniczne wyborne, pensjonat 5 do 8 marek dziennie od osoby.

**Wysowa** Galicyja (obwód jasielski), od r. 1882 zakład zdrojowo kąpielny, szczawy słono alkalicz. żelaziste, urządzenia zbyt skromne. L. Zkł. Dr. Natter.

**Zakopane** Galicyja, wieś w Tatrach, 942 mtr. n. p. m. od st. k. ż. transversalnej Chabówka o 43 kilom. odległe. z inicjatywy i staraniem nieodżałowanej pamięci Dra Chałubińskiego St. leczniczo klimatyczna, klimat górski, korzystne na pobyt dla dotkniętych malaryą lub usposobionych do suchot płucnych, ale do przezimowania chorych są tu zbyt prymitywne urządzenia, 2 Zkł. hydropatyczne: Dra Chramca i Dra Piaseckiego L. Stacyi Dr. Chwistek. L. L. Buzdygan, Chramiec, Kulczyński i Piasecki. Od r. 1892 jest tu „Dom zdrowia“ (własność i lekarskie kierownictwo Dr. Chwistka) o 20 pokojach, latem i zimą otwarty, za kuracyę, stół i pomieszkanie z kompletną pościelą dziennie od Złr. 3 i wyżej.

**Zaizon** Siedmiogród, 2 mile od Kronstadtu, 548 mtr. n. p. m. zdroje alkal. muryatyczno jodowe.

**Zoppot = Sobótka** Prusy, 12 kilom. od Gdańska, kąpielisko morskie od polaków licznie uczęszczane.

**Żegiestów** Galicyja (obwód sandecki), St. k. ż. transversalnej, wysokość n. p. m. ? szczawy alkal. ziemno żelaziste, tudzież rzeczne kąpiele w Popradzie, L. Zkł. Dr. Korczyński, nadto Dr. Szczepański.





# WYBÓR

## najodpowiedniejszych zdrojowisk

### do leczenia

### poszczególnych chorób.

---

#### **Amenorrhoea**

stósownie do zasadniczej przyczyny:

1) w razie zółzów wtrz. i ztrz. wody jodobromowo słone: Baasen, Goczałkowice, Hall rakuski, Iwonicz, Kreuznach, Lippik, Rabka, Rymanów, Wildeg, Zaizon.

2) w razie niedokrewności i blednicy wtrz. szczawy alkaliezno żelaziste, tudzież wody iście żelazne: Antogast, Bardyjów, Bocklet, Driburg, Elster, Francensbad, Königswart, Krynica, Pyrmont, Spaa, Wysowa, Żegiestów. — Obok picia rzezczonych wód zalecamy odnośne ich kąpiele wodne i borowinowe.

3) w razie zatrzymanej lub bardzo skapej miesiączki, tudzież wobec nadmiernej otyłości (*Polysarcia*) albo wobec zastoin brzusznych (*Plethora abdominalis*) wtrz. i ztrz. wody glauberskie: Kissingen, Maryenbad, Tarasp-Schuls.

#### **Anaemia et Chlorosis**

w pierwszym rzędzie wtrz. i ztrz. wody iście żelazne: Bocklet, Buzias, Driburg, Freiernbach, Griesbach, Königswarth, Pyrnawarth, Pyrmont, Rippoldsau, Schwalbach, Spaa, St. Moritz.

W drugim rzędzie szczawy alkaliezno żelaziste, będące w wysoko-górskim położeniu: Krynica, Reinerz, Steben, Maryenbad (Ambrożego źródło), Rippoldsau, Żegiestów.

Do następowego leczenia po poprzednio odbytej kuracyi wodami żelazistemi: morskie kąpiele, albo pobyt w stacyach klimatycznych górskich (podalpejskich lub alpejskich).

#### **Arthritis**

obok zastósowania odnośnego dyetetycznego sposobu życia, środki balneoterapeutyczne mają zadanie: z jednej strony uprządkować zmienioną w ustroju przez dnę materię, a z drugiej strony owładnąć i usunąć wyrządzone dną miejscowe przeobrażenia: złogi w stawach, w torebkach stawowych



i w otaczającej je powieży. Do pierwszego zadania posłużą wtrz. i ztrż. wody słone i niektóre z wód glauberskich: Baden-Baden, Homburg, Kissingen, Neuheim, Neuhaus, Pyrmont (Salzquelle), Rehme (Bitterbrunnen), Soden, Wiesbaden, a z wód glauberskich Karlsbad (Sprudel), przy których metodycznem zastosowaniu jako środek dyetetyczno pomocniczy zalecamy użycie szczaw prostych lub słabo alkalicznych.

Do drugiego celu zmierzamy zastosowaniem kąpiel nietylko z wód poprzednio już wymienionych; ale nadto do rzeczonego celu nadają się też kąpiele z rodzimych ciepłe obojętnych: Neuhaus, Pfäffer-Ragatz, Schlangenbad, Teplitz-Schönau, Wildbad; ze siarczanych: Akwisgran, Burtseheid, Baden helwecki, Barèges, Cauteres, Mehadya, Piszczany, Schinznach, Trenczyn i Wielki Warządyn; nadto kąpiele słonosiarczane i parowosiarczane, tudzież kąpiele i okłady: borowinowe, mułowosiarczane i słonosiarczane.

### **Asthma cum bronchit. catarrh.**

wtrz. wody alkaliczne rodzimo ciepłe albo zimne po ich ogrzaniu: Ems, Gleichenberg, Luchaczowice, Salzbrunn, Szczawnica — wiosną galaktoterapia — jesienią leczenia winogrodowe — latem pobyt w zdrojowiskach na pomorzu albo w stacyach klimatycznych górskich — jesienią i zimą pobyt w stacyach klimatycznych południowych: Abbazia, Arco, Meran lub na Riviera di Ponente.

### **Bronchitis, Tracheitis, Laryngitis catarrh. chron.**

wtrz. szczawy alkaliczne same lub ocieplone gorącym mlekiem albo żentycą: Ems, Gleichenberg, Obersalzbrunnen, Selters; Szczawnica, Vichy; wody alkaliczno muryatyczne i alkaliczno słone: Luchaczowice, Radain, Roisdorf, Elster (Salzquelle), Francensbad (Salzquelle), Rohitsch (Tempelbrunnen), Homburg, Soden.

Wziewanie rozpylonych wód alkaliczno-muryatycznych lub alkaliczno-słonnych, albo inhalacye igliwiowe, tudzież leczenia galaktoterapeutyczne albo winogrodowe.

Pobyt latem, jesienią i zimą: zobacz asthma.

### **Catarrhus ventriculi chron.**

1) *acidus* wtrz. wody alkaliczne: Bilin, Ems, Fachingen, Gleichenberg, Krondorf, Selters, Szczawnica (ogrzewana); kąpiele letnie z wód powyższych.

2) *mucosus*: dyeta lekko podniecająca. wtrz. Elster (Salzquelle), Francensbad (Salzquelle), Karlsbad (słabsze źródła), Szczawnica (zdrój Szymona ocieplony), Vals, Vichy, Wysowa (zdrój Bronisławy lub Wandy).

### **Catarrhus intestinorum chr. (Enteritis follicularis).**

1) *cum diarrhoea*.

Leczenie wstępne wtrz. wody alkaliczno muryatyczne albo alkaliczno słone rodzimo ciepłe: Karlsbad, Baden-Baden, Ems, Vals, Vichy, Wiesbaden, tudzież ztrż. ich kąpiele; przedewszystkiem zaś kąpiele borowinowe.

Leczenie następowe wody alkaliczno ziemne (ocieplone): Krynica (zdrój główny), Lippspringe, Maryenbad (zdrój Rudolfa), Wildungen, tudzież kąpiele borowinowe lub morskie ciepłe.

2) *cum obstipatione alvi* wtrz. Kissingen, Krynica (zdrój słotwiński), Maryenbad, Żegiestów, średnie dawki wód gorzkich: Friedrichshall, Hunyady, Siedlitz lub Morszyn w przerwach używane — metodyczne zastępowanie enteroklyzy z wód gazowych — ztrz. kąpiele chłodnawe — hydroterapia.

## **Catarrhus uteri et vaginae chron., (Endometritis chron. Blenorrhoea genitalium, Fluor albus)**

stósownie do zasadniczego cierpienia i powodujących przyczyn (niedokrewność, zołzy, pozostałości po zapaleniu: omacicznym, śródmacicznym lub okołomacicznym, nienależyte wsteczne przeobrażenia macicy po porodzie lub po poronieniu, nadużycie spółkowania, samogwałt) wtrz. i ztrz. użycie wód: alkaliczno ziemno żelazistych, alkal. słonych, solanek lub wód siarkanowo żelaznych.

Zarazem najstaranniejsze utrzymanie czystości narządu chorobą dotkniętego za pomocą: natrysków do pochwy, nasiadów i ogólnych kąpiel.

## **Catarrhus chron. vesicae et pelvium urinar. (Pyelitis chron.)**

wtrz. szczawy alkaliczne w obfitej ilości wśród całego dnia: Bilin, Fachingen, Geilnan, Giesshübel, Krondorf, Neuenahr, Teinach, Vals, Vichy (zdrój Puits de mes dames). Ztrz. przy dłużej trwającej kąpiele z wód namienionych albo z ciepłe obojętnych: Badenweiler, Gastein, Johannisbad, Ragatz, Schlangenbad, Tüf-fer, Wildbad.

## **Cholelithiasis**

wtrz. przedewszystkiem Karlsbad; u osób delikatnej budowy i słabowitych: Ems (zdroje: Kränchen, Kesseli-Fürstenbrunnen) albo Vichy (zdrój Grand Grille); zaś u osób silnych, dobrze odżywionych, wobec nawykowego zaparcia stolca: Heilbrunn, Kissingen, Maryenbad (zdrój Kreuzbrunnen).

Mimo pomyślnego skutku, leczenie zdrojowe kilkakrotnie ponawiać.

Przez zimę dyetetyczne użycie szczaw alkalicznych.

## **Diabetes mellitus**

obok przynależnej dyety, wtrz. w pierwszym rzędzie Karlsbad, w drugim rzędzie Vals albo Vichy — podczas kuracyi i poza nią dyetetyczne użycie prostych szczaw lub słabo alkalicznych: Giesshübel, Krondorf — po przeprowadzonym leczeniu w Karlsbadzie, u osób bardzo podupadłych na siłach, następne leczenie w zdrojowiskach żelazistych, tudzież kąpiele borowinowe.

## **Emphysema pulmonum**

starać się o usunięcie towarzyszącego rozedmie nieżyty oskrzelowego albo pełnokrwistości i zastoinom w krwionośnych narządziach trzewiów — a zatem leczenie zdrojowe powyżej na-

mienione „zobacz *Bronchitis catarrh. chr.*“ lub poniżej podane przy opisie „*Plethora abdominalis*“.

Następnie pobyt w stacyach klimatyczn. podalpajskich lub na pomorzu. Na zimę za pobyt: Abbazia, Arco, Meran, Nizza, Palermo.

## Haemorrhoids (*Plethora abdominalis*)

u osób pełnokrwistych, dobrze żywionych, otyłych wtr. i ztr. Maryenbad, Kissingen, Rohitsch, Taraps-Schuls — o ile narząd trawienia jest silny i prawidłowo funkcjonuje nawet niektóre z wód siarczanych jak: Weilbach, Nenndorf, Szobranz, Schinznach; zaś u osób w odżywianiu podupadłych, wobec nieżyty dróg trawienia, cierpienia wątroby lub nerek, skromne użycie wód alkaliczno słono żelazistych: Francensbad, Elster, Kudowa, Rippldsau, szczaw alkalicznych: Ems, Gleichenberg, BadenBaden.

Obok tego, odnośne symptomatyczne leczenie uciążliwych przypadłości: zaparcia stolca, krwi upływów z odbytnicy lub szluzotoku z kiszek, odmy brzusznej, zgagi i t. p.

Po kuracyi zdrojowo-kapieżnej, leczenie winogradowe: w Dürkheim, Gries, Meranie lub w Wiesbaden.

Dyeta cierpieniu odpowiednia jest koniecznie potrzebną.

## Hysteriasis

obok leczenia zasadniczej choroby (zboczenia odżywiania, niedokrewność, blednica, zmiana w narządzie moczopęciowym), u osobników w okresie rozwoju i pokwitania: kąpiele morskie zrazu letnie, następnie chłodne; cieplicze kąpiele temperaturę ustrojową obniżające: Landeck, Liebenzell, Badenweiler, albo łagodne hydropatyczne leczenie.

## Ischias.

Zobacz *Neuralgiae*.

## Laryngitis catarrh. chronica

ściśle zachowanie się dyetetyczne i higieniczne co do wpływów atmosferycznych, używanie głosu niewysilające a wcale niena-dużycie tegoż; wtr. zastosowanie na ogół tychsamyh balneoterapeutycznych środków, o jakich mówiliśmy przy *Bronchitis catarrh. chron.*

Otyłym, pełnokrwistym, dobrze odżywionym, wobec zboczeń krwiobiegu w trzewiach i zastoin brzusznych wtr. wody: Maryenbadu (Kreuzbrunnen), Taraspu (Lucius — Emerita- lub Ursusquelle), Kissingen (zdrój Rakoczy) lub Homburga (Elisabethquelle i Kaiserquelle).

Osobom otrętwiałym, żółzowym, dotkniętym dną lub goścem, będącym w podeszłym wieku wtr. wody słono siarczane: Langenbrücken, Nenndorf, Wipfeld, Weilbach; tem zaś właściwiej zdrojowiska siarczane francuskie: Amelie les bains, Barèges, Bagnères de Louchon, Sauver, zawdzięczające swą skuteczność w omawianej chorobie wybornym ich klimatycznym stosunkom, tudzież znakomitym swym urządzeniom do leczenia wziewnych.



## **Metritis chronica (Parametritis. Perimetritis chron.), Oophoritis chronica.**

W świeżych wypadkach a przy zupełnej nieobecności stanu zapalnego wtrż. i ztrż. wody jodobromowe słone: Kreuznach, Krankenheil (Tölz), Hall rakuski, Iwonicz, Rabka, Sulza, Zai-zon; rzadziej: Kissingen, Homburg, Wiesbaden.

Przytem w miarę nawykowego zaparcia stolca od czasu do czasu mierne dawki wód gorzkich: Friedrichshall, Morszyn, Pülna.

U delikatnych i niedokrewnych niewiast, wobec niedawnego i nierozległego cierpienia wtrż. i ztrż. wody alkaliczno mury-atyczne: Ems, Neuenahr, Vichy.

Wobec stanu niedokrewności jako następowe leczenie szcza-wy alkaliczno żelaziste: Elster, Francensbad, Krynica, Żegie-stów, a nawet istic żelazne wody: Bocklet, Driburg, Pymont, Schwalbach, Spaa.

Tuż obok picia, okłady i kąpiele: żelazisto borowinowe, solankowe, jodobromowo słone lub z wód silnych alkalicznych.

W niemożności zastosowania kuracyi zdrojowo-kąpielnej, zalecamy używanie w domu odpowiednio wskazanej wody mi-neralnej do picia, a ztrż. na kąpiele: przetwory borowinowe (sól i ług) wyrobu Mattoniego.

## **Morbus Basedowii.**

Zabiegi hydropatyczne w zakładzie, będącym w wysokogórzy-stej okolicy, racjonalnie prowadzone; obok tego wewnętrzne użycie wód żelazistych, bardzo posilna dyeta; następnie ką-piele morskie.

## **Morbus Brighti chron.**

obok właściwego sposobu żywienia chorego, dyetetyczne użycie szczaw prostych lub słabo alkalicznych a wtrż. wody gazo-wożelaziste: Antogast, Bocklet, Brückenau tudzież szczawy ziemno alkaliczne: Driburg, Kudowa, Krynica, Żegiestów; zaś leczenia kąpielne z wielką ostrożnością zastosowane z cieplic obojętnych (od temperatury 37° do 42° C.) nawet w grocie Mon-summano.

W białkomoczu u nadmiernie otyłych, Karlsbad lub Mary-enbad (ogłędnie).

Na zimę pobyt w ciepłym, suchym klimacie: Cannes, Pau, Pisa, St. Remo.

## **Myelitis chronica et Tabes dorsualis.**

Proste przekrwienie rdzenia pacierzowego, nierzadko spowodo-wane przekrwieniem brzuszem i zastoinami w trzewiach, usprawiedliwi zastosowanie hydropatyi, a zabiegów na ogół odprowadzających: chłodnej półkąpieli, zlewu na grzbiet, okładu lodowego woreczkiem Chapmana; ze środków zaś balneoter-aapeutycznych użycie: wód alkaliczno słonych, glauberskich, lub ogłędne zastosowanie wód gorzkich.

W przewlekłym zapaleniu rdzenia pacierzowego, połączo-nem z wypocinami, wskazane są kąpiele wessanie lekko pobu-

dzające: żelazisto słone borowinowe: Elsteru, Francensbadu lub Maryenbadu; cieplice słone: Oyhausen, Neuheim, Baden-Baden, Bourbonne les bains, Wiesbaden albo obojętne: Gastein, Pfäfers-Ragaz, Römerbad, Teplitz-Schönau.

Osobniczość i pobudliwość chorego ma rozstrzygać przy wyborze zdrojowiska (kapielowego); same zaś kąpiele winny być zastosowane z wielką ostrożnością, a pod ścisłą kontrolą lekarza co do ich: ciepłoty, czasu trwania, przedewszystkiem co do wpływu na chorego.

Nie pomijać środków leczenia zdrojowe wspierających: elektryzacya, mięsienie.

Po kuracji pobyt zimą w klimatycznym uzdrowisku ciepłym, suchym i słonecznym, byłby w tym razie pożądanym, jeżeli chory może odbyć podróż bez wszelkich niewygód i umęczenia.

## Neuralgiae

Nerwobóle wymagają rozmaitego leczenia balneoterapeutycznego, odnośnie do podstawowego cierpienia.

W nerwicach opartych na gościu lub dnie zalecamy wtr. wody alkaliczno muryatyczne: Ems, Vichy, Karlsbad; jeżeli zaś przekrwienie brzuszne powoduje nerwobóle to: Maryenbad, Kissingen lub Homberg — u osób żołądkowych nerwicą dotkniętych wody jodobromowosłone: Kreuznach, Iwonicz, Rabka, Soden lub Truskawiec. W nerwicach spowodowanych kiłą lub rtęcią wskazane są: Akwizgran, Burtscheid, Busko, Solec lub Szohranz; zaś w nerwobólach powikłanych z niedokrewnością, tylokrotnie już przytaczane wody żelaziste.

Co do kąpiel zalecamy: w nerwobólach samoistnych cieplice obojętne; zaś w nerwobólach gośćcowych i dnawych cieplice kąpiele siarczane lub słone.

## Migrena

samoistna, opierająca się innym zabiegom leczniczym, bywa czasem usunięta kąpielami morskimi.

## W nerwicy kulszowej

(*Ischias*) okazały się skutecznymi cieplice kąpiele: Teplitz-Schönau, Wildbad, Plombiers, Piszczany, Mehadya.

## Obstipatio alvi constitutionalis

zobacz *Catarrhus intestinorum chron. c. obstipatione*.

## Oophoritis chronica

zobacz *Metritis chronica*.

## Ozaena chronica

stósownie do przyrody: ozaena *scrophulosa* wtr. i ztr. wody jodobromowo słone, tylokrotnie już przytaczane; zaś ozaena *syphilitica* wymaga kuracyi podstawowej tego cierpienia. W obu rodzajach tej choroby, nie obejdzie się bez miejscowego leczenia. Dla gruntowego polepszenia, kuracyę balneoterapeutyczną kilkakrotnie powtarzać należy.

## Paralyses centrales (cerebrospinales) et periphericae.

Stósownie do natury i podstawy porażen ze zasobu Balneoterapii, głównemi środkami leczniczem są kąpiele ciepłe: obojętnych, gazowo słonych, siarczanych, tudzież żelazisto borowinowe. Wszelkiego rodzaju kąpiele podrażnieniem (termicznym, chemicznem i mechanicznem) nerwów obwodowych i pobudzeniem wessania ewentualnej wypociny w chorobą dotkniętych nerwach, a nadto wzmożeniem i poprawą przeróbki materji w ustroju, rokują swe skutki.

Rzeczzone ogólne kąpiele, zalecamy z razu chłodniejsze i krótko trwające, z przerwami co drugi lub co trzeci dzień; następnie zaś w ciągu leczenia co raz cieplejsze (niekiedy od 40° do 43° C.) i dłużej trwające (od 1/4 do 3/4 godziny), uzupełniając leczenie kąpielą natryskową z wód zastosowanych, nie pomijając użycia elektryzacyi i mięsienia.

W porażeniach przyrody hysterycznej radzą natryski szwedzkie (na przemian gorące i zimne).

## Rhachitis.

Najskuteczniejszymi okazały się w tej chorobie wtrż. wody zawierające: węglany alkaliczno ziemne, żelazo i kwas węglowy wolny, tudzież wody gazowo słone, podawane z mlekiem lub żentycą, a u dzieci nader kakotroficznym z mocnym rosołem przedewszystkiem zdroje: Bardyowa, Krynicy, Borszoku, Elöpataku, Flinsbergu, Reinerzu, Rodny, Karlsbrunn, Pyrawarthu i Recoaro. Na pierwszeństwo zasługują zdrojowiska, położone w wysokich górach i lasem otoczone. Kąpiele gazowo słone lub słono żelaziste; u dzieci zaś bardzo wątłych i osłabionych żelazisto borowinowe są nieodzowne.

Należy zwrócić uwagę rodzeństwa odnośnych pacyentów, iż w krzywicy żadną miarą nie można oczekiwać polepszenia, a tem mniej uleczenia po jednorazowej kuracyi zdrojowej.

Coroczny pobyt tego rodzaju chorych (aż do czasu ich rozwoju) w górskich klimatycznych uzdrowiskach jest wielce pożądanym; gdzieby zaś było możliwe, przezimowanie na Rivierze.

## Rheumatismus chron. musculorum vel articulationum.

Zdawien dawna zgodzili się praktyczni lekarze na uznanie termicznej podniety za najskuteczniejszy środek we wszelkich postaciach przewłocznego gościa, za lek usuwający bóle, uspakajający, rozszerzający miejscowo naczynia krwionośne, wzmagający prześiąkanie i krwiobieg w tkaninie chorobą dotkniętej, pobudzający przemianę materji; wszystkie zaś te sprawy zdolne są wywołać pożądane zmiany w częściach gościem zajętych. Przedewszystkiem zalecają się w omawianem cierpieniu cieplice: chemicznie obojętne: Teplitz-Schönau, Pfäffer-Ragaz, Gastein, Krapina-Töplitz, Warmbrunn; solankowe lub słone: Baden-Baden, Balaruc, Bourbon les bains, Nauheim, Soden, Wiesbaden i siarczane: Akwizgran, Baden helwecki, Burtscheid, Harkany, Mehadya, Ofen, Piszczany, Trenczyn i Waraźdyn; tak jako kąpiele wodne jak i mułowe, nadto kąpiele: borowinowe, igliwiowe



i piaskowe (w Blasewitz pod Dreznem zakład przyrodoleczniczy pod kierunkiem Dra Kaphenget'a).

Przy wyborze zdrojowiska uwzględnić należy jego położenie i klimat; ochronność od burz, deszczów i wichrów; a brak nagłych i wielkich skoków i wahań ciepłoty atmosferycznej.

W wyborze i zalecaniu poszczególnych rodzajów kąpeli, na baczna uwagę lekarza zasługują: powikłania gościa z innymi chorobami, przewaga niektórych przypadłości i konstytucya chorego.

Obok ogólnej kąpeli używają się też w gościach ciepłe natryski na części chorobą zajęte, którychto natrysków uprawdliowanie: stopnia ciepłoty, trwanie czasu i mechanicznej siły natrysku lekarz zdrojowy ściśle choremu ma oznaczyć.

Wogóle racjonalne i metodyczne postępowanie w leczeniu kąpielnem gościa, tudzież kontrola lekarza nad poszczególnymi objawami i nad skutkiem z każdego rodzaju lub odmiany kąpiel, jest wielkiej wagi i doniosłości. Nie wystarczy tu dawny szablon objęty wyrażeniem: „kąpać się 20—30 razy, 15 lub 30 minut, po kąpeli godzinę w łóżku poleżeć“, a co do reszty kierować się choremu dowolnością lub własnem natchnieniem. W ten sposób uskuteczniiana kuracya, wcale nie usunie ciężkiego goścowego cierpienia.

W leczeniu przewlekłych gości, hydroterapia (w ścisłem tego wyrazu znaczeniu), dopiero wtedy wchodzi w swe prawa, jeżeli już gościec uleczonym został. Zadaniem jej jest zahartowanie powłok powszechnych dla zapobieżenia powrotom choroby. Toż samo odnosi się na ogół do morskich kąpeli.

Pomieszkanie chorego w zaleconem mu zdrojowisku winno być: zupełnie suche, ciepłe, o ile można południowe i słoneczne a należyście przewietrzalne.

## Scrophulosis.

Pomyślny skutek balneoterapeutycznego leczenia żołądów wtr. i ztr. użyciem wód mineralnych zwiększy się: korzystnym klimatem odnośnego zdrojowiska tudzież dyetetyką i higieną; wszystko zaś to razem i współcześnie zastosowaniem być winno, jeżeli mamy zadziałać na poprawę wyrobu krwi, na wzmoczenie czynności ustroju i na usunięcie zbroczeń odżywiania.

W żołądach cechy pobudliwej zalecamy wtr. i ztr. wody słone: Baden-Baden, Canstatt, Ciechocinek, Goczałkowice, Hall rakuski, Jastrzęb (Königsdorf) lub Heilbrunn.

Wobec wielkiej tkliwości narządu trawienia u osobników żołądowych a nader pobudliwych, którzy zrazu nie znoszą wód słonych, kuracya ich zaczyna się pobytem w zdrojowiskach cieplic obojętnych, położonych w wysokich górach: Pfäffer-Ratz, Neuhaus lub Schlangenbad; następnie zaś leczenie uskutecznia się wspomnianemi wyż słońmi wodami.

W żołądach cechy otretwiałej polecamy: Kreuznach, Krankenheil-Tölz, Iwonicz, Rabkę, Rymanów, Salzhausen, Truskawiec lub Zaizon; ku uzupełnieniu zaś kuracyi, odbywanej w namienionych zdrojowiskach, kilku tygodniowe następowe

leczenie w wód alkaliczno ziemno żelazistych: Borszek, Bardyów, Krynica, Pyrawarth lub Żegiestów.

Wobec ogromnej częstotliwości zoiłów między działwą mniej zamożnej naszej ludności, byłoby arcypożądane zaprowadzanie w naszych zdrojowiskach lecznic dla ubogich dzieci zoiłowych, jakie oddawna posiadają już: Anglia, Francya, Niemcy i Włochy; u nas zaś najpierwszy i jedyny dotychczas tego rodzaju jest zakład w Rabce, t. z. filialny szpitalik dla dzieci św. Ludwika.

## **Stases abdominales.**

Powszechnie znana grupa zjawisk: przekrwienia brzuszno i nieżytyw wielu narzędzi trawienia, trudnościawności, nawykowego zaparcia stoica, krwawnie i t. p. zboceń, których powód po części w niewłaściwym sposobie życia, a po części w dzieciznem usposobieniu. Tego rodzaju chorzy dostarczają bardzo licznego zastępu osób do leczenia zdrojowego. Należy między niemi odróżnić: otyłych, pełnokrwistych i dobrze odżywionych od pacyentów wychudłych, ogólnie na zdrowiu podupadłych i osłabionych.

Dla pierwszego działu chorych zalecamy: Maryenbad, Kissingen, Rohitsch lub Tarasp-Schuls, tudzież niektóre z wód słonych; dla drugiego zaś działu pacyentów wskazane są: Francensbad, Elster, Rippoldsau, Krynica-Słotwiny i Żegiestów, a w lżejszych postaciach namienionego cierpienia: Soden, Homburg, Gleichenberg, Baden-Baden lub Nenndorf.

Leczenie następowe winogrodowe: w Gries, Meranie lub Wiesbaden bywa bardzo pożyteczne.

## **Tuberculosis bacillosa pulmonum.**

Balneoterapia wraz z jej pomocniczemi: Aëro—Klimato- i Galaktoterapia, tudzież Balneodyetetyką i Hygieną w wielorakim kierunku bardzo korzystnie podziała w gruźlicy. Wody mineralne: Ems, Gleichenberg, Charlottenbrunn, Reinerz, Salzbrunn, Szczawnica lub Soden zwalniają towarzyszący gruźlicy nieżyty eddetchów, polepszają upośledzone trawienie, podnoszą odżywianie, wraz z niem ogólne siły żywotne i dopomagają wesaniu nacieków gruźliczych.

Klimatoterapia tak w zapobieżeniu jakoteż w leczeniu gruźlicy jest niemal pierwszorzędnym środkiem. Najodpowiedniejszym klimatem dla tego rodzaju chorych, są miejscowości w górach, powyżej 1000 m. n. p. m. wzniesione, dostarczające najczystszo powietrza, wolnego od drobnoustrojów i kurzu, zalecające się zwiększeniem ozonu, wyższą aniżeli gdziekolwiek aseptycznością górskiego powietrza i większą tamtejszą insolacją, byle chory miał tu umożliwione jak najdłuższe przez dzień przebywanie na wolnem powietrzu, a zabezpieczony był od przeszkód z tem nieodłącznych ze strony samego powietrza i od innych okoliczności, niedozwalających choremu długiego pobytu na wolnem powietrzu; to się zaś usuwa odpowiedniem urządzeniem zakładów, przeznaczonych dla gruźlicą dotkniętych, jakie posiadamy: w Davos, Görbersdorf i Falkenstein, a jakie

moglibyśmy mieć w Zakopanem, jeżeliby ono pozyskało odpowiednie ku temu urządzenie higieniczno-lecznicze; albowiem dotychczasowe doświadczenia tej miary lekarzy jak ś. p. Chałubiński i Baranowski stanowczo za tem przemawiają.

## Urolithiasis.

Zanim się przedsięwzięcie balneoterapeutyczne leczenie kamicy moczowej, przede wszystkim należy najdokładniej zbadać skład chemiczny moczu, ocenić jego jakość, a jeżeli można to i samej skrzepliny czyli konkrementu; albowiem zaniechanie tej sprawy lub błędne jej uskutecznienie poprowadziłoby do arcy niepożądanych wyników leczenia.

Skamieliny moczowe pod względem chemicznym dzielimy na zawierające ogółem i przeważnie sole ziemne (fosforany ziemno alkaliczne — *Phosphaturia*) i na skamieliny kwasowe, pochodzące z powiększonej ilości kwasu moczowego i moczanów; lubo znachodzą się i konkrementa szczawianowe (*Oxaluria*).

Zadaniem Balneoterapii jest tu przede wszystkim leczyć nposobienie kamiączkowe (*Diatheasis urolithiaca*); byłoby bowiem złudzeniem a płonnym zabiegiem, żądać i oczekiwać od wód mineralnych rozpuszczenia albo wydalenia z ustroju większych konkrementów moczowych, aniżeli na to zezwala średnica przewodu odnośnych narządzi.

Zapobieżenie i poskrómiienie wytwarzania się kamiączki moczowej, a nawet przeszkodzenie wzrostowi już obecnych skrzeplin moczowych, otrzymujemy zastosowaniem w konkrementach przyrody kwasowej wód alkaliczno muryatycznych: Vichy, Vals, Karlsbad, Ems, Assmanhausen, Neuenahr, Szczawica (źródł Józefiny).

W skamielinach złożonych z węglanu wapniowego zalecamy obficie picie wód zamożnych w kwas węglowy, a ubogich w sole zasadowe: Bilin, Krondorf, Heppingen, Landskrone, Sinnbergen; nawet prostą wodę sodową, byle przyrządzoną na wodzie przekroplonej, lub przysposabianą ze źródła Ciepłej czeskiej (Teplitz-Schönau) od roku w handel wprowadzoną.

W skrzeplinach szczawianowych, odpowiednie są proste szczawy, tudzież słabo alkaliczne szczawy: Ahrweiler, Bilin, Fachingen, Giesshübel, Teinach.

W najnowszym czasie na zasadzie, iż węglan litynowy posiada większą siłę rozpuszczalną kwasu moczowego, aniżeli ja mają alkalia, zalecano w kamiączy wody zawierające lit: Salzschlirf, Dürkheim, Weilbach, Wildungen. Jednak zbyt mała ilość węglanu litynowego w rzeczonych wodach znachodząca się (w 1000 częściach wody od 0.0124 do 0.0450), upoważniła do zastąpienia ich sztuczną wodą litową, mogącą zawierać pożądaną a dokładnie oznaczoną ilość litu.

Ciepłe ogólne lub nasiadowe kąpiele poskutkują w usunięciu dolegliwości, towarzyszących kamiączce moczowej.

Dr Michał Zieleniewski.



## Kąpiele z dodatkiem środków lekarskich.

Na kąpiel pełną (po szyję) dla osoby dorosłej, liczy się 200—300 litrów płynu. 50—200 litrów na kąpiel dla dzieci. Na kąpiel sięgająca tylko do dołka podsercowego 100—150 litrów; kąpiel nasiadowa 20—30 litrów, na kąpiel na nogi 10 litrów.

Za zimną uważa się kąpiel do	+ 15° R.
„ chłodną „ „	+ 15 do 22° R.
„ letnią „ „	+ 22 „ 27° R.
„ ciepłą „ „	+ 27 „ 32° R.
„ gorącą „ „	+ 32° R.

**Kąpiele gorczyczne.** Na kąpiel pełną daje się 100—250·0 grubo pociętej gorczycy. Do kąpeli miejscowej np. na nogi 50—120·00.

**K. igliwiowe.** Ponieważ przez wygotowanie igliwia niemożna otrzymać eterycznych, a właśnie głównie działających pierwiastków, stosowniej przeto dawać ekstraktu. (Extr. turionum pini sylv. ad balnea, Nitribitta w Krynicy) 150—500 gram.

**K. jodowe.** (Wanna drewniana). Kali jodati 50—100·0 na kąpiel pełną; 5·0—10·0 na litr wody. — Jodi 10·0 kali jodati 20·0 rozpuścić w kilogr. wody i dodać do kąpeli, przyczem należy tak osłonić wannę, aby pacjent nie wdychał parującego jodu.

**L. klejowe.** 1—2 funtów Colla animalis, rozpuszczonego we wrzacej wodzie.

**K. z kory dębowej lub z kory wierzby, kasztana itp.** odwar z 1 funta w 2 litrach wody, lub też (ponieważ tutaj chodzi o środek ściągający), można użyć Taniny (acid. tannicum) 20—100 grm. rozpuszczonej w szklance wody.

**K. z liści orzecha włoskiego.** (Fol. Juglandis) Dekokt z 1—2 funt.

**K. ługowe.** Dwa do ośmiu funtów popiołu bukowego lub dębowego, gotuje się z kilkoma litrami wody, lub też potażu ( $\frac{1}{4}$ —1 funta, na kąpiel pełną, dla dzieci połowę tej ilości).

**K. mrówczane.** Napar (Infusum) z 300·0—700·0 formica rufa.

**K. mydlane.**  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  funta pokrajanego mydła na pełną kąpiel (Sapo domesticus, Sapo aromatic. lub Sapo kalinus).

**K. z otrąb.** 1—3 funtów otrąb pszenicznych odgotowanych w woreczku w 2—6 litrach wody.

**K. siarczane.** 50·0—200·0 Kalium sulphuratum ad balneum, w celu wzmocnienia działania dodaje się 15—20·0 Acidum sulphur. crud.; aby jednak złagodzić, dodać można Colla animalis  $\frac{1}{2}$  funta.

Bogatszym można zapisać:

*Rp. Calcii sulphurati crudi 20·00,*

*Natri chlorati 7·50,*

*Extr. Saponar. 5·00,*

*F. c. Aq. font. q. s. Globulus. Dtur. tal. dos. 5.*

S. Jedną kulę do kąpeli.

(Wanna drewniana, nie metalowa).

**K. słodowe.** Słodu jęczmiennego 4—6 funtów gotuje się z kilkoma litrami wody przez  $\frac{1}{2}$  godziny, odciedza i wlewa do kąpieli.

**K. słone.** 3—5—15 funtów soli kuchennej lub morskiej.

**K. sodowe.** Natri carbon. crudi 200—500·0 na kąpiel pełną. 100—200·0 na kąpiel miejscową.

**K. sublimatowe** (Tylko w wannie drewnianej) 2·50—10·0 Hydrarg. bichlor. corros. rozpuszczonego w 50—200·0 Aq. Na kąpiel miejscową tj. ręce i nogi 0·05—0·25.

**K. ziołowo-aromatyczne.** Napar rumianku lub mięty, korzenia tataraku, lub spec. aromatic. z 200—500·0 na 2000·0 wody, wlewa się do kąpieli, albo też dodać można: Aq. coloniens., Spir. Calami., Spir. Angelicae, Spir. Serpyll. (60·0—100·0 na dawkę). Dla dzieci połowę tych ilości.

**K. żelaziste.** Ferrum sulphur. siccum (50·0—200·0), Liquor ferri sesquichlorati (15·0—60·0), Tart ferratus s. globuli martiales pulv. (50—200·0), lub też do przyrządzenia kąpieli żelazistej z kwasem węglowym; 1 część Ferr. sulph. sicc. (30·0), 2 części Natr. chloratum (60·0), i 3 części (90·0) Natr. bicarbon. nasypuje się warstwami do szklanki i razem wrzucić do wody (pro balneo 150·0—200·0 tej mieszaniny).

*Rp. Ferri sulphur. sicci*

*Argillae aa. 100·00,*

*Mf. pulv. d. tal. dos. 10.*

S. Jeden proszek do kąpieli.

Dla dzieci wszystkich przetworów po  $\frac{1}{4}$  części.

## Szkodliwe połączenia leków.

1. Dając kwas solny wewnątrz, nie należy przepisywać kalomelu, bo w żołądku utworzy się sublimat.

2. Nie należy kłaść plastru merkurialnego na miejscu posmarowanym jodem, bo wytwarza się Hydr. bijodat. rubrum, wywołujące ból i zapalenie.

3. Nie dawać do wewnątrz jodu ani bromu gdy się oko posypuje kalomelem (najwcześniej można zasypać oko kalomelem w 24 godzin po ostatniej dawce jodu).

4. Nie łączyć kali chloricum z garbnikiem, kamforą, siarką, węglem w proszkach, bo nieostrożne potarcie wywołuje eksplozję.

5. Nie łączyć kwasów z zasadami, bo tworzą się sole.

6. Nie łączyć opium z garbnikiem, bo tworzą się garbnikany nierozpuszczalne.

7. Nie łączyć Arg. nitr. z Aq. amygd. amar., bo wytworzy się sinek srebra.

Najwyższe dawki środków leczniczych,  
których lekarz przekraczać nie powinien,  
nie oznaczywszy wykrzyknikiem (!)

	pro dosi	pro die
Acidum arsenicosum . . . . .	0·005	0·02
„ carbolicum . . . . .	0·10	0·50
Apomorphinum hydrochloricum . . . . .	0·01	0·05
Aqua Amygdalarum amararum concentrata . . . . .	1·50	5·00
„ Laurocerasi . . . . .	1·50	5·00
Argentum nitricum . . . . .	0·03	0·20
Atropinum sulphuricum . . . . .	0·001	0·003
Cantharides . . . . .	0·05	0·20
Chloralum hydratum . . . . .	3·00	6·00
Cocainum hydrochloricum . . . . .	0·10	0·30
Coffeinum . . . . .	0·20	0·60
Cuprum sulfuricum quae emeticum . . . . .	0·40	—
Extractum Aconiti radiceis . . . . .	0·03	0·12
„ Belladonnae foliorum . . . . .	0·05	0·20
„ Cannabis Indicae . . . . .	0·10	0·30
„ Colocyntidis . . . . .	0·05	0·20
„ Conii herbae . . . . .	0·20	0·60
„ Hyoseiami foliorum . . . . .	0·10	0·50
„ Opii . . . . .	0·10	0·40
„ Scillae . . . . .	0·20	1·00
„ Secalis cornuti . . . . .	0·50	1·50
„ Strychni . . . . .	0·05	0·15
Folia Belladonnae . . . . .	0·20	0·60
„ Digitalis . . . . .	0·20	0·60
„ Hyoseyami . . . . .	0·30	1·00
„ Stramonii . . . . .	0·30	1·00
Fructus Colocyntidis . . . . .	0·30	1·00
Herba Conii . . . . .	0·30	2·00
Hydrargyrum bichloratum corrosivum . . . . .	0·03	0·10
„ bijodatum rubrum . . . . .	0·03	0·10
„ jodatum flavum . . . . .	0·05	0·20
„ oxydatum flavum . . . . .	0·03	0·10
Jodoformium . . . . .	0·20	1·00
Jodum . . . . .	0·03	0·10
Kreosotum . . . . .	0·10	0·50
Lactucarium . . . . .	0·30	1·00
Morphinum hydrochloricum . . . . .	0·03	0·12
Oleum Crotonis . . . . .	0·05	0·10



	pro dosi	pro die
Opium . . . . .	0·15	0·50
Physostigminum salicylicum . . . . .	0·001	0·003
Pilocarpinum hydrochloricum . . . . .	0·03	0·06
Plumbum aceticum . . . . .	0·10	0·50
Radix Aconiti . . . . .	0·10	0·50
„ Belladonnae . . . . .	0·07	0·30
Santoninum . . . . .	0·10	0·30
Secale cornutum . . . . .	1·00	5·00
Semen Strychni . . . . .	0·12	0·50
Solutio arsenicalis Fovleri . . . . .	0·5	2·00
Stibium Kalio-tartaricum . . . . .	0·2	0·50
Strychninum nitricum . . . . .	0·007	0·02
Tinctura Aconiti radiceis . . . . .	0·50	1·50
„ Belladonnae foliorum . . . . .	1·00	4·00
„ Cantharidum . . . . .	0·50	1·00
„ Colchici seminis . . . . .	1·50	5·00
„ Digitalis . . . . .	1·50	5·00
„ Jodi . . . . .	0·30	1·00
„ Lobeliae . . . . .	1·00	5·00
„ Opii crocata } . . . . .	1·50	5·00
„ „ simplex }		
„ Strophanthi . . . . .	1·00	3·00
„ Strychni . . . . .	1·00	3·00
Veratrinum . . . . .	0·005	0·02
Vinum Colchici seminis . . . . .	1·50	5·00
Zincum sulfuricum qua emeticum . . . . .	0·80	—

### Waga różnych dawek.

Łyżeczka cieczy waży mniej więcej 3—5 grm. Łyżeczka cukru, soli, siarki 2·5—5 gram., proszków różnych 2·50. Łyżka wody 15 grm. Łyżka syropu 20·0. Garść nasion 70—80 grm. Garść liści 20—30 gr. Szczypta kwiatu 2 grm. Litry wody dest. 1000·0; litr spirytusu 850; litr chloroformu 1480; litr oliwy 920·0; szklanka 200—250·0; kieliszek 70—80 grm.

### Porównanie wag aptekarskich.

28·5 unc. = kilogr.	1 gran = 0·07
1 unc. = 35 grm.	2 „ = 0·15
6 „ = 210 „	3 „ = 0·22
1 drachma = 4·3 grm.	1/2 „ = 0·04
1/2 „ = 2·15 „	1/4 „ = 0·02
1 skrupuł = 1·5	1/8 „ = 0·008

## Dawki przeciętne dla dzieci (pro dosi).

L e k i	Do 1 roku	od 1—5 lat	od 5—10 lat
Acetanilidum . . . . .	0·02	0·05	0·1
Acetum Digitalis . . . . .	—	5 gtt.	10 gtt.
Acetum Scillae . . . . .	—	5 gtt.	15 gtt.
Acidum benzoicum . . . . .	—	0·03	0·05
Acidum hydrobromicum . . . . .	—	—	30 gtt.
Acidum tannicum . . . . .	—	0·005	0·01
Aether . . . . .	—	3 gtt.	5 gtt.
Aether aceticus . . . . .	2 gtt.	5 gtt.	10 gtt.
Alumen . . . . .	0·01	0·05	0·1
Ammonium bromatum . . . . .	0·15	0·25	0·3
Ammonium chloratum ferratum . . . . .	—	0·03	0·05
Antipyrinum . . . . .	0·2	0·3	0·5
Apomorphinum hydrochlor. emet.	0·0007	0·0025	0·0045
expect.	0·0004	0·0015	0·0025
Aqua Amygdalarum amamarum . . . . .	—	1—5 gtt.	5—10 gtt.
Argentum nitricum . . . . .	0·001	0·003	0·005
Atropinum sulphuricum . . . . .	—	0·0001	0·0002
Bismutum subnitricum . . . . .	0·05	0·1	0·3
Bromoformium . . . . .	2·3 gtt.	3·4 gtt.	4·6 gtt.
Camphora trita . . . . .	0·0075	0·01	0·02
Chininum ferro-citricum . . . . .	—	0·05	0·1
Chininum hydrochlor. antipir. . . . .	0·1	0·3	0·5
antispasm.	0·05	0·15	0·2
Chloralum hydratum . . . . .	0·1	0·25	0·45
Codeinum phosphoricum . . . . .	0·0002	0·002	0·005
Coffeinum . . . . .	—	0·02	0·04
Coniinum hydrobromicum . . . . .	0·0005	—	—
Cuprum sulphuricum . . . . .	—	0·1	0·15
Curare . . . . .	0·0001	—	—
Extractum Belladonnae . . . . .	—	0·001	0·003
Extractum Filicis . . . . .	1·0	2·0	5·0
Extractum Opii . . . . .	—	0·005	0·02
Extractum Secalis cornuti . . . . .	—	0·03	0·05
Extractum Strychni . . . . .	—	0·002	0·005
Ferrum reductum . . . . .	—	0·005	0·01
Flores Koso . . . . .	—	2·0	5·0
Folia Digitalis . . . . .	—	0·02	0·03
Hydrargyrum bichloratum . . . . .	0·0001	0·0002	0·0003
Hydrargyr. chloratum antisyf. . . . .	0·002	0·005	0·01
laxans . . . . .	0·01	0·02	0·03

L e k i	Do 1 roku	od 1—5 lat	do 5—10 lat
Hydrargyrum tannicum oxydulat.	0·005	0·02	0·03
Hydrochinon . . . . .	0·05	0·2	0·3
Kalium bromatum . . . . .	0·1	0·3	0·5
Kalium chloricum } pro die . .	1·0	2·0	3·0
Kalium jodatum }	0·1	0·5	1·0
Kreosotum . . . . .	0·005	0·01	0·02
Liquor Ferri sesquichlorati pro die	0·3	0·5	0·5
Liquor Kalii arsenicosi . . . . .	—	0·05	0·1
Morphinum hydrochloricum . . . . .	—	0·001	0·003
Naphtalinum . . . . .	0·05	0·2	0·2
Natrium paracresotinicum . . . . .	—	0·25	0·5
Natrium salicylicum pro die . . . . .	1·0	2·0	3·0
Phenacetinum antipyr. . . . .	—	0·1	0·3
Phenacetinum antispasm. . . . .	0·001	0·05	0·1
Pilocarpinum hydrochloricum (inj.)	0·001	0·002	0·004
Plumbum aceticum . . . . .	0·003	0·005	0·01
Phosphorus . . . . .	—	0·0001	0·0002
Podophyllum . . . . .	—	0·005	0·015
Pulvis Ipecacuanhae opiatu . . . . .	—	0·005	0·02
Radix Ipecacuanhae emetic. . . . .	0·05	0·1	0·2
Resorcinum . . . . .	0·2	0·4	0·5
Santoninum . . . . .	—	0·01	0·02
Sirupus Ferri jodati . . . . .	1 gtt.	5 gtt.	10 gtt.
Strychninum nitricum (inj.) . . . . .	—	0·0005	0·001
Tartarus stibiatus . . . . .	—	0·0075	0·01
Thallinum sulphuricum . . . . .	0·01	0·02	0·03
Tinctura Opii simplex . . . . .	0·025	0·05	0·2
Tinctura Strophanthi . . . . .	—	—	3 gtt.
Urethanum . . . . .	0·05	0·1	0·2

### Porównanie dawki leków

według rozmaitego wieku chorych.

Dawki zmieniają się mniej więcej, jak następuje:

aż do ukończonego	1	roku	$\frac{1}{10}$
od 2 do 4	"	"	$\frac{1}{8}$
" 5 " 7	"	"	$\frac{1}{5}$
" 8 " 10	"	"	$\frac{1}{4}$
" 11 " 14	"	"	$\frac{1}{2}$

Począwszy od roku 50 należy dawki znowu zmniejszać tak, iż u starców między rokiem 60 a 70 należy znów dawać tylko  $\frac{1}{3}$  dawki dla osób dorosłych.

Kobietom zadają się wogóle mniejsze dawki, mniej więcej  $\frac{2}{3}$  tej, jaką się przepisuje mężczyznom odpowiedniego wieku.



## Ile kropli leków płynnych liczy się na gram.

Acet. concentrat . . . .	16	carvi, chamomil. aeth.,	
Acid. acetic. . . . .	16	citri, crotonis, foeni-	
" hydrochlor. . . . .	13	culi, juniperi, lavan-	
" " dilut. . . . .	16	dulae, menthae, ori-	
" hydrocyanic. Aqu. . .	16	gani, rosmarini, rosae,	
" " spirit. . . . .	32	sabinae, tanaceti, tere-	
" nitricum . . . . .	12	binthinae, eucalypti .	25
" phosphor. . . . .	16	Ol. caryophyl., cinnam.	20
" sulphur. con. . . . .	12	" pinguae . . . . .	20
" " dilut. . . . .	16	Petrol. rectificat . . .	25
Aether acetic. . . . .	25	Plumb. acetic. solut. .	20
" sulphur. . . . .	50	" basic. solut. . . .	16
Aq. amygd. amar. . . .	24	Solutio arsen. Fowleri.	16
" destilat. var. . . . .	16	" extr. narcot. (1:2)	37
" spirit. var. . . . .	25	Spir. aethereus . . . .	25
Bals. copaivae . . . . .	25	" alcoholis 90 $\frac{1}{2}$ % . .	40
" peruv. nigr. . . . .	16	" ferr. chlor. aeth. . .	25
Carbon sulphur. . . . .	25	" muriat. aeth. . . .	30
Chloroformium . . . . .	25	" nitric. aeth. . . . .	30
Ferrum sesq. sol. . . . .	12	" varii c. spir. vini	
Kali carbon. sol. . . . .	16	dil. parat. . . . .	25
Kreosotum . . . . .	25	" Vini concentr. . . .	30
Liq. acidi Halleri. . . .	25	" " dilut. . . . .	25
" hydrar. nitric. . . .	12	Stibium chlor. solut. .	12
Mucilagó gummi ar. . .	12	Syrupi var. . . . .	12
Oleum amygd. aether. .	20	Tinct. spirituos. . . .	25
" anis, auranti flor.		Vinum stibiat. et alia	
bergamottae, cajeputi		vina medicam . . . .	20

## Leczenie zapomocą wziewań.

Wdychanie rozpylonych cieczy używa się w cierpieniach błony śluzowej ust i polyku (pharyngitis catarrhalis, grannlosa, ulcerosa, crouposa, syphilitica), a także w cierpieniach dróg oddechowych: bronchitis putrida, bronchiectasia, bronchorrhoea, po zapaleniu miąższu płucnego przyrody zapalnej czy gruźliczej. Używanie rozpylacza jest daleko przyjemniejsze, jak tuszowanie lub wdmuchiwanie suchych pyłów.

Oddychać należy głęboko, spokojnie, przycisnąwszy język ku dołowi, w ciągu  $\frac{1}{2}$ —1 minuty, a następnie przerywać na parę minut, aby odpocząć. Jedno posiedzenie trwa 5—30 minut, 2—4 razy dziennie. Wziewania mleczanki ze środkami odurzającymi lub bez tychże usuwają w ostrych niezżytach tchawicy i oskrzeli przykre uczucie palenia i suchości; wziewanie płynów rozpuszczających błonę chorobową może znacznie zmniej-

szyc nasilenie choroby; nareszcie wziewanie środków lotnych, balsamicznych i przeciwniejących może wpłynąć na ograniczenie ilości chorobowej wydzieliny i na zniszczenie smrodliwych jej własności w chorobach dróg oddechowych. Do środków wysuszających zawartość jam zapalnego czy też gruźliczego pochodzenia należą: oczyszczona smoła drzewna, ol. terpentynowy, olejki żywiczne (ol. pini), kreozot, tymol. Używają się te środki zwykle wtedy, gdy gorączka jest słaba (do 38° C.), a płwocina obfita. Do środków odwianiających i niszczących obrzydliwy zapach należy przedewszystkiem kwas fenilowy; środka tego używa się tam, gdzie podniesienie ciepłoty jest wysokie (39—40° C.). w okresie jam, po zapaleniu przyrody gruźliczej.

### Dawki środków używanych do wziewań.

- Acid. benzoicum 0·5—1·0 na 10 spir. vini.  
 Acid. carbolicum 0·5—1·0 na 100 wody.  
 Acid. lacticum 1—2:100.  
 Acid. tannicum 1—2:100.  
 Alumen crud. 2—3:100.  
 Ammonium chloratum 1—2:100.  
 Amylnitrit 2—5 kropli nalać na chustkę i wdychać.  
 Aq. calcis szczera lub na połowę z wodą.  
 Aq. chlorata na pół z wodą.  
 Aq. hydrosulphurata na pół z wodą.  
 Aq. laurocerasi 3—5:100.  
 Aq. picis szczera lub na pół z wodą; chorzy ją znoszą chętnie, bo nie drażni.  
 Argent. nitr. 0·1—0·2:100.  
 Borax venet. 3—5:100.  
 Bromum, Kali brom. aa. 0·2:100 na gąbce, oddycha się przez rurkę.  
 Emuls. oleosa 5:100.  
 Extr. conii maculat. 0·05—0·15:100, albo Extr. stramonii 0·5—1·50:100.  
 Extr. hyoscyami 0·05—0·20:100.  
 Extr. opii aq. 0·1—0·2:100.  
 Ferri sesquichl. solut. 0·5—1:100.  
 Flores sambuci, flores tiliae, rad. Altheae 5—25 na 500·0.  
 Glicerini puri 10:100  
 Hydr. bichlor. corros. 0·05—0·10:100.  
 Kali bromati 3:100.  
 Kali chlor. 3—5:100.  
 Kali hypermang. 0·1—0·2:100.  
 Kali jodati 1—2:100, albo z dodatkiem 0·02 jodu czystego.  
 Kreosot. gtt. 2:100.  
 Liq. kali caustici 2:100.  
 Lithium carbon. 0·2—2:199.  
 Morph. muriat 0·1:100.  
 Natrium chlorat. 1—2:100.  
 Natr. benzoicum 1—2:100.  
 Natr. bicarbon. 3—5:100.  
 Natr. hydrochlor. 0·2—2·0:100.

Ol. pini 1—2:100, albo Ol. terebinthlae rect. 1—2:100.

Plumb. acet. bas. sol. 3—5:100. Pyridin 3—5:0:100.

Tannini puri 1—2:100.

Tinct. cannabis indicae 0·5—1:100.

Tinct. jodi 0·10 z Spir. vini 10:100.

Tinct. opii simpl. 0·2—0·5:100.

Zincum sulphur. 1:100.

Leki w ciepłe ulatniające się, jak Ol. pini, Ol. terebinth. można wzięwać bez przyrzędu, nalawszy do szklanki 10 do 20 kropli i wstawiwszy ją do gorącej wody.

Mineralne wody z Ems, Salzbrunn, Szczawnickie do wzięwań używają się szczerze lub wodą rozcieńczone.

Z kalend. Dr. J. St. Saw.

## Leczenie zapomocą wstrzykiwań podskórnych.

Używane zwykle strzykawki zawierają 1 grm. płynu i są zaopatrzone w przedziałkę dziesiętną. Przepisywać więc należy lekarstwo rozpuszczone w 10 grm. płynu, a wtedy każdy decigram (0·1) cieczy zawierać będzie setną część przepisanego leku.

*Acidum carbolicum crystalisatum* 0·10 na Aq. dest. 10·0; z tego  $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki t. j. 0·005—0·01 kwasu karbolowego na raz. Działa przeciwnie, miejscowo znieczula. Używa się w róży, reumatyzmie stawów, itd.

*Acidum osmicum* 1:100, 0·5—1·0 pro dosi (= 0·005—0·01) jako antineuralgicum in loco; S. ad vitrum fuscum.

*Acid. sclerotinicum* 5:100 aq. dest. p. dosi 0·5—1·0 (0·025—0·05).

*Aether* 0·5—1·0 naraz.

*Apomorphinum hydrochl.* 0·10 na 10·0 aq. dest., z tego 3—7 podziałek, 0·003—0·007 apomorphinu) dorosłym, a 1—1 $\frac{1}{2}$  dzieciom. S. Środek wymiotny.

*Aspidosperminum alcaloid* Quebracho 2:100 wody; pro dosi 1·0 (= 0·02) i więcej.

*Atropinum sulph.* 0·01:10·0 wody; z tego 5—10 podziałek (0·001—0·002 Atropinu). W tężcu, nerwobólach, padaczce, drgawkach, wściekliwości i otruciu morfiną. Zaleca się wielką ostrożność!

*Camphorae* 0·50 Ol. amygd. dulc. 10·0;  $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki (0·005—0·01 kamfory), środek pobudzający.

*Chininum bisulphuricum* (lepsze, niż chininum sulphur.). 1·0 rozpuszcza się wśród ogrzania w 5·0 gliceryny czystej i 5·0 wody; z tego używa się 8—10 podziałek (0·03 do 0·10 chininy). W zimnicy, nerwobólu, gościecu stawowym.

*Chloralum hydratum* cryst. 4·0 na 10 wody; 1—4 strzykawkę wstrzyknąć w różne części ciała (Łatwo sprawia ropnie). Środek nasenny i kojący ból.

*Chloroformium purum* 1·0 i więcej.

*Cocaini murat.* 0·5 na 10 wody  $\frac{1}{2}$  strz. = 0·01 kokainy w zapaleniu tężówko-rzęskowem dla uśmierzenia bólów.

*Coffeinum purum citricum, hydrobromicum* 0·5 Aq. dest. Spir. vini dil. aa. 5·0;  $\frac{1}{2}$  do całej strzykawki na raz (0·01—0·05 kofeiny); migrena, otrucie morfiną.



*Curarinum sulph.* 0·2 Aq. dest. 10·0 z tego wstrzykuje się ostrożnie 1—4 podziałek (0·002—0·01). Poraża końce nerwów. Używa się w tężen i kureczach.

*Daturinum* jak *atropinum sulphuricum*.

*Digitalinum* 0·05 Aq. dest. Spir. vini dil. aa. 5·0; z tego 1—5 podziałek (0·005—0·01 *Digitalinu*). Obniża czynność serca.

*Duboisinum sulphuricum* 1:500 aq. dest.; p. dosi 0·1—0·2 = (0·0002—0·0004).

*Eserinum* 0·1—0·5 Aq. destil. 10·0;  $\frac{1}{5}$ —1 strz. (0·01—0·05).

*Extr. secalis cornut.* aq. 1·0 Aq. dest. Glycerini puri aa. 5·0;  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ —1 strzyk. (0·025—0·05—0·10 Sec. corn.). W krwotokach, w długotrwałem zapaleniu macicy, włókniakach macicy, wypadaniu kiszki stolcowej. Najlepiej używać extract bis purifecat.

*Ferrum pyrophosphoricum* c. natro citrico 2 na 10 wody. z tego 1·0 in Anaemia pernicioza i w wypadkach, gdy wewnętrzne użycie żelaza jest niemożliwe z powodu nieżyty żołądka i kiszki, wrzodu żołądka itp.

*Gelseminum hydrohl.* 1:200 wody; 0·1—0·2 pro dosi (0·0005—0·001) przeciw nerwobólom.

*Hydrargyrum bichloratum corrosivum* 0·1 w 10 wody; z tego  $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki (0·005—0·01 sublimatu). *Hydrarg. cyanat.* 0·5 na 10 wody i strzykawkę na raz.

*Hydrarg. formamidatum solutum* 1:100; 0·5—1·0 p. dosi.

*Kalium jodatum* 3·0 na 10 wody,  $\frac{1}{2}$ —1 strzyk. (0·15—0·3 Jodu).

*Liq. hydrargyri albuminati* 1:100; 0·5—1·0 pro dosi.

*Morphium acet. (hydrochlor., sulph.)*, 0·20 na 5 gliceryny i 5 wody, 3, 5, 7 podziałek do całej (0·003, 0·005, 0·007—0·01 Morph.); do 0·02 pro dosi.

*Narceini hydrochlor.* 0·20 na 10 wody, 3, 5, 7 podziałek do całej strzykawki, t. j. do 0·006—0·02 *Narceiny*.

*Physostigminum salicylicum* lub *muraticum* 1:500 aq. dest.; pro dosi 0·2—0·5 (0·0004—0·001) zamiast *Eserinum* murat.

*Pilocarpinum* mur. 0·20 aq. dest. 10·0;  $\frac{1}{2}$  strz. = 0·01.

*Solut. arsen. Fowler* 1·0 z tego rozcieńcza się 20 wody, 0·3—0·6 pro dosi w drżeniu, psoriasis, chorea.

*Strichninum nitr. v. sulph.* 0·10 na 10·0 wody; z tego 3—6 podziałek, t. j. 0·003—0·006 strychniny na raz. Wywołuje kurcze. Zadaje się w porażeniach po otruciu ołowiem, w porażeniu pęcherza, w porażeniach obwodowych odnóg i mięśni kiszki stolcowej, w porażeniu poprzecznem (paraplegia), Ataxia med. spin., Atrophia musc. progres. i paralysis infantum essent.

*Tinct. opii* 5—15 kropli na jedno wstrzyknięcie.

*Aconitinum*, *Coniinum*, *Emetinum*, *Hyoscyaminum* nie zalecają się, bo działają niepewnie.

Strzykawka, której igła ma otwór zapehany, oczyszcza się przeciągnięciem jej na chwilę przez płomień. Jeżeli otwór zardzewiał, to należy wprzód oliwy do igły wciągnąć, następnie ogrzać, a po tem jeszcze wysokiemi przepłukać. Tak samo postąpić, jeżeli drut w igle zardzewiał.

Z kalend. Dr. J. St. Saw.

# KOSMETYKI. \*)

## Octy toaletowe.

*Rp. Ol. Rosmarin*  
*Ol. Juniper.*  
*Ol. citri āā. 1'00,*  
*Ol. Thymi 2'00,*  
*Ol. Caryophyll. 5'00,*  
*Tinct. Cinnam.*  
*Tinct. arom. āā. 50'00,*  
*Acet. vini 1000'00.*  
S. Ocet toaletowy. Łyżkę do  
miednicy wody do mycia.

*Rp. Tinct. moschi 5'00,*  
*Ol. lavandul*  
*Ol. Citri*  
*Ol. rosmarin āā. 2'00,*  
*Spir. vini 100'00,*  
*Acet. vini 50'00.*  
MDS. Ocet do wachania.

*Rp. Bals. Peruv. 5'00,*  
*Tinct. Benzoës 25'00,*  
*Bals. vitae Hoffm.*  
*Spir. vini dil. āā. 250'00,*  
*Aq. rosar. 150'00,*  
*Acidi acet. dil. 50'00.*  
*Macera per hebdom. filtra.*  
S. Vinaigre de toilette.

*Rp. Ol. Bergamott. 1'00,*  
*Tinct. Ambrae gris. 16'00,*  
*Tinct. Vanillae 1'50,*  
*Ol. Neroli 1'50,*  
*Acid. acet. conc. 8'00,*  
*Alcohol 180'00.*  
S. Ocet toaletowy.

Octy toaletowe służą do zmywania, zmniejszają wydzielanie gruczołów potnych, ściągają skórę. Na miednicę wody dodaje się 1—2 łyżeczek.

## Proszki pachnące.

*Pulv. Ireos Flor. p. 300,*  
*Moschi p. 5,*  
*Essent. Rosar. p. 5,*  
— *Citri p. 3,*  
— *Bergamotti p. 12.*  
S. Essbouquet.

*Pulv. Ireos Flor. p. 200,*  
*Vanillae p. 10,*  
*Moschus p. 0'25,*  
*Ol. rosar. gttam.*  
*Ol. amygd. amar. aeth. gttam.*  
S. Heliotrope.

*Pulv. lavandul. 75'00,*  
*Benzoës 20'00,*  
*Ol. lavand. 1'00.*

Proszki te służą do napełniania woreczków, które się między  
bieliznę kładzie.

\*) Niechcąc odmówić żądaniu wielu kolegów, umieszczam krótki spis  
formulek kosmetycznych. W przyszłym roczniku będzie ten dział obszerniej  
zestawiony.

# Środki do upiększenia i ochrony skóry.

## 1. Mydła.

*Rp. Sapon. pulv.* 25'00,  
*Natri carbon. sicc.* 2'50,  
*Amyli oryzae* 10'00,  
*Pulv. Irid.* 5'00,  
*Mixturae odorif.* 4'00.  
 S. Poudre de Feves.

*Rp. Sapon pulv.* 20'00,  
*Borac. venet*  
*Zinci oxydat. āā.* 1'00,  
*Essent. millefol. q. s.*  
 S. Proszek mydlany.

*Rp. Ol. Cocos, Sebi bovini*  
*Liquor. Natri caust. āā.* 40'00,  
*Camphor. in ol. solut.* 15'00,  
*Fiat via frig. sapo*  
*pond.* 100'00.

S. Mydło kamforowe (przeciw odmrożeniom).

*Rp. Talci venet. praep.*  
*Amyli orizae*  
*Sapon odor. āā. q. s.*  
*f. l. a. globuli.*

S. Savonettes à la Bergamotte.

## 2. Tłuszcze.

*Rp. Ol. Cocos* 50'00,  
*Aq. rosar.* 5'00,  
*Ol. rosar. gttam.*  
 S. Cold-Cream.

*Rp. Sem. excort. Hippocast.*  
*pulv.* 100'00,  
*Amygd. amar. pulv.* 50'00,  
*Rhiz. Irid. flor.* 40'00,  
*Natri carbon. dil.* 10'00,  
*Ol. Bergamottae* 2'00.  
 S. Proszek do mycia (na popękaną skórę rąk)

*Rp. Cetacei* 10'00,  
*Ol. ricini* 60'00,  
*Ol. amygd.* 20'00,  
*Ol. odorati* 1'00.  
 S. Pomada krystaliczna.

*Rp. Lanolini*  
*Vasellini alb. āā.* 50'00,  
*Vanillini* 0'10,  
*Ol. Bergamottae* 2'00.  
 S. Maść na popękaną skórę twarzy i rąk.

Maści tłuste wieiera się po poprzedniem wymyciu i osuszeniu, najlepiej wieczorem, a ponieważ używa się ich na skórę szorstką, suchą, przeto ścierając nadmiar, zostawia się mały pokład tłuszczu.

## 3. Alkaliczne środki.

*Rp. Natri carbon.* 5'00,  
*Aq. rosar.* 100'00,  
*Glycerin* 50'00,  
*Extr. mille flor. gtts* 10.  
 S. Do zmywania twarzy przy wagrach (Comedo).

*Rp. Kali carbon.* 10'00,  
*Aq. destil.* 100'00,  
*Ol. aeth. Cinam. gtts* 2,  
 „ „ Rosar. „ 1.  
 Lilionèse. Do zmywania twarzy przy nadmiernem wydzielaniu tłuszczu.



## 4. Kwasy.

Rp. *Acidi borici* 5·00,  
*Lanolin*  
*Ung. emoll.* āā. 25·00.  
 Mfung. S. Opaloną od słońca  
 skórę twarzy pokryć szmat-  
 ką nasmarowaną maścią na  
 grubość noża.

Rp. *Acidi Salicyl.* 3·00,  
*Talci pulv. alcoh.* 100·00,  
*Ol. ros. q. s. ad odor.*  
 S. Proszek przeciw miejscow-  
 wym potom.

Rp. *Acidi carbol.*  
*Acidi tannici* āā. 4·00,  
*Trae jodi* 8·00,  
*Vaselin* 120·00.  
 S. 3—4 razy dziennie przykła-  
 dać na piegi.

Rp. *Naphtholi-B* 10·00,  
*Spir. vini gall.* 175·00,  
*Spir. Colon.* 25·00.  
 S. Do mycia pocących się rąk  
 i nóg.

## 5. Balsamy i żywice.

Rp. *Trae Benzoes* 10·00,  
*Aq. Rosar.* 100·00.  
 S. *Lac Virginis.*  
 Rp. *Ammon. sulphoichtyol.*  
*Boli rubr.*  
*Trae Curcumae q. s.*  
*f. pasta.*  
 Pasta zapobiegająca powsta-  
 waniu piegów.

Rp. *Trae benzoës* 4·00,  
*Kali carbon.*  
*Spir. camphor.* āā. 1·00,  
*Aq. Colon.* 250·00,  
*Trae ambræ mosch.* 0·25.  
 S. *Eau de Princesse.*  
 Dodać 1—2 łyżek do wody  
 do mycia.

## 6. Pudry, bielidła i róż.

Rp. *Amyli pulv.* 240·0,  
*Lapid. batplast.*  
*Talci venet.*  
*Alum. plum.* āā. 120·00,  
*Ol. rosar. gtts* 20,  
*Ol. Neroli gtts* 12.  
 S. *Pulv. cosmeticus albus*

Rp. *Lanolin anhydr.* 9·00,  
*Adip. benzoat.* 3·00.  
 S. *Lanolin crème.*

Rp. *Talci ven. alcoh.* 9·00,  
*Zinci oxyd. subt.* 1·00,  
*Spermaceti* 10·00,  
*Ol. amygd. dulc.* 20·00,  
*Ol. rosar. gtts* 2  
*Ol. neroli gtt.* 1  
*Tinct. moschi gtt.* 1  
*Cumarin* 0·005.  
 DS. Bielidło tłuste.

Rp. *Pulv. cosm. albi* 500·00,  
*Carmin sol.* 0·50.  
 S. Puder różowy.

Rp. *Carmini* 0·50—1·00,  
*Talci ven. alcoh.* 50·00.  
 MDS. Róż.

Rp. *Carthamini* 1·00,  
*Talci ven. alcoh.* 9·00,  
*Spermaceti* 10·00,  
*Ol. amygd. dulc.* 20·00.  
 S. Róż tłusty.

Rp. *Cerae alb.* 10·00,  
*Ol. oliv.* 20·00,  
*Ol. Citri*  
*Ol. Bergamott.* āā. 1·00,  
*Carmin* 0·20.

DS. Pomada na wargi.

Tłuste bielidła wskazane są  
 na zimę, w lecie wśród upa-  
 łów stosowniejsze pudry.

## Włosy.

(Zob. alopecia w podr. terapeut.).

### Pomady wzmacniające:

*Rp. Axungiae*  
*Sebi ovil. āā. 60'00,*  
*Ol. amygd. dulc. 8'00,*  
*Bals. peruv. 4'00,*  
*Trae benz. 2'00.*  
 S. Pomada.

*Rp. Kali carbon. 3'00,*  
*Aq. rosar. 100'00,*  
*Glycerin 10'00.*  
 DS. Woda do mycia przeciw  
 Pityriasis caput.

*Rp. Extr. fluid. chinæ 4'00,*  
*Tinct. cantharid. 8'00,*  
*Glycerin 30'00,*  
*Bay-Rum 15'00,*  
*Aq. rosar. 600'00.*  
 S. Hair Tonic.

Wody te wciera się gąbką na  
 noc, na drugi lub trzeci dzień  
 zmywa wodą letnią lub żółtkiem.

*Rp. Ol. ricini 5'00,*  
*Spir. vini rectif. 50'00,*  
*Ol. aeth. flor. aurant gttss XV.*  
 DS. Brillantina.

*Rp. Axungiae benzoat 100'00,*  
*Lanolin*  
*Ol. olivar. āā. 75'00,*  
*Bals. peruv.*  
*Extr. chinæ spir. āā. 5'00.*  
 Mfu. S. Pomada.

*Rp. Acidi carbol*  
*Bals. peruv.*  
*Spir. lavand. āā. 5'00,*  
*Spir. vini gallic. 30'00.*  
 S. Woda przeciw łupieży.

*Rp. Boracis 2'00,*  
*Aq. rosar. 40'00,*  
*Aq. amygd. 3'00,*  
*Aq. naphæ 5'00,*  
*Esprit. Ylang-Ylang gttss X.*  
*Ol. olivar. rec. optim 50'00.*  
 Mf. emulsio. Środek konser-  
 wujący porost włosów.

## Środki do barwienia włosów.

*Rp. Succ. cortic. Jugland.*  
*rec. expr. 15'00,*  
*Alcohol. 90'00 macera*  
*per dies 10. filtra.*  
 S. Włosy przed użyciem zmyć  
 roztworem węglanu potasu.

*Rp. Argenti nitrici 2'50,*  
*Aq. destil. 17'50.*  
*MD. ad vitr. nigr.*  
 S. Do barwienia na czarno.  
 Nr I.

*Rp. Acidi pyrogall. 2'00,*  
*Spir. vini*  
*Aq. destil. āā. 10'00.*  
 MDS. Do ciemnego barwienia  
 włosów.

*Rp. Kali sulphurati 2'50,*  
*Aq. destil. 17'50.*  
 MDS. Do barwienia na czarno  
 Nr II. (Płyn utrwalający).

*Rp. Sol. kali jodat (5'0) 10'00.*  
 DS. Nr. III. Do mycia płam  
 po Nr. I.

*Rp. Hydrogen. hyperoxyd. 20'00,*

*Aq. destil. 50'00.*

MDS. Dla nadania jasnej barwy.

Włosy oczyszczone, wymyte, starannie osuszone smaruje się małą szczoteczką podanemi płynami, uważać, aby nie plamić skóry głowy i czekać do dokładnego wyschnięcia. Następnie, co parę tygodni smarować na nowo. Po smarowaniu c. Arg. nitr., zwilża się mokre jeszcze włosy przetworami siarki.

## Depilatoria.

*Rp. Calc. hydr. sulph. in aqua*  
20'00,

*Ung. glycerin*

*Amyli āā. 10'00,*

*Essent. Citri gtts X.*

(Środek niezbyt silny).

*Rp. Calc. hydr. 30'00,*

*Auripigm. pulv. 5'00.*

M. exact. S. Zmięszać z wodą na pastę.

(Środek br. silny).

S. Na miejsca mające być pozbawione włosów, nałożyć warstwę 1—2 m. m. grubą a po 10—30 m. (gdy czuć pieczenie) zmyć, oskrobawszy poprzednio tępym nożem.

## Środki do utrzymania czystości zębów.

*Rp. Cretae alb. praep. 80'00,*

*Pulv. Sapon. med. 10'00,*

*Ol. anisi*

— *menth. āā. 1'50.*

MDS. Proszek do zębów.

*Rp. Resorcin 5'00,*

*Glycerin 20'00,*

*Spir. vini 170'00,*

*Ol. menth. 2'00.*

MDS.  $\frac{1}{2}$  łyżeczki na szklankę płukanki.

*Rp. Pulv. radic Iridis 80'00,*

*Mentholi 1'00,*

*Ol. menth pip. 0'50,*

*Ol. caryophyl. gtts 3.*

MDS. Proszek do zębów.

*Rp. Trae Myrrhae*

— *Ratanh. āā. 7'50,*

*Ol. menth. 1'00,*

*Spir. Colon. 200'00.*

S.  $\frac{1}{2}$  łyżeczki na szklankę wody do płukania.

*Rp. Oss. sepiæ*

*Cretae p. āā. 10'00,*

*Magnes. carbon.*

*Rad. irid. flor. āā. 60'00,*

*Cremor tartar. 3'00,*

*Ol. menth. pip. 1'00.*

Mfp. S. proszek do zębów.





## Norma ordynacyjna i dyspensacyjna

której wskutek rozporządzenia wysokiego Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 17 Marca 1891 l. 12.995 trzymać się należy przy zapisywaniu i wydawaniu leków na rachunek skarbu państwa, funduszu przez Rząd administrowanego, jakoteż w ogólności na rzecz publicznych zakładów ubogich i zakładów humanitarnych.

Z odwołaniem się do postanowień rozporządzenia Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 1 Lipca 1889 (Dz. u. p. Nr. 107), dotyczącego się siódmego wydania farmakopei austriackiej, jakoteż do rozporządzenia Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 12 Grudnia 1889 (Dz. u. p. Nr. 191), dotyczącego się cennika lekarstw na tejże farmakopei opartego, wydają się zamieszczone poniżej postanowienia, według których lekarze i aptekarze postępować mają przy zapisywaniu i wydawaniu leków na rachunek skarbu państwa, funduszu przez Rząd administrowanego, jakoteż w ogólności na rzecz publicznych zakładów ubogich i zakładów humanitarnych.

§. 1. Lekarze, którzy na koszt państwa lub funduszu publicznego przez Rząd administrowanego zapisują lekarstwa lub obowiązki, tudzież aptekarze, którzy je wydają, winni obznajomić się dokładnie z cenami w obowiązującym cenniku lekarstw podanemi a tyczącemi się tak leków jak i robót aptekarskich i naczyń, i — o ile co do pewnych zakładów nie istnieją lub nie będą wydane szczególne przepisy wyjątkowe — trzymać się postanowień następujących.

§. 2. W ordynacjach swoich ograniczać się mają lekarze zwyczajnie do leków i obowiązków zawartych w obowiązującej pod porę farmakopei i w wydanym naówczas cenniku lekarstw. Zapisanie leków i obowiązków nieaptecznych, tylko wyjątkowo dozwolone, należy w krótkości uzasadnić w recepte lub w rachunku aptekarskim, który podpisać ma także i lekarz.

§. 3. Leki, dla których farmakopea nie podaje przepisu przyrzędzania, zapisywać należy za każdym razem według zasad farmacyi

§. 4. Lecząc pewną chorobę, zapisywać wolno tylko leki i obowiązki, które okazują się potrzebnymi, to zaś, co się zapisuje, powinno być zawsze jak najprostsze i jak najtańsze tak pod względem środków, jak i postaci lekarstwa. Gdy środków lekarskich, które jednakowo odpowiadają celom terapeutycznym, jest dwa lub więcej, zapisywać należy zawsze tylko tańszy.

§. 5. Sole w wodzie rozpuszczalne, jak *kalium bromatum*, *kalium chloricum*, *kalium jodatum*, *natrium*, *hydrocarbonicum* itd., o ile pod względem lekarskim nie zachodzi żadna obawa, zapisywać należy tylko za pierwszym razem rozpuszczone; w razie ponowienia lekarstwa, zapisywać należy w odpowiedniej ilości samą tylko sól (w jej właściwej postaci), która ma być zastosowana rozpuszczona w wodzie; sól tę rozpuścić ma w wodzie sam chory lub osoba, która go pielęgnuje, a naczynie z pierwszej ordynacyi pozostałe służyć ma za miarę ilości wody potrzebnej do zrobienia rozczynu.

§. 6. Środki, które już w małych dawkach skutecznie działają, jeżeli zapisanie ich rozczynu jest niemożliwe lub nie odpowiedziałoby celowi, a natomiast zapisanie ich w postaci proszku okazuje się najwłaściwszem, zapisywać należy w postaci proszków podzielonych na osobne dawki, gdy zaś zapisuje się proszki ze środków działających dopiero w większych dawkach, unikać należy ile możności dzielenia na osobne dawki.

§. 7. Dodatek cukru, gdy proszki są podzielone, nie powinien wynosić więcej nad 0.5 na każdą dawkę.

Cukru samego nie wolno z apteki zapisywać.

§. 8. Dla pokrycia lub polepszenia smaku lekarstwa, wolno zapisywać do proszków opłatki bezbarwne, do lekarstw zaś płynnych na ilość aż do 200.0 gramów płynu, najwięcej 20.0 gramów syropu lub *mel depuratum*.

Dodawanie cukru we właściwej postaci lub *extractum liquiritiae* nie jest dozwolone. Również nie wolno dodawać do leków mocno gorzkich jak np. do chininy środków osładzających w dawkach a nie pozwalających spodziewać się istotnego polepszenia smaku.

§. 9. Jak proste rozczyzny, taksamo napoje, nalewy i napary z tych środków, które w cenniku lekarstw nie są większemi czcionkami wydrukowane, tudzież kataplazmy i gorczyczyniki powinny być robione ile możności nie w aptece, lecz w domu chorego przez jego krewnych lub osoby otaczające, według polecenia lekarza.

Rozczyzny najpospolitszych środków odwietrzających, które w szpitalach używane są w większych ilościach, z wyjątkiem tych, które wymienione są w tablicy I. farmakopei, powinny być także sporządzane przez posługaczy pod dozorem lekarza.

§. 10. Plastry należy kazać rozsmarować w aptecce tylko wtedy, gdy tego ani sam chory, ani otaczające go osoby zrobić nie mogą. W szpitalach używać należy do tego posługaczy.

§. 11. Na okłady używać należy zwyczajnie tylko wody.

Do zrobienia kataplazmów zapisywać należy tylko mąkę z makuchów lnianych *farina placentae lini*.

§. 12. Używanie pijawek ograniczyć należy do najkonieczniejszej potrzeby.

§. 13. Jeżeli tesame lekarstwa i do tychsamych godzin ordynacyjnych są potrzebne w jednej sali szpitalnej, zapisać je należy w jednej receptce podając numera łóżek cyframi a ilość sztuk głoskami.

§. 14. Gdy lekarstwo trzeba ponowić, pisze się zwyczajnie nową receptę; jeżeli lekarz ordynujący uzna za potrzebne zarządzić ponowienie bez żadnej zmiany takiego lekarstwa, którego recepta w myśl §. 7-go rozporządzenia Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 12 Grudnia 1889 (Dz. u. p. Nr. 191), została w aptece odkopiowana, można zarządzić wydanie ponowne dołożeniem daty i podpisu.

§. 15. Wszystkie szczegóły recepty powinny być napisane w myśl istniejących przepisów ogólnych — rozporządzenie ministeryalne z dnia 12 Grudnia 1889, §§. 4 i 5 — wyraźnie i czytelnie, i recepta powinna być podpisana, iżby nie mogła powstać żadna wątpliwość ani co do środka, ani co do ilości, ani też co do osoby lekarza ordynującego.

§. 16. Również przy taksowaniu sporządzonego lekarstwa trzymać się należy ściśle postanowień §§. 14 i 15 rozporządzenia ministeryalnego z dnia 12 Grudnia 1889.

§. 17. Co do een naczyń (flaszek, słoików, pudełek) wolno (§. 10 rozporządzenia ministeryalnego z dnia 12 Grudnia 1889) liczyć tylko najniższe z podanych w cenniku lekarstw.

Do lekarstw, które można wydawać w torebkach papierowych, takich torebek używać należy.

§. 18. Nie wolno liczyć należytości za flaszki i słoiki, jeżeli naczynie z poprzedniej ordynacyi pozostałe, odniesiono do apteki należycie oczyszczone. Lekarze powinni czuwać nad tem, żeby naczynia były powtórnie używane i w tym celu dopisywać mają na recepte *ad vitrum, adlatum*.

§. 19. Lekarze w ordynacyach swoich odstępujący od przepisów powyższych, jeżeli tego odstąpienia gruntownie nie usprawiedliwią, zniewalani będą do zwrotu naddatków, których przyczyną była ich recepta.

Postanowienia powyższe stosowane będą także do tych lekarzy, którzy z polecenia lub z wiedzą właściwej Władzy są zastępcami mianowanych lub zamówionych lekarzy.

Wykroczenia służby aptekarskiej przeciwko przepisom o zapisywaniu i wydawaniu lekarstw karane będą w myśl §. 22-go rozporządzenia c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 12 Grudnia 1889 (Dz. u. p. Nr. 191).

§. 20. Według postanowień powyższych, które mają na celu oszczędzanie ile możności funduszków państwa, na publiczną opiekę nad chorymi przeznaczonych lub funduszków, któremi Rząd zawiaduje, postępować mają lekarze i aptekarze także przy zapisywaniu i wydawaniu leków w służbie opieki publicznej nad chorymi ubogimi, tudzież, gdy sprawują obowiązki w szpitalach i zakładach humanitarnych, będących pod zarządem krajów lub gmin, jakoteż przy zapisywaniu i wydawaniu lekarstw dla członków kas chorych, według ustawy z dnia 30 Marca 1888 (Dz. u. p. Nr. 33) urządzonych, którzy obowiązowi ubezpieczenia podlegają, o ile wydziały krajowe, gminy lub inne uprawnione administracye owych zakładów tego żądają.



# Tablica brzemienności.

Ostatnia regularność	Dzień porodu	Ostatnia regularność	Dzień porodu
Styczeń 1	Październ. 8	Lipiec 5	Kwiecień 12
" 5	" 12	" 10	" 16
" 10	" 17	" 15	" 21
" 15	" 22	" 20	" 26
" 20	" 27	" 25	Maj 1
" 25	Listopad 1	" 28	" 4
Luty 1	" 4	Sierpień 1	" 8
" 5	" 8	" 5	" 12
" 10	" 12	" 10	" 17
" 15	" 22	" 15	" 22
" 20	" 27	" 20	" 27
" 25	Grudzień 1	" 25	Czerwiec 1
Marzec 1	" 6	" 28	" 4
" 5	" 10	Wrzesień 1	" 8
" 10	" 15	" 5	" 12
" 15	" 20	" 10	" 17
" 20	" 25	" 15	" 22
" 25	" 30	" 20	" 27
" 28	Styczeń 2	" 25	Lipiec 2
Kwiecień 1	" 6	" 28	" 5
" 5	" 10	Październ. 1	" 8
" 10	" 15	" 5	" 12
" 15	" 20	" 10	" 17
" 20	" 25	" 15	" 22
" 25	" 30	" 20	" 27
" 28	Luty 2	" 25	Sierpień 1
Maj 1	" 5	" 28	" 4
" 5	" 9	Listopad 1	" 8
" 10	" 14	" 5	" 12
" 15	" 19	" 10	" 17
" 20	" 24	" 15	" 22
" 25	Marzec 1	" 20	" 27
" 28	" 4	" 25	Wrzesień 1
Czerwiec 1	" 8	" 28	" 4
" 5	" 12	Grudzień 1	" 7
" 10	" 17	" 5	" 11
" 15	" 22	" 10	" 16
" 20	" 27	" 15	" 21
" 25	Kwiecień 1	" 20	" 26
" 28	" 4	" 25	Październ. 1
Lipiec 1	" 8	" 28	" 4

# Otrucia ostre i sposób ratowania w tychże.

Trucizna	Objawy	Odrutki
<b>Aconitinum.</b> Tojad mor-downik (fo-lia, flores, radix, Tinet., Extract).	Pieczenie języka, dławie-nie, mrowienie, drętwienie kończyn, ślinotok, wymio-ty, tętno słabe, obniżenie ciepłoty ciała, zimne poty, niepokój, rozszewienie żre-nie, zabójcza dawka 0·003—0·004.	Leki wymiotne, pompa żołądkowa, kawa, her-bata, wino, kamfora, Acid. tannic. 4·0 Aq. d. 200·0. Syr. 20·0. S. Co. 5 min. łyżkę. Sztuczna wentylacja płuc.
<b>Acidum car-bolicum.</b>	Wymioty, ból w epigas-trium, zapad, śpiączka. Trująca dawka od 5·0.	Emetica, pompa żołąd. Calcaria saccharata, mleko, kleiki, lód. Rp. Magnes. ust. in Aqua 200·0. S. Połowę na raz, później co ½ g. łyżkę. Lód, magnezja, kreda. soda we wodzie, dużo płynów, woda mydla-na, kleiki.
<b>Acidum hy-drochl.</b> „ <b>nitricum.</b> „ <b>sulphur.</b>	Obrzmienie bł. śl. ust, pa-lenie i pieczenie przew. od ust do żołądka, bóleści, wymioty kwaśne fusowate, upadek sił.	Środki wymiotne, sztu-czne oddychanie, oble-wania zimną wodą, środki drażniące skórę.
<b>Acidum hy-drocyanic.</b> kwas sino-wodowy kw. pruski Aq. lauroc.	Wdech krótki, wydech zna-cznie dłuższy, drgawki, po-rażenie oddechania. Mdło-ści, nieprzytomność.	
<b>Aether</b>	Śpiączka, znieczulenie, us-tawianie oddechu i tętna. Przy wydechu czuć eter.	Sztuczne oddychanie, (faradyzacja n. phrenic.), zbryzganie wo-dą, inieket. Strychniny (0·001), gorczycznik na okolicę serca.
<b>Alkalia</b> Ług potas. i sodowy, amoniak żrący, sal-miak. <b>Alkohol</b>	Nadżarcia ust, ból silny pa-lący w przełyku, wymio-ciny składają się z rozło-żonej krwi i oddział. alka-licznie, kolka, często krwa-we stolce. Odurzenie, utrata przytom-ności, wymioty, zwięźnienie żrenie, zapad, lepka zimna skóra, piana z ust, woń wysokoku z ust, tętno małe, powolne.	Mleko, rozcieńczony kwas cytrynowy, pi-gułki lodowe, gdy stol-ce krwawe, lewatywy z wody, z lodu. Zlewania zimną wodą, lód na głowę, ręce i nogi zanurzyć w go-rącej wodzie, synapism na kark, lewatywy z zimnej wody.

Trucizna	O b j a w y	O d t r u t k i
<b>Antimonium</b> Tart. eme- tic.	Gwałtowne wymioty, osła- bienie akcyi serca i osła- bienie ogólne, ból palący w żołądku i kiszkaach, zi- mny pot, później rozwol- nienie, pragnienie, drgawki.	Pompa żołąd., pigułki lodowe, mleko, Tanina, Opium.
<b>Anilinum</b>	Nudności, ból głowy, trud- ne oddychanie, senność, utrata przytomności, znie- czulenie skóry. Sina barwa bł. śluz. i skóry, ciepota nizka, tętno wolne.	Pompa żołąd., środki wy- miotne, białko, sztucz- ne oddychanie, leki podniecające, magnez.
<b>Argentum ni- tricum</b>	Wymioty białawe, czernie- ją na powietrzu, oznaki zapalenia żołąd. i jelit.	Sól kuchenna, białko, mleko.
<b>Arszenik</b> i jego przetwory.	Ból w okolicy żołądka, nu- dności, wymioty, biegunka, skóra zimna, przy uczuciu palania, pragnienie. Tętno małe, szybkie, oddech przy- spieszony mozołny. Cza- sami drgawki. Po arseno wo- dorze moczkowaty, dawka zabójcza 0.1.	Środki wymiot., (zinc. sulph.) ferr. hydric. in Aqua, Magnezja, An- tidot. arsenici.
<b>Atropinum</b> Radix, fo- lia, baccae bellad. Szalej.	Suchość i drapanie w gar- dle, chrypka, nudności, trudność mówienia i poły- kania, pragnienie, ból i za- wrót głowy, złudzenia i omamy, rozszerz. źrenic, parcie na mocz, osłabienie serca, szła, drgawki, tężec, podwójne widzenie.	Pompa żołąd., środki wym., tanina, kali jo- dat., morfina, opium, wyskok. Rp. Pilocarp. mur. 0.05, Aq. dest. 5.00 do inj. Zimne o- kłady na głowę.
<b>Baryumzob.</b> <b>Plumbum</b>		
<b>Bromum</b> zob. Jodum		
<b>Camphora</b>	Popęd do ruchów, gonitwa myśli, drżenie, drgawki.	Środki wym., oblewa- nie zimną wodą.
<b>Cantharides</b>	Ból w ustach, przełyku, żołądku, pęcherze w jamie ust, pragnienie, nudności, kurcze przełykowe, moczkowaty, podrażnienie czę- ści płciowych, ból głowy, odurzenie, drgawki.	Pompa żołąd., klejki na- poje z lodem, kamfo- ra, Opium. Unikać tłuszczów!



Trucizna	O b j a w y	O d t r u t k i
<b>Chloral hydratum</b>	Senność, zwięźenie źrenic, zwolnione oddechanie i tętno, ciepłota obniżona.	Środki drażniące skórę, inj. Strychn., Cocainy, ochranianie przed oziębieniem ciała.
<b>Chloroform</b>	Senność, zwięźenie źrenic, obniżenie respiracyi i akcyi serca, obniżenie temperatury, woń chloroformowa z przewodu oddech., porażenie oddechania.	Sztuczne oddychanie, inj. Strychniny, zlewanie zimną wodą, środki drażniące skórę.
<b>Chlorum</b>	Skurecz głosi, krwioplucie.	Świeże powietrze, wdychanie amoniaku i ciepłej pary.
<b>Cocainum</b>	Tętno zmienne, powolne to szybkie, duszność, pobudzenie, drgawki.	Wdychanie amylnitritu, ciepłe kąpiele, morfina.
<b>Codeinum</b> z. Morfinę		
<b>Coffeinum</b>	Niepokój, odurzenie, zawrót głowy, drżączka, kołatanie serca.	Pompa żołąd., środki wymiotne, kali jodat., sztuczne oddychanie, Morphium.
<b>Colchicin</b> Semen. Colch. Zimowit	Silne bóle brzucha, wymioty, biegunka, pragnienie, tętno zwolnione, mąjaczanie, drgawki.	Środki wym., Tanina, Opium, eter, kamfora, wino.
<b>Cuprum</b> grynszpan	Wymioty zieloną treścią, kolka, stolce krwawe, drgawki, oddech utrudniony, nieregularne tętno.	Białko z wodą, mleko, lewatywy ze skrobi, purgantia, wogóle środki osłaniające.
<b>Digitalis</b>	Wymioty, często biegunka tętno zwolnione, następnie nieregularne, rozszerzenie źrenic, osłabienie mięśniowe, zapad, drgawki.	Środki wymiotne, wino, kamfora, Liquor ammon. anis, synapism.
<b>Ergotinum</b> secal. corn. sporysz	Ślinotok, nudności, wymioty, biegunka, ból głowy, drętwienie, śpiączka, zatrzymanie moczu, zapad.	Emetica. opium, amyl-nitrit, chloralhydrat, eter, wino, kawa.
<b>Hydrargyr.</b> Sublimat	Smak metaliczny, ból w ustach, przelyku i żołądka, wymioty, biegunka, czasem krwawa, zatrzymanie moczu, zapad.	Pompa żołąd., mleko, białko.
<b>Hyoscyamus</b> z. Atropin		

Trucizna	O b j a w y	O d t r u t k i
<b>Jodum</b>	Ból w gardle, przelyku i brzuchu, wymioty, zatrzymanie moczu, osłabienie, tętno słabnie.	Kleiki z maki pszennej, białko, magnezja, lód, środki drażniące skórę.
<b>Kalium chloricum</b>	Objawy ze strony żołądka i jelit, upadek sił, zatrzymanie moczu, sinica, haematurya	Pompa żołąd., środki wym., środki podniecające, moczo-pędne, pilocarpin, transfuzja krwi lub wlewanie śródżylne soli kuchen.
<b>Kreosotum</b>	Zob. kw. karbol.	Pompa żołąd., białko.
<b>Morphium</b> <b>Opium</b>	Zapad, upośledzenie czucia, <i>silne zwięźnienie źrenic</i> , skóra blada, głowa gorąca. oddechanie zwolnione, zatrzymanie moczu, pod koniec ciężec lub drgawki.	Pompa żołąd., środki wym. z wyjątkiem tart. emetici, sztuczne oddychanie, tanina, lód na głowę, ręce i nogi do gorącej wody, synapismy, lewatywy z octem, mocna kawa, Coffeina, Atropina (0.01-10.00 Aq. do inj.).
<b>Nicotinum</b>	Uczucie drapania i palenia w ustach i przelyku, biegunka z silnem parciem, wymioty, bledosc skóry, tętno wolnieje, kurecz mięśni oddechow., z początku zwięźnienie, później rozszerzenie źrenic, ciężec, zapad.	Pompa żołąd., kali jodat., Tanina, lewatywy z octu, sztuczne oddychanie, cały aparat środków pobudzających.
<b>Opium vide</b> <b>Morphium</b> <b>Petroleum</b>	Zaburzenia żołądkowo-kiszkowe, zadrażnienie nerek, ból głowy, senność, zapad.	Pompa żołąd., Emetica, sztuczne oddychanie. Excitantia.
<b>Phosphorus</b>	Ból w dołku podsercowym i wymioty miazgą, świecąca w ciemności, mająca woń fosforu. Gastroenteritis, żółtaczka, bolesność w okolicy wątroby i powiększ. tejże. Lekka gorączka, później wymioty krwawe, osłabienie serca, krwotoki z nosa, jelit, macicy, spączka, drgawki, moczu krwawy.	Pompa żołąd., purgantia, środki wymiotne: Cupr. sulphur. 1.0:40.0 Aq. dest. S. na raz połowę, po 5 minut. jeżeli trzeba, resztę. Ol. terebinth., crudum (ozonizatum), co 1/2 godz. po 10 kropli w kleiku. Unikać tłuszczów!

Trucizna	O b j a w y	O d t r u t k i
<b>Plumbum</b> octan. oł.	Palenie w gardle i żołąd- ku, wymioty, biegunki, mo- rzysko, następnie w chro- nicznych przypadkach za- parcie stolca, zawrót głowy. mdłości, porażenia, bóle, przypadki mózgowe.	Emetica, Purgantia, kwas siarkowy roz- cieńczony, siarkan po- tasowy. W braku od- trutek: mleko, białko. Po odtrutkach znowu emetica i purgant, pó- źniej opium i ciepłe kapięle.
<b>Santoninum</b>	Wymioty, odurzenie, żółto- widzenie, upośledzenie res- piracyi, drgawki, (badanie mocz u rozstrzygnąć może).	Pompa żołąd., emetica, Purgantia, sztuczne od- dychanie, grzy drgaw- kach Chloral.
<b>Strychninum</b> wronie oko	Kurcze, Paraesthesya wszy- stkich zmysłów, uczu- cie ciągnięcia w mięśniach karku, tężec, szczękoscisk, opisthotonus, sinica, oddech przerywany, tętno małe. Przytomność zachowana. Dawka trująca 0.015—0.03.	Pompa żołąd., Emeti- ca, Chloralhydr., wzie- wanie chloroform., mor- fina (inj.), czarna kawa.
<b>Sublimat</b> v. hydrgr. <b>Trucizna</b> <b>kiszkowa</b> zepsute kiszki i kieł- basy, wę- dliny	W kilka lub kilkanaście godzin po spożyciu mdłości, ból w okolicy żołądka, mo- rzysko, Gastroenteritis, su- chość w ustach, trudność w połykaniu, tętno przyspie- szone, upośledzenie wzro- ku, podwójne widzenie.	Emetica, Purgantia, Calomel, lewatywy, pó- źniej Rp. Aether de- pur. 2.0 Aq. dest. 150.0, Trae laud. gtts. 10. Syr. 20.0. S. Co 1/2 g. łyżkę.
<b>Ukąszenie</b> <b>jadowitych</b> <b>węzów</b>	Rozwijające się obrzmie- nie w okolicy rany, skóra sina, ziębnienie i ocieża- łość, osłabienie, drżenie, mdłości, tętno ledwie wy- czuwalne, śpiączka, drgaw- ki, (krwotoki z nosa, ust, żołądka).	Wypalenie rany rozp. żelazem, c. kali cau- stic., wyssanie rany. Przewiązanie powyżej rany, wymycie octem, amoniakiem. Na we- wnątrz excitantia: Li- quor ammon. anis; kamfora, wino, cognac.
<b>Gaz świetlny</b> Tlenek węgla	Ból głowy, odurzenie, tętnie- nie naczyń szyjnych, wymioty i śpiączka, zaczer- wienie powłok, drgawki.	Usunięcie chorego z at- mosfery zatrutej. Sztu- czne oddychanie, upust krwi. Transfusja.



## Ratowanie pozornie zmarłych.

Pierwszem zadaniem lekarza wezwanego do pozornie zmarłego powinno być poznanie powodu pozornej śmierci. Rozpytać więc należy obecnych, następnie zbadać ciało, czy nie ma gdzie obrażeń, czy nie nastąpiło udławienie się, czy nie ma plam lub woni, charakteryzujących truciznę, ale jednocześnie, nie tracąc czasu, należy przystąpić do ratowania, a mianowicie:

1. Rozpiąć odzież, obnażyć piersi i szyję, rozpuścić pas lub gorset i obrócić twarz ku drzwiom lub oknu, które należy otworzyć chociażby w czasie mrozu.

Najważniejszą rzeczą jest przywrócenie oddechu, które można uskutecznić w rozmaity sposób: 1. nadając choremu położenie boczne, podtrzymując głowę, drażniąc błonę śluzową nosa piórkiem, słomką lub tabaką, skrapiając mocno twarz i piersi zimną wodą raz po raz, i obcierając po każdym skrapianiu; 2. albo kładąc pozornie zmarłego twarzą ku dołowi, podkładając pod piersi zwiniętą odzież jego, następnie obracając go na bok, a nawet prawie na plecy, żeby nastąpił wdech, a potem szybkim poruszeniem obracając go napowrót twarzą na dół, żeby nastąpił wydech. Powtarza się to 15 razy na minutę i za każdym razem, gdy twarz jest ku dołowi obróconą, należy naciskać plecy, żeby pomódz wyciśnieniu z piersi powietrza; albo 3. wyciągnawszy język chorego, położyć pacjenta plecami na pochylą płaszczyznę na wznak, potem stanawszy przy głowie chorego, uchwycić za ręce wyżej łokci i podnieść je do skroni, a następnie napowrót do klatki piersiowej, przyciskając do niej łokcie mocno, żeby wycisnąć powietrze, znajdujące się w płucach. Powtarza się to około 15 razy na minutę. Jednocześnie można ułatwić wydech pociskaniem brzucha i przyciskaniem doń zgiętych kolan, wdech zaś wyciąganiem nóg, aby napiąć mięśnie brzuszne.

3. Jak tylko oddech naturalny nastąpi, starać się wzbudzić krążenie krwi, pocierając rękami całe ciało, dając środki pobudzające: krople Hofmana, Aether acetic., Liq. amon. anisat, itp.

4. Ratunek winien być dzielny i czynny, ale bez pośpiechu i w należyтым porządku wykonany, przyczem nigdy nie tracić nadziei przywrócenia do życia, chociażby po godzinie bezwzględnej pracy, gdyż są przykłady wskrzeszenia po usiłowaniach trwających sześć godzin i więcej.

**Omdlenie.** Poziome położenie, usunięcie z pokoju osób zbytecznych; świeże powietrze, rozpiąć odzież i skrapiać twarz zimną wodą; skronie nacierać eterem lub octem z wodą; dać wachać mocny ocet, salmiak, krople Hofmana (Liq. anodynus Hofmani); ostatnie i do wewnątrz (20—30 kropli). Po przejściu omdlenia Amilnitrit. najwięcej 3 kr. na chustec do wachania.

**Apopleksya.** Ułożyć głowę wysoko i zastosować zimne okłady często zmieniane, lub pęcherz z lodem; na wewnątrz — leki przeczyszczające, szczególnie, gdy kał lub gazy nagromadzone; na zimne kończyny dolne, kamionkę ogrzaną. Jeżeli twarz mocno czerwona, a żyły szyjne obrzmiałe — upust krwi.

**Wstrząśnienie mózgu.** Jak przy omdleniu, a zresztą stosownie do przypadków.

**Padaczka.** Ułożyć chorego tak, żeby nie mógł sobie zrobić nic złego; rozpiąć odzież, między zęby włożyć łyżkę drewnianą owiniętą w płótno, aby uchronić język od obrażenia. Jeżeli twarz jest mocno zaczerwieniona i żyły szyjne nabrzmiały — zimne okłady, albo niewielki upust krwi.

**Rażenie piorunem.** Położyć poziomo, oblewać zimną wodą, obwiązać zmoczonymi prześcieradłami, środki trzeźwiące. Prosty lud okłada ciało świeżą ziemią. Przedewszystkiem zaś wzbudzić oddechanie. Rany spieczono okłada się zimną wodą.

**Uduszenie gazami.** Położyć chorego na czystym powietrzu poziomo z nieco podniesioną głową i cucić, jak przy omdleniu; lać wodę w twarz, a jeżeli zbiera się na wymioty — ułatwić to, leczyć gardło chorągiewką pióra.

**Powieszenie.** Zdjąć ostrożnie, potem przeciąć pętlę; ułożyć z nieco podniesioną głową na świeżem powietrzu i zastosować oddech sztuczny, skrapianie, nacieranie podeszew i dłoni, jeżeli przyływ krwi do głowy jest zbyt wielki, to wenecekyja. Drażniące enemy z solą i mydłem.

**Zaduszenie ciałem obcym.** Wydalić obce ciało przedewszystkiem, albo za pomocą narzędzi odpowiednich, albo wciskając do żołądka, jeżeli to są pokarmy, albo uciec się do przecięcia połyku. Jeżeli obce ciało jest połknięte, to dać do zjedzenia znaczną ilość chleba razowego, aby z nim ciało obce się wydaliło.

**Utopienie.** Wydalić piasek lub błoto z nosa i ust palcem, nachylić nieco na bok, aby woda znajdująca się w ustach i w tchawicy mogła się wylać, zdjąć odzież i zastosować oddech sztuczny, nacierając i ogrzewając ciało; ciepłe okłady na brzuch, na nogi i pod pachami; excitantia.

**Utrata krwi.** Przedewszystkiem należy zatamować krwotok czy to przez podwiązanie naczynia krwawiącego, czy to za pomocą ucisku, użycia gąbki, waty namoczonej w półtora-chlorku żelaza, lodu itd. Przy krwotokach po przystawieniu pijawek — kamień piekielny, półtora-chlorek żelaza na wacie; jeżeli połknięto pijawkę, to roztwór łyżki stołowej soli w wodzie do wewnątrz. W krwotoku po wyjęciu zęba — zatkać zębodół watą namoczoną w półtora-chlorku żelaza. Jednocześnie jeżeli jest omdlenie, to środki trzeźwiące.

**Zamarznięcie.** Najważniejszą rzeczą jest, aby ogrzewanie nie było raptownem, a odbywało się stopniowo, przy czem należy być bardzo ostrożnym, aby nie złamać zeszywniałych członków. Najlepiej zdjawszy suknie pozornie zmarłemu, ułożyć na śniegu w jakiej stodole lub innem nieogrzanem miejscu i całe ciało obłożyć warstwą śniegu, na parę pędzi grubo, zostawiając tylko usta i nos wolny. Tak pozornie zmarły zostaje dopóty, aż zupełnie odtaje i gibkość członków wróci. Jeżeli śniegu niema, włożyć do wanny z lodem. Gdy zamarznięty odtaje, należy go obetrzeć suchem, nieogrzanem prześcieradłem, ułożyć do łóżka, nakryć chłodną kołdrą, zacząć nacierania i zastosowywanie sztucznego oddechu. Po ukazaniu się pierwszych

znaków życia przenieść pacyenta do umiarkowanie ciepłego pokoju, rozcierać ciało, okryć ciepłej, dać choremu nieco herbaty z winem, lewatywę z ciepłą wodą z solą i trochę rosołu. Jeżeli który z odtajających członków boli, to natrzeć go śniegiem lub wodą z lodem.

**Insolatio.** Zimne okłady na głowę, gorczyczniki na łydki, zimne lewatywy; jeżeli środków tych użyć nie można, naprzykład w marszu — wenesekcja.

**Asphyxia neonatorum.** Oczyścić usta ze śluzu, rozetrzeć skórę flanelą, skrapiać zimną wodą piersi, twarz i brzuch, drażnić piórkiem nos, gardziel i krtani, dla wywołania odruchów, gorąca wanna, wdmuchiwanie powietrza.

## Warunki przyjmowania chorych obłąkanych do zakładów publicznych lub prywatnych.

Według §. 273 ust. cyw. za obłąkanego lub głupkowatego ten tylko uznany być może, który za takiego sądownie, po dokładnem zbadaniu zachowania się jego przez wyznaczonych do tego przez sąd lekarzy, uznanym zostanie. W przypadku takim postanowienie sądu do publicznej wiadomości podane być powinno. Sąd w tym razie ustanawia kuratora (§. 269).

Zakłady dla obłąkanych są prywatne albo publiczne. Do prywatnych, zakładanych jedynie za pozwoleniem politycznej władzy krajowej, przyjmowani być mogą chorzy, tylko na podstawie świadectwa lekarskiego, potwierdzającego istniejącą chorobę umysłową. Świadectwo to musi być wystawione przez lekarza powiatowego lub gminnego miejsca pobytu chorego, lub gdyby przez innego lekarza było wystawione, musi być potwierdzone przez lekarza powiatowego lub gminnego i wygotowane najpóźniej w 14 dniu przed wniesieniem prośby o przyjęcie. Jeżeli chory był poprzednio w kuracyi lekarskiej, dodaną być musi historia choroby, skreślona przez lekarza ordynującego. Chorzy, których władza bezpieczeństwa z powodu zagrażającego ogółowi bezpieczeństwa do zakładu prywatnego oddać jest zniewoloną, mają być przyjęci na podstawie świadectwa wystawionego przez lekarza, którym ta władza rozperządza. Lekarz kierujący zakładem ma o przyjęciu chorego w przeciągu 24 godzin donieść trybunałowi pierwszej instancji, w którego okręgu zakład się znajduje, z prośbą o potwierdzenie odbioru doniesienia. Doniesienie to wtedy tylko ma być zaniechane, jeżeli nie ma wątpliwości, że chory jeszcze pozostaje pod władzą ojcowską. Jeżeli taki chory podczas pobytu swego w zakładzie dojdzie do 24 roku życia, należy o tem, wyszczególniając stosunki jego osobiste, donieść trybunałowi pierwszej instancji. Tosamo ma nastąpić, jeżeli zajdą okoliczności, które pociągają za sobą zmianę osoby prawnego zastępcy, a sąd opiekuńczy lub kuratelarny zkażąd o tych okolicznościach nie wie. Osoby umieszczone w prywatnych zakładach dla obłąkanych, które uważać należy za wyleczone, mają być z zakładu wypuszczone, po porozumieniu z temi osobami, które prosiły



o przyjęcie chorego do zakładu, albo w miejsce tychże pieczę nad chorym przyjęły. Także chorzy nieuleczalni nie mogą być w zakładzie dłużej zatrzymywani, jeżeli ich wypuszczenia żądają krewni, lub ich prawni zastępcy. Chorzy niewyleczalni mogą być oddani tylko swym prawnym zastępcą, lub osobom przez tychże wskazanym. Jeżeli z zakładu będą wypuszczone osoby, które władza bezpieczeństwa oddała z powodu grożącego ogółowi niebezpieczeństwa, poprzednio o wypuszczeniu tę władzę należy zawiadomić. Taksamo należy postąpić w razie uwolnienia osób takich na próbę. O wypuszczeniu chorych wyleczonych zostających pod kuratelą należy odnośny sąd zawiadomić.

Zakłady publiczne dla obłąkanych rządzą się własnymi statutami, które muszą być potwierdzone przez ministra spraw wewnętrznych, Zakłady publiczne dla obłąkanych mają czynić doniesienia wyżej wymienione do tychże władz sądowych. Gminy a w szczególności ich organa lekarskie są obowiązane utrzymywać w naocznosci tych obłąkanych, którzy nie są umieszczeni w domach obłąkanych i czuwać nad pielęgowaniem tychże. Chorych na umyśle, którzy nie pozostają pod władzą ojcowską lub opiekuńczą, mają gminy w celu dalszego zarządzenia wskazać temu trybunałowi, do którego okręgu są wcielone. Władze sądowe są obowiązane o ustanowieniu opiekuna i kuratorów dla umysłowo chorych, znajdujących się w zakładach dla obłąkanych zawiadomić te zakłady. (Dz. p. p. z r. 1874. L. 71).

**Przyjmowanie do Kulparkowa i wydalenie.** (Tożsamo stosuje się i do Szpitala św. Łazarza w Krakowie). Chorych przyjmuje do zakładu dyrektor na żądanie stron lub władzy bezpieczeństwa. Aby chory mógł być przyjęty, należy dyrektorowi przedłożyć: Świadeństwo władzy miejscowej z wymienieniem stosunków rodzinnych i majątkowych chorego, a także historią choroby, sporządzoną przez lekarza i poświadczoną przez fizyka powiatowego. Jeżeli oddaje władza bezpieczeństwa, to powinna wymienić fakty. Jeżeli chory ma leczyć się własnym kosztem, to należy jeszcze dołączyć pisemne zobowiązanie się tej osoby, która ma spłatę uiszczać. Chorzy winni być oddani do zakładu należyście odziani.

Dyrektor zakładu do 24 godzin powinien donieść o przyjęciu chorego trybunałowi pierwszej instancji.

O zamierzonym wydaleniu chorych wyleczonych, lub nieuleczalnych nie zagrażających publicznemu bezpieczeństwu lub obyczajności i o terminie wydalenia, powinien dyrektor zakładu zawiadomić rodzinę lub prawnego zastępcę, urząd gminy, do której chory jest przynależny, władzę opiekuńczą, jeżeli pod tą władzą zostaje i władzę bezpieczeństwa, jeżeli ona oddała chorego do zakładu ze względów policyjnych.

Przy odbieraniu chorego niewyleczonego, odbierający powinien złożyć dyrektorowi: przyzwolenie władzy opiekuńczej, przyzwolenie gminy, w której chory ma mieszkać i pisemne zobowiązanie się do dalszego pielęgnowania chorego. (Dz. u. k. 1876. I5 Lutego. Nr 6).

# ROZBIÓR CHEMICZNY MOCZU.

## A. Badanie fizycznych własności.

Własność	Zmiany jakim ulega	Przyczyna
Barwa	<p>winowo-żółta; zmienia się na:</p> $\left\{ \begin{array}{l} \text{jasno-słomkowa} \\ \text{cisawo-win.-żółta} \\ \text{krwawo-czerwona} \\ \text{pomarańcz.-żółta} \\ \text{cisawo-czerwona} \\ \text{brunatna} \end{array} \right.$	<p>nadmierna ilość wody Urobilina barwik krwi barwiki żółci kwas chryzofanowy kwas karbolowy</p>
Oddziaływanie	<p>kwaśne; może być alkaliczne (obojętne): przy odparowaniu staje się: <math>\left\{ \begin{array}{l} \text{kwaśne} \\ \text{silniej} \\ \text{alkaliczne} \end{array} \right.</math></p>	<p>węglan amonowy węglan sodowy</p>
Ciężar gątownkowy	<p>od 1,015—1,023; zwiększa się skutkiem</p>	<p>wieksz. ilości: mocznika cukru</p>
Osad	<p>skąpy obłoczki z: <math>\left\{ \begin{array}{l} \text{przybłonków} \\ \text{śluzu w małej} \\ \text{ilości} \end{array} \right.</math></p>	<p>(patrz C.)</p>

## B. Badanie chemicznych własności.

S k ł a d n i k i		S p o s ó b b a d a n i a		O d d z i a ł y w a n i e	
Urochrom.		Do $\frac{1}{4}$ kieliszka kwasu siarkowego zgęszczonego nalewa się moczu odrazu		zabarwienie: różowo-brunatne brunatne	
Indoxyl Uroxanty- na, Indykan		Do $\frac{1}{2}$ kieliszka kwasu chlorowodowego zgęszczonego nalewa się moczu kroplami		zabarwienie: żółtawo-różowe niebiesko-fioletowe ciemno-niebieskie	
Mocznik		Oznaczenie ilościowe: w moczu zagęszcz. po dolaniu kw. azotow. zgęszczon.		osad krystaliczny: azotanu mocznika	
Kwas moczowy		Oznaczenie ilościowe: w moczu zawierającym więcej kw. moczowego, kw. azotowy zgęszczony		daje smugę: białą, rozlaną i wysoko umieszczoną	
Chlorki		Zakwasza się kw. azotowym i dodaje kroplę Azotanu srebrowego (1:8)		osad: biały serowaty kaskowaty obłoczkowaty	
Fosforany ziem.		Do $\frac{1}{2}$ kieliszka moczu dodaje się kilka kropli Amoniaku zgęszczonego		osad: krystaliczny + obfity	
Fosforany potasowców		Do $\frac{1}{2}$ kieliszka moczu dodaje się: Siarkanu magnowo-amonowego póki tworzy się		osad: żółtawy + obfity	
Siarkany		Do $\frac{1}{2}$ kieliszka moczu dodaje się: Chlorku baru z kw. chlorowodowym póki tworzy się		osad: białe ciężkie + obfity	



S p o s ó b b a d a n i a		Oddziaływanie
Białko	1) Do $\frac{2}{3}$ kieliszka moczu nalewa się po ściekanie kwasu azotowego zgęszczonego	1) smuga biała + gruba na granicy warstw.
	2) Po zagotowaniu i dodaniu kw. octow. rozcieńcz.	2) osad w kw. octowym nierozpuszczalny
Cukier	1) Po zagotowaniu z równą objętością zgęszcz. ługu potasow.	1) zbarwienie: żółto-brunatne
	2) " " z ługiem potas. i siarkan. miedzi	brunatno-czarne
Barwiki żółci	Do $\frac{1}{2}$ kieliszka kwasu chlorowod. zgęszcz. nalewa się moczu a następnie kw. azotowego kilka kropli na dno	2) osad czerwony pierścienie barwne zwłazcza zielony
Urobilina	Po dodaniu Amoniak i Chlorku cynku (uwzględnia się zabarw. moczu a niekiedy ubarwienie moczanów)	zabarwienie: żółte z zieloną fluorescencją
Barwik krwi Haemo- oxy-Methae- mo globino	Po zagotowaniu z ług potasowym (oddziaływ. dla białka, badan. mikroskop. próba spektral.)	osad fosforanów czerwono zabarwiony
Fosforan. wapn. za- sad.	Po zagotowaniu	osad w kw. węglowym rozpuszczalny, po potw. zagotowaniu się wydzielający
Węglan amonu	Przy zagotowaniu uchodzi Amoniak i	barwi zwilżony papier lakm. czerwony na niebiesko

Składniki	S p o s ó b b a d a n i a	Oddziaływanie
Kw. chryzofanowy (Senna, Rheum)	Po dodaniu Amoniaku	zabarwienie: ognisto-czerwone
Kwas karbolowy	Obok braku lub zmniejszonej ilości siarkanów Obok barwy moczu ciemno-brunatnej	badanie przekroju za- pomocą: chlorku żelaz- zow. odczynnika Mil- lona
Naftalina	Do paru kropli moczu dodaje się kilka kropli kwasu siarkowego zgęszczonego	zabarwienie: zielone
Balsam kopałwowy	1) Po zagotowaniu z kwasem chlorowodowym 2) Po dodaniu kw. azotowego (jak przy białku)	1) zabarw. czerwone 2) smuga różowa nie- co wyżej umieszczona
Jodek potasu	1) Po dodaniu kwasu azotowego 2) Z kleikiem skrobi i kwasem azotowym	1) zabarwienie brunatne i woi jodu 2) zabarw. niebieskie

## C. Badanie osadu drobnowidowe i chemiczne.

Składniki	K s z t a ł t	Własności chemiczne
Ciałka ropy	o charakterystycznych konturach	z ług. potas. lub Amoniakiem zmieniają się w masę galaretową
Ciałka krwi	o charakterystycznych konturach	z kw. octow. lodowatym i chlor. sodu dają: Haemine (kryształki Teichmanna)
Ciałka śluzu	małe ziarniste komórki o wyraźnych konturach	
Przybłonki	okrągłe i owalne drobne (kanaliki nerek) kształtu gruszkowatego (miednicz. nerk.) komórki przybł.: okrągłe wieloboczne, podłużne (pęcherz i moczowody) kuliste, ziarniste (cewka moc. i duo pęch.)	
Walczki	z kanalików nerek kształtu walcowatego ziarniste przezroczyste krwawe przybłonkowe woskowe	



Składniki	K s z t a ł t	Własności chemiczne
Kwas moczowy	kryształy pozrastane lub oddzielne + żółtawo zabarwione kształtu ośelek, rombów lub maczugowate	
Moczan sodow.-potas.	masa ziarnista bezpostaciowa	w ługu potasowym lub Amoniaku rozpuszczalne
Moczan amonowy	kryształy kuliste opatrzone czasem kolcami	
Szcawian wapniowy	kryształki drobne kształtu kopert listowych	w kw. octowym nierozpuszczalne
Fosforan magn.-amonowy	kryształy duże kształtu trumienkowatego	w kwasie octowym rozpuszczalne;
Fosforan wapniowy zasadowy	masa drobno-ziarnista	w ługu potas. lub amoniaku nie zmieniają się
Kulki tłuszczu	ciałka okrągłe silnie światło łamiące	w eterze rozpuszczalne
Mikroorganizmy	laseczniki, kokki, drożdże, sarcina	
Plemniki	nitki dość proste na jednym końcu zagięte, na drugim opatrzone główką	

Dr. Opieński.

## Kilka uwag o świadectwach lekarskich.

Nie ma zapewne dokumentu, któregooby tak nadużywano, jak świadectw lekarskich. Nadużyciom ze strony publiczności stara się zapobiedz okólnik c. k. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 14 Marca 1877 r. L. 8431, w myśl którego mają lekarze na każdym świadectwie podawać wyraźnie cel, w jakim takowe wydają. Przykro wyznać, że i ze strony lekarzy musiały się zdarzyć nadużycia z wydawaniem świadectw, skoro c. k. Namiestnictwo we Lwowie (w okólniku z dnia 31 Sierpnia 1889, L. 57489) uznało za stosowne wezwać wszystkich lekarzy i chirurgów „aby przy wydawaniu świadectw w ogóle, a dla celów wojskowości w szczególności postępowali nader ostrożnie i aby w tych świadectwach jedynie to poświadczali, „co jest zgodne z prawdą.“ Jak wynika z omowy tego okólnika dał jeden zwłaszcza przypadek powód do wydania rozporządzenia tej treści, która musi tak przykro dotyczyć wszystkich lekarzy, zwracając im uwagę na sumienne pełnienie obowiązków. Lepiej nieraz uchylić się od wydania świadectwa, pamiętając, że „*scripta manent*“ aniżeli czynić zadość żądaniom publiczności, zwłaszcza, że jej wymagania są niejednokrotnie tego rodzaju, iż im lekarz nie może zadość uczynić bez widocznego wykroczenia poza obręb ścisłej nauki lekarskiej.

Świadectwa lekarskie wydawane osobom prywatnym (t. j. nie na żądanie władz) należy zaopatrywać w markę stemplową (50 centów). Wyjątki pod tym względem stanowią świadectwa szczepienia (względnie przebytej ospy) i świadectwa wydawane uczniom dla udowodnienia przeszkody w uczęszczaniu do szkoły lub kościoła, tudzież w złożeniu egzaminów w należyтым czasie (rozp. gubern. z dnia 29 Czerwca 1834 L. gub. 39736 i obwieszczenie gubern. z dnia 4 Grudnia 1844 L. gub. 75852).

Świadectwa stwierdzające istnienie choroby umysłowej i potrzebę umieszczenia w jednym z krajowych zakładów dla umysłowo chorych, mogą wydawać jedynie c. k. lekarze powiatowi i fizycy miasta Lwowa i Krakowa (§ 14 statutu co do przyjmowania chorych do zakładów dla umysłowo chorych).

Co do świadectw sądowo-lekarskich (t. z. *visa et reperta*) istnieją wprawdzie przepisy objęte uwiadomieniem gubernialnem z dnia 27 marca 1827 L. gub. 14611; te jednak uchyla po największej części ustawa o postępowaniu karnem obecnie obowiązująca. — Ustawodawstwo austriackie późniejsze nie zawiera szczegółowych przepisów co do formy tych świadectw, lecz mając na oku ich cel, uwzględniając zwyczaj pod tym względem istniejący a zwłaszcza czyniąc zadość wymaganiom tak ustawy karnej jakoteż ustawy o postępowaniu w sprawach karnych, pisuje się je powszechnie podobnie, jak protokoły oględzin sądowo-lekarskich. — Według tego składa się świadectwo sądowo-lekarskie z trzech części. Pierwsza obejmuje imię i nazwisko, wiek, stan i miejsce zamieszkania osoby badanej; wzmianka

o miejscu, gdzie się badanie odbywa, jest również nieraz pożądaną. W części tej zestawia się w miarę potrzeby w streszczeniu lub wyczerpująco podania samej osoby badać się mającej, względnie osób otaczających (które wymienić należy), co miewa miejsce przy badaniach osób nieletnich, nieprzytomnych lub dotkniętych chorobą umysłową. W ostatnim razie ta część świadectwa może mieć największe znaczenie zwłaszcza, że niejednokrotnie pisze się świadectwo na podstawie jednorazowej obserwacji tak, że dopiero podania osób otaczających dają podstawę do orzeczenia. W tej części wyszczególnić należy objawy podmiotowe.

Drugą część świadectwa, którą rozpoczyna się zazwyczaj wyrazami: „Badanie dokonane w dniu dzisiejszym wykazuje:“ dzieli się w miarę potrzeby na ustępy, oznaczone liczbami porządkowymi lub literami tak, aby się na nie w orzeczeniu powołać można.

W tej części świadectwa mieści się o ile możliwości wyczerpujący a zwięzły wynik badania przedmiotowego, w którym w przypadkach uszkodzeń ciała nie należy się ograniczać do dokładnego opisu śladów obrażeń z osobna, lecz odpowiedniem jest uczynić uwagę co do budowy ciała, stanu odżywienia, wrodzonych lub nabytych nieprawidłowości tudzież przemijających stanów fizjologicznych, zwłaszcza ciąży i jej okresu. Odpowiedniem jest również zaznaczyć w tem miejscu i wynik badania ujemnego pewnych narządów, zwłaszcza, gdy podania osoby badanej wskazują na istnienie objawów podmiotowych: w końcu należy uczynić uwagę co do stanu ogólnego osoby badanej. Jeżeli świadectwo jest wynikiem kilkakrotnej obserwacji, jest odpowiedniem zestawień wynik poszczególnych badań z osobna, aby czytającemu dać o ile możliwości dokładny obraz przebiegu, unikając przytem wyrażen, które stanowią rozpoznanie.

Trzecią część świadectwa stanowi orzeczenie, którego treść zależy od celu, w jakim się świadectwo wydaje. Tutaj mieści się przede wszystkim rozpoznanie a nadto w przypadkach uszkodzeń ciała ocenienie sądowolekarskie, jak tego wymaga § 129 p. k. „.... lekarze orzec mają w szczególności, które ze znalezionych obrażeń ciała lub nadwyrężeń zdrowia same przez się lub w połączeniu z innemi, bezwzględnie lub ze względu na szczególne okoliczności przypadku, uważać należy za lekkie, ciężkie lub dla życia niebezpieczne; jakie skutki uszkodzenia takie zwykłe za sobą pociągają, i jakie w danym przypadku zdań nastąpiły, tudzież, jakimi środkami albo narzedziami i w jaki sposób zadane były. Zbyteczna nadmieniać, że do odpowiedniego ocenienia uszkodzeń ciała trzeba gruntownej znajomości §§ ustawy karnej, odnoszących się do obrażeń ciała, orzeczenia te bowiem nie są tylko lekarskimi lecz sądowolekarskimi: mają uwzględniać pojęcia prawnicze dla nauki lekarskiej obce i tylko w takim razie mogą zadowolić sędziego.



# Świadeetwo sądowo-lekarskie. +) ++)

Stempel  
50 et,

Kazimierz Mazur, lat 38 liczący, rolnik z Łobzowa, żonaty, podaje, że dnia 14-go Września r. b. doznał w Łobzowie pobicia przez Piotra Mosala i Jana Prusaka obu z Czarnej Wsi, z których pierwszy ugodził go grubym kijem w głowę, drugi obuchem kopaczki w przedramię lewe, poczem obaj obaliwszy go na ziemię, kopali nogami obutymi po bokach klatki piersiowej tak, że wskutek odniesionych obrażeń jest niezdolnym do pracy.

Badanie dokonane w dniu dzisiejszym wykazuje:

1. U mężczyzny dobrze zbudowanego i miernie odżywionego (z wyraźną liniową bladą blizną na licu prawem), na czole po stronie lewej od guza czołowego ku granicy porostu włosów w pionie guza czołowego ranę długości 3 cm. rozwartą na 6 mm., prostopadle przebiegającą. Brzegi rany równe, dno strzępiaste, badanie zgłębnikiem okazuje, że rana przenika skórę, lecz nie obnaża kości, okolica rany miernie obrzmiała. (Ranę wyczyszczono i opatrzone).

2. Powieka górna oka lewego okazuje mierny obrzęk i zasinienie, dolna nieznacznie zasiniała.

3. Na klatce piersiowej po stronie prawej w linii pachowej przedniej widać na wysokości 6-go i 9-go żebra po jednym sińcu rozmiarów talara; badanie nie wykazuje w tych miejscach nieprawidłowej ruchomości żeber ani chrupotania, wypuk i przysłuch prawidłowy.

4. Mniejszy sińiec widać na klatce piersiowej po stronie lewej w wysokości 8-go żebra i tutaj nie wykazuje badanie nieprawidłowej ruchomości żebra, ani zboczeń w wypuku lub przysłuchu.

5. W dolnej trzeciej części przedramienia lewego, które badany prawą ręką podtrzymuje, widać po stronie zewnętrznej zasinienie rozmiarów 4 centów, okolica tegoż miernie obrzmiała. Badanie wykazuje w tem miejscu nieprawidłową ruchomość w przebiegu kości łokciowej i wyraźne chrupotanie odłamków, przyczem badany doznaje znacznego bólu. Tak przy ruchach biernych jak zwłaszcza czynnych, uskarża się na ból.

6. Zresztą badanie nie wykazuje innych śladów obrażeń, ciepłota ciała prawidłowa (37,3<sub>0</sub> C.), tętno 78.

\*) Powyższy napis czyni już zbędnem wymienianie celu świadeetwa, jak tego żąda okólnik c. k. Namiestnictwa.

\*\*) W przypadkach zbrodni (ciężkich uszkodzeń, zgwałceń i t. p.) jest lekarz obowiązany uczynić doniesienie w myśl § 359 u. k. Doniesienia takie (bez stempla) pisane przez lekarzy mogą być poparte świadeetwem lekarskiem w takim razie również bez stempla. (Orzeczenie c. k. krajowej Dyrekeyi Skarbu z dnia 9-go Lipca 1887, L. 40492).

## ORZECZENIE.

Rana opisana pod 1) taksamo jak i zmiana pod 2) mogą pochodzić od uderzenia kijem w głowę, sińce na klatce piersiowej od kopnięć, obrażenie zaś przedramienia lewego a mianowicie złamanie kości łokciowej lewej od silnego uderzenia obuchem kopaczki tak, jak to badany twierdzi. Obrażenia pod 1 i 2 jakoteż pod 3 i 4 opisane stanowią tak z osobna, jakoteż razem lekkie uszkodzenia ciała i sprrowadzają upośledzenie zdrowia przez dni 6 do 8 niezdolność do pracy zawodowej o kilka dni krócej trwającej. Obrażenie pod 5 opisane t. j. złamanie kości łokciowej lewej, stanowi samo przez się obrażenie ciała ciężkie, sprowadza bowiem upośledzenie zdrowia i niezdolność do pracy zawodowej przez więcej niż 20 dni. Czy niezdolność do pracy zawodowej i upośledzenie zdrowia wskutek odniesionego złamania kości nie potrwać w tym przypadku przez więcej niż 30 dni, ocenić będzie można dopiero po zdjęciu opatrunku ustalającego, który badanemu właśnie założono, t. j. po upływie trzech tygodni.

Co niniejszem, jako zgodne z zasadami nauki lekarskiej....  
Kraków, dnia 16 Września 189... Dr N. N.

## O sądowych oględzinach i sekcyach zwłok

mieszczą się wszystkie przepisy w rozporządzeniu Ministerstwa spraw wewnętrznych i sprawiedliwości z dnia 28 Stycznia 1885. Dz. u. p. Nr. 26; większe lub mniejsze wyjątki z tego rozporządzenia znajdują się w zwykłe używanych podręcznikach o postępowaniu w sprawach karnych. Ponieważ rozporządzenie to jest tak obszernem, że go tutaj w całej rozciągłości podawać nie możemy, przeto odsyłamy ciekawych do Zbioru ustaw i rozporządzeń zdrowotnych dra Olpińskiego (Tom I str. 284 do 351) tutaj zaś nadmieniamy tylko, że rozporządzenie to wyczerpuje wszystko, co tylko lekarzy obchodzić może tak co do formy, jakoteż co do poszczególnych czynności i porządku sekcyj. Poznanie treści tego rozporządzenia jest bardzo pożytecznem, zwłaszcza, że często zdarzają się przy sekcyach niedokładności, które udaremniają wyniki dochodzeń.\*)

Szemat protokołu sekcyjnego osoby dorosłej przedstawia się mniej więcej jak następuje: (opisanie odzieży następuje przed oględzinami zwłok § 31 rozp. ministryalne).

\*) Pomimo wyraźnego przepisu ustawy co do sposobu zaopatrywania wnętrzości, które się przesyła do rozbioru chemicznego, otrzymują chemicy takowe prawie zawsze w słojach zawiązanych pęcherzami. Rzecz naturalna, że gdy pęcherz zgnije, a dzieje się to nader rychło, wylewa się wszystko ze słoja do opakowania n. p. trocin, siana, tak, że badanie jest przez to utrudnionem a wynik jego może być nawet wątpliwym.

A. *Oględziny zewnętrzne.* 1. Zwłoki mężczyzny lat .... zbudowanego .... odżywionego .... 2. Długość zwłok .... zabarwienie skóry .... Steżenie trupie ....; plamy trupie znajdują się na .... barwy .... przez nacięcie stwierdzone. 4. Włosy na głowie .... na brodzie. 5. Twarz zwłok .... oczy .... gałki oczne .... źrenice .... tęczęwki ....; otwory i małżowiny uszne .... z ust i nosa wydobywa się ....; jama ust zawiera .... zęby .... język .... 6. Szyja ....; klatka piersiowa ....; brzuch ....; odnogi .... palce .... grzbiet .... części płciowe .... (tu należy opisać dokładnie ślady obrażeń znalezione na poszczególnych częściach, z których każdy można oznaczyć literami alfabetu).

7. Zreszta po dokładnem obejrzeniu zwłok nie zauważono innych śladów.

B. *Oględziny wewnętrzne.* (Sekcja wykonywa się w porządku anatomicznym, jedynie regulamin pruski (z d. <sup>13</sup>/<sub>2</sub> 1875) zaleca w przypadkach podejrzenia o otrucie badać najprzód trzewa brzuszne). 8. Powłoki czaszkowe miękkie ... 9. Sklepienie czaszki .... grubość kości .... 10. Opona twarda .... zatoka podłużna ... 11. Opony miękkie .... zwoje mózgowe .... 12. Zbitość mózgu .... istota korowa .... biała na rozkroju .... komórki mózgowe .... zwoje wielkie .... sploty żyłne .... mózdzek .... rdzeń przedłużony .... komórka 4-ta .... naczynia na podstawie mózgu .... 13. Opona na podstawie .... zatoki podstawowe .... podstawa czaszki po odjęciu opony twardej .... 14. Jamy bębenkowe .... 15. Krtani i tchawica (otwarte in situ) .... mięśnie szyi .... język .... nagłośnia .... przełyk .... gardziel .... 16. Powłoki klatki piersiowej .... brzucha .... mięśni .... 17. Przepona sięga po stronie prawej .... lewej .... (W przypadkach sekcji noworodków). 18. Śródpierście przodowe .... ułożenie trzew .... 19. Osierdzie .... serce .... komórki .... przedsionki .... zastawki żyłne .... naczynia wieńcowe .... mięsień sercowy .... 20. Krew barwy .... 21. Tętnice główne .... naczynia na szyji .... 22. Płuca .... opłucne .... pod opłucniami .... miąższ płuc .... na rozkroju płuco lewe ... oskrzela .... płuco prawe .... jamy opłucnowe zawierają .... opłucna ścienna .... 23. Dolna część gardziela .... tętnica główna część (zstępująca i piersiowa) .... 24. Tkanka śródpierścia tylnego .... 25. Jama brzuszna zawiera .... otrzewna trzewiowa .... ścienna .... krezka .... gruczoły krezkowe .... 26. Żóładek .... (w przypadkach podejrzenia o otrucie należy podwiązać u wpustu i odźwiernika) powierzchnia zewnętrzna żóładka .... po otwarciu .... treść .... w ilości .... barwy ... zawiera .... wydaje woń .... błona śluzowa .... 27. Wątrobę rozmiarów .... torebka .... na rozkroju miąższ .... 28. Pęcherzyk żółciowy .... żółć .... 29. Śledziona rozmiarów .... torebka .... miąższ .... 30. Trzustka .... 31. Dwunastnica zawiera .... błona śluzowa .... 32. Jelita cienkie .... powierzchnia otrzewnowa .... treść .... błona śluzowa .... 33. Jelito grube .... 34. Tkanka otrzewnowa .... 35. Nerki rozmiarów .... torebki .... istota korowa .... piramidy .... miedniczki .... moczowody .... 36. Pęcherz moczowy zawiera .... mocz barwy .... (w przypadkach otrucia bywa wskazanem odprowadzić mocz czystym cewnikiem do osobnego naczynia); błona śluzowa .... 37. Gruczoł krokowy .... pęcherzyki



nasienne .... 38. Odbytница ... 39. Po wyjęciu wszystkich trzew okazują żebra ... uszkodzone ... kręgosłup ... kości miednicy ... 40. Kości odnóg ... 41. Nacięcia tkanek na nogach wykazują ... 42. (Tylko w razie potrzeby). Po otwarciu przewodu rdzeniowego okazuje opona twarda rdzenia w wysokości kręgu ... opony miękkie ... rdzeń ..

W przypadkach sekcji zwłok noworodków należy nadto uwzględniać, cechy donoszenia: długość zwłok (wyrażona w centymetrach, podzielona przez 5, wskazuje miesiąc życia płodowego w drugiej połowie ciąży. Płody donoszone męskie 49—53 cm., żeńskie 47—51 cm.) wymiary główki, barków, stau i rozmiary ciemion, chrząstki nosa i uszu, stan paznogi, włosy na głowie, stan jąder (u płodów męskich donoszonych oba jądra w mosznach); rozmiary jąder kostnych w dolnych nasadach kości udowych, lub rozmiary ich w kościach skokowych, wreszcie stan pępownicy. W tych przypadkach nadto wykonywa się t. z. próby życiowe (płucową, żołądkową, jelitową, uszną itd.).

Orzeczenie wydaje się najczęściej bezpośrednio po sekcji, wolno jednak, a nieraz nawet okazuje się koniecznem, wstrzymać się z orzeczeniem aż do przesłuchania świadków. Co do orzeczeń sądowo-lekarskich w przypadkach śmierci obowiązuje § 129 u. k.: „Zdanie wypowiadać powinno, co było w danym przypadku najbliższą przyczyną śmierci i co tę przyczynę wywołało. Jeżeli spostrzega się obrażenia, orzec należy w szczególności: 1. czy takowe zadane były zmarłemu czynem osoby drugiej, a w razie potwierdzenia tego pytania, 2. czy czyn ten spowodził śmierć a) już ze swej natury w ogólności; b) lub z powodu właściwego ustroju osobistego, albo z powodu szczególnego stanu obrażonego; c) z powodu okoliczności przypadkowych, wśród których został spełniony; albo d) z powodu przyczyn pośrednich, które przypadkiem nastąpiły, lecz czynem samym były wywołane lub z niego wynikły i czy wreszcie e) śmierci mogła była zapobiedz wczesna i odpowiednia pomoc lekarska.“

W przypadkach dochodzeń z powodu podejrzenia o dzieciobójstwo mają lekarze orzec nadto, czy dziecko urodziło się żywe (Ustawa o postępowaniu karn.). Pytanie co do zdolności do życia noworodka, które mieściło się w dawnej ustawie o p. k. wykreślono słusznie w ustawie obecnie obowiązującej, pomimo tego pojawia się ono dosyć często w ustach sędziów śledczych, lekarze jednak mogą się uchylić od dania odpowiedzi w tym kierunku.



# NACZELNE WŁADZE SANITARNE.

*Przy ministerstwie spraw wewn.*

Dr Kusy Emanuel, c. k. Radca ministeryalny.

## NAJWYŻSZA RADA ZDROWIA

(K. k. oberster Sanitätsrath).

na 3-lecie 1891—1894.

*Przewodniczący:*

Hofmann Edw., Rad. dw. Prof. Dr.

*Zastępca przewodniczącego:*

Vogl. August, r. d. Prof.

*Członkowie zwyczajni:*

Prof. Dr Albert Edw. r. d.  
Prof. Dr Böhm Karol r. d.  
Prof. Dr Braun Gustaw r. d.  
Prof. Dr Drasche Antoni r. d.  
Prof. Dr Gruber Maksymilian.  
Prof. Dr Kratschmer Floryan,  
l. szt.

Dr Kusy Eman. rad. min. j. w.  
Prof. Dr. Ludwig Ernest r. d.  
Prof. Dr Polansky Stan.  
Prof. Dr Weichselbaum Antoni.  
Prof. Dr Widerhofer Herman  
r. d.  
Dr Widersperg Gustaw

*Członkowie nadzwyczajni:*

Prof. Dr Gruber Franciszek.  
Dr Hellmann Alojzy (Aptekarz).  
Prof. Dr Inama-Sternegg Karol,  
sz. s.

Dr pr. Migerka Franc. r. m.  
Plappart August r. m.  
Dr Schlosser Teodor (Aptekarz).  
Waldhaim Antoni (Aptekarz).

## WŁADZE SANITARNE w GALICYI.

Departament sanitarny c. k. Namiestnictwa galic. we Lwowie.

Dr Merunowicz Józef, referent dla spraw sanitar.  
Dr Lachowicz Zdzisław, c. k. Konceptista sanitarny.  
Litich Aleksander, c. k. Konceptista sanitarny.  
Przydzielony: Dr Krokiewicz Antoni, lek. pow.

## C. K. KRAJOWA RADA ZDROWIA.

Skład i zakres takowej, jako ciała obradującego i doradczego, oznaczony jest ustawą z dnia 30 Kwietnia 1870 r. dz. ust. p. Nr. 68 o organizacyi publicznej służby zdrowia.

### *Przewodniczący:*

Czyżewicz Adam, Dr med. i mag. poł., c. k. prof. poł.  
i prym. szp. p. we Lwowie.

### *Zastępca przewodniczącego:*

Opolski Wiktor, Dr med., prym. szp. p. we Lwowie.

### *Członkowie:*

#### *a) ze strony Rządu:*

Cassina Ferdynand, Dr med., lek. pow. w Przemyślu.  
Czyżewicz Adam j. w.  
Merunowicz Józef j. w.  
Widman Oskar, Dr med. i chir., prym. szp. p.  
Rieger Zygmunt, Dr med.  
Opolski Wiktor j. w.

#### *b) ze strony Wydziału krajowego:*

Merezyński Emil, Dr med.  
Ziembicki Grzegórz, Dr med., oper. szp. p.





# SŁUŻBA ZDROWIA w GALICYI.

## Kraków.

Dr Bandrowski Jul., Rynek Nr 7 (dent.).  
Beck Adolf, Dietla 68 (2—4).  
Biesiadzki Ant., Garbarska 12.  
Blatteis Jakób, Krupnicza Nr 16; w lecie w Krynicy.  
Blatteis Stefan, Krupnicza 16.  
Bobbiewicz Henryk, Mały Rynek 3 (3—4).  
Borzęcki Eug., Floryańska 37.  
Bossowski Aleksander, Floryańska 35 (3—4).  
Braun Stanisław, Długa 5.  
Braunstein Fryderyk, Krakowska 25.  
Browicz Tadeusz, Krupnicza 5 (3—4).  
Buszek Jan, Fizyk miasta, Rynek A—B 39 (2—4).  
Buzdygan Mikołaj, Bracka 8 (3—4).  
Cercha Maks., Jagiellońska 11.  
Chmielecki Jul., Floryańska 49.  
Cholewicz Franciszek, ś. Jana 4 (3—4).  
Choróbski Stanisław, Szpital św. Łazarza (3—4).  
Czapliński Stanisław, Szpital św. Łazarza.  
Cybulski Napoleon, Szczepańska 11.  
Domański Stanisław, Szczepańska 9 (3—4).  
Dokowski Józef, Bracka 4 (9—1).  
Drobner Jak., Stradom 25 (1—3).  
Drożdż Bolesł., ś. Jana 11 (2—4).  
Eichhorn Ferd., Dietla 47.  
Filimowski Antoni, Grodzka 42 (2—4).

Dr Filipkiewicz Stef., Grodzka 7.  
Gabryszewski Antoni, Klinika chirurgiczna.  
Garbiński Kazim., Floryań. 30.  
Gawlikowski Stanisław, ś. Tomasz 27.  
Gluziński Władysław Antoni, Franciszkańska 1 (3—5).  
Gold Józef, Zielona 1 (3—4).  
Gwiazdomorski Jan, Łobzowska 32 (Dom zdrowia).  
Grabowski Kazim., Bracka 11.  
Habicht Kazim., Sławkows. 15.  
Haim Leopold, Krakowska 17.  
Halban Leon, Podwale 10.  
Harajewicz Jan, Szpital św. Łazarza.  
Harajewicz Władysław, Podwale 14 (2—4).  
Hirsch Herman, Jasna 4.  
Hyżycki Stan., Szews. 6 (3—4).  
Jakubowski Maciej Leon, Podwale 10 (3—4).  
Jaworski Walery, Sławkowska 31 (4—6).  
Jordan Henryk, Wiślna 5 (3—4).  
Junger Jak., Krakowsk. 7 (2—4).  
Jurowicz Izidor, Stradom 17.  
Kaden Kazimierz, Kolejowa 1 (3—4).  
Karpiński Stan., Kopernika 12.  
Kaufmann Mich., Grodzka 32.  
Kirschner Aron, Dietla 55.  
Kohn Maksymil., Floryańska 19 (3—4).  
Komorowski Bolesław, Zwierzyniec 24.  
Kopff Leon, Szczepańs. 1 (3—4); w lecie w Krynicy.  
Korczyński Edward, ś. Krzyża 5 (3—5).  
Korczyński Ludomił, Klinika.

Dr Kosiński Leopold Szp. ś. Lud.  
 Koźmiński Franciszek, Szpi-  
 tal ś. Łazarza (3—4).  
 Koy Stan., Floryańska 3 (3—4).  
 Kozłowski Bron., Kl. chirurg.  
 Kozłowski Sykstus.  
 Kramarzyński Karol, Mały Ry-  
 nek 6 (3—4).  
 Krasowski Stan., Klin. Chir.  
 Krongold Wilh., Dietla 49.  
 Kryński Leon, Klinika chir.  
 Krzyształowicz Stanisł., Basz-  
 towa 9.  
 Kuźniar Win., Krowoderska.  
 Kwaśnicki August, Basztowa  
 4 (3—4).  
 Lange Adam, Garbarsk. 5 (3—4)  
 Lustgarten Ludw., Grodz. 62  
 Lustig Samuel, Krakowska 35.  
 Łazarski Józef, Grodzka 62.  
 Lępkowski Wincenty, Stra-  
 szewskiego 27 (dentysta).  
 Mađurowicz Maurycy, Bracka  
 6 (3—4).  
 Majer Józef, Krupnicza 9.  
 Malinowski Gustaw, Staro-  
 wiślna 15.  
 Marcisiewicz Feliks, Wiślna  
 10 (3—5).  
 Mars Ant., Szpitalna 19 (2—4).  
 Maczka Tomasz, Floryańska  
 24 (2—4).  
 Madejski Bol., Szewska 7.  
 Mayzel Tadeusz, ś. Gertrudy  
 8 (3—4).  
 Mendelsburg H., Szewska 21.  
 Milewski Tad., Mały Rynek 1.  
 Momidłowski Stanisław.  
 Münz Emil, Grodzka 69.  
 Murdzieński Franciszek, Flo-  
 ryńska 53 (3—4).  
 Nycz Henryk.  
 Obaliński Alfred, Kolejowa  
 7 (3—4).  
 Oettinger Józef, Rynek głó-  
 wny 10 (3—5).  
 Olszewski Bronisław, Szpital-  
 na 20 (3—4).  
 Paleczny Bronisław, Szewska  
 12 (3—4).  
 Pareński Stanisław, ś. Jana  
 1 (3—4).

Dr Paszkowski Stanisław, ś. An-  
 ny 7 (3—4).  
 Piasecki Wenanty, Sławkow-  
 ska 31.  
 Piątkowski M., Floryńska 17.  
 Pieniążek Przemysław, Bracka  
 10 (3—5).  
 Piotrowski Edw., Mikołajska 5.  
 Pohorecki Władysław, Szpi-  
 tal ś. Łazarza.  
 Ponikło Stan., Bracka 5 (3—4).  
 Porebowski Ignacy, Sławkow-  
 ska 12 (2—4).  
 Puchacki Edmund, Sławkow-  
 ska 24.  
 Raczyński Jan, Szpital św.  
 Ludwika (3—4).  
 Radecki Paweł, Grodzka 39.  
 Regiec Jan Floryńska 39.  
 Rościszewski Erazm, Baszt. 26.  
 Rosenzweig Józef, Klinika.  
 Rosenberg Antoni, Kanon. 16.  
 Rosenblatt Emanuel, Basztowa  
 25 (3—4).  
 Rosner Aleksander, Rynek 21.  
 Rosner Antoni, Rynek 21 (3—5).  
 Rutkowski, Pawia 20.  
 Rutowski Klemens, Szewsk. 6.  
 Rydel Lucyan, Sławkowska  
 20 (10—12).  
 Rydygier Ludwik, Wielopole  
 4 (3—4).  
 Schaitter Ign., Grodz. 62 (3—4).  
 Schoengut Stefan, Wiślna 10.  
 Schuman Franciszek, Rynek 7.  
 Schneider Ludwik, Rynek Kle-  
 parski 2 (3—4).  
 Schwarz Albin, Sławkowska  
 8 (3—5) l. p.  
 Śeiborowski Wład., Francisz-  
 kańska 3 (3—4); w lecie  
 w Szczawnicy.  
 Siedlecki Jan, Rynek 45.  
 Skobel Stanisław, Rynek gł.  
 23 (3—5),  
 Skórczewski Bol., Batorego 24,  
 w lecie w Krynicy.  
 Skrzyński Stef., Szczepański  
 plac 7 (3—4).  
 Śliwiński Michał, Mały Rynek  
 4 (3—4).  
 Słapa Wilh., Kolejowa 4.

Dr Smorągiewicz Kazim., Szpital  
ś. Łazarza (3—4).  
Sokołowski Henr., Szewska 11  
(2—4).  
Spira Rafał, Dietla 62.  
Sroczyński Francisz., Klinika  
okulistyczna.  
Starachowicz Jan, Plac WW.  
SS. 10 (dentysta).  
Stopezański Aleksander, Ko-  
pernika, zakład chem.  
Surzycki Józef, Floryańska  
13 (3—4).  
Süsskind Albert, Stradom 18  
(3—4).  
Switalski Ludwik, Mikołajska  
7 (3—4).  
Szewczyk Józef, Franciszkań-  
ska 1.  
Szymkiewicz Kazim., Rynek  
gł. 26 (dentysta).  
Teichman Ludwik, Floryań-  
ska 53.  
Torczyński Teofil, Batorego 22.  
Trzebiński Rudolf, św. Anny  
4 (3—4).  
Tuszyński Ferd., pl. Szczep. 9.  
Tyszkiewicz Wincenty, Basz-  
towa 8.  
Wachholz Leon, ś. Anny 11.  
Walentowicz Andr., pl. Do-  
minikański 1.  
Wilkosz Aleksander, Mały Ry-  
nek 4 (3—4).  
Wiszniewski Ludw., Krupni-  
cza 5 (3—4).  
Wohlfeld Maur., Szp. ś. Łaz.  
Wojtaszek Jan, Wiślna 9.  
Zaremba Tomasz, Szewska 7  
(2—4); w lecie w Szczawnicy.  
Zarewicz Aleksander, Flory-  
ańska 40 (2—4).  
Zieleniewski Michał, Szpital-  
na 32.  
Ziembicki Jan, Sławk. 21.  
Zoll Józef, Kolejowa 7.  
Żuławski Karol, Długa 82.  
Jan Dłużynski, dentysta, Flory-  
ańska 12 (9—1, 3—5).  
Drd Hrebenda Władysław, le-  
karz - dentysta Szpitalna 17  
(9—1, 2—5).

Drd Łukaszewicz Karol, Sław-  
kowska 16 (9—1, 3—5).  
H. Matuszewski, dentysta-tech-  
nik, plac Dominikański 3.  
Dr Szymkiewicz Kazimierz, Ry-  
nek gł. 26 (9—1, 3—5).  
Dr Starachowicz Jan, plac WW.  
ŚS. 10, lekarz-dentysta.

### Lwów.

Dr Aschkenazy Zygmunt, Cho-  
rażczyzna 11 (w lec. Krynica).  
Auerbach Emanuel, Skarbk. 2.  
Barański Antoni, prof. szkoły  
weter. Chorażczyzna 24.  
Barącz Roman, Teatralna 11.  
Beręzowski Kazimierz, sek.  
w zakł. w. ul. Kaźm. 37.  
Berthlef Karol, pl. ś. Ducha 3.  
Bett Maks., Skarbkowska 3.  
Błotnicki Teod., pl. Smolki 3.  
Bogdański Wład., Blachars. 1.  
Bory Julian.  
Bylicki Wład., Kościuszki 7.  
Chadzyński Jan, pr. sz. p.  
Kopernika 3.  
Chomin Ant., Zimorowicza 3.  
Czerkawski Julian, Francisz-  
kańska 9.  
Czerkawski Stanisł., Piekar. 8.  
Czyżewicz Ad., pr. sz. r. z.  
Cłowa 2.  
Dębiecki Kl., plac Bernard. 13.  
Dekański Stan., Czarniecki. 4.  
Dobiński Włodz., Puławs. 1.  
Dubanowicz Paweł, Ormiań-  
ańska 33.  
Durst Adolf, Kaźmierz. 23.  
Ebers Henryk, w lecie w Kry-  
nicy, Janowska 16.  
Ehrlich Dawid, Grodecka 54.  
Elektrowicz Emil, Lwów l. m.,  
Łyczakowska 6.  
Feigel Longin, pros. sz. p., pl.  
Bernardyński 11.  
Festenburg Edward, Domini-  
kańska 11.  
Fiałkowski Lud., Syxtuska 13.  
Frankowski Walery, asys. Szp.  
krajow.  
Fuchs Franc., dentysta, plac  
Maryacki 9.



- Dr Gesang Bernard, Jagielloń. 2.  
 Gluziński Lesław, Wałowa 14.  
 Głowacki Bol., dyr. sz. p., Batorego 24.  
 Godlewski Kazimierz, Karola Ludw. 5.  
 Gołębiowski Karol, Szp. kraj.  
 Gońka Andrzej, dentysta, Kopernika 4.  
 Gostyński Józef, lekarz sądowy ul. Kościuszki 2.  
 Gussmann Izaak, em. lekarz wojsk. Żółkiewska 38.  
 Gross Karol, ul. Boimów 9.  
 Hellmann, ul. Jagiellońska 16.  
 Hoszard Franc., czł. W. kraj. Ossolińskich 4.  
 Jana Stan., Czarnieckiego 8.  
 Janda Franc., Pańska 25.  
 Jasiński Wł., c. k. radca rz. l. z. kar. Kurkowa 3.  
 Jendel Teodor, Trybunalska 1.  
 Kadyj Henryk, prof. sz. w. ul. Zielona 15.  
 Kicki Tytus, Kopernika 3.  
 Kilarski Józef, Rynek 35.  
 Kniaziolucki Zyg., Kopern. 15.  
 Kobylański Ant., Strzelecka 2.  
 Konarzewski Jan, Pańska 6.  
 Kosiński Franc., em. fiz. m. ul. Skarbkowska 37.  
 Kossak Leon, Wałowa 29.  
 Kozierowski Eugen.  
 Krobicki Tadeusz, l. m. Skarbkowska 2.  
 Krokiewicz Ant., Kopernika 8.  
 Krówezyński Ign., radca zdr. Lindego 7.  
 Krygowski Tadeusz, ulica 3ci Maja 10.  
 Krzyżanowski Franciszek, ul. Kaźmierzowska 39.  
 Kucharski Piotr, sek. szpitala dziec. Akademicka 24.  
 Kuhn Adolf, Szpital p.  
 Lachowicz Zdzisław, pl. Halicki 14.  
 Landau Salomon, Karola Ludwika 29.  
 Latainer Em., sek. szp. plac Maryacki 10.  
 Legeżyński Wiktor, 3ci Maja 10.
- Dr Lukas Ad., l. sąd. Blachar. 8.  
 Łopacki Ludw., l. m. Chorażczyzna 13.  
 Machek Em., Wałowa 4.  
 Mahl Jakób, Jagiell. 24.  
 Majewski Ad., l. z, hydr. Kąpielna 4.  
 Mehrer Henr., Jagiell. 13.  
 Meller Dawid, Jagiell. 6.  
 Merczyński Em., pr. s. d. Ossolińskich 10.  
 Merunowicz Józef, c. k. Protomedyk, Wałowa 31.  
 Mosing Kaz., Wałowa 13.  
 Mukowicz Edward, Szpital.  
 Nowiński Sewer., Sykstusk. 48.  
 Obtułowicz Ferdynand, Wałowa 7, l. p.  
 Opiński Jan, przy Namiestn.  
 Opolski Wiktor, pr. szp. p. rad. zdr. Wałowa 13.  
 Papée Jan.  
 Pawlikowski Ant., fiz. m. Chorażczyzna 2.  
 Piotrowski Gustaw, Akademicka 5.  
 Piotrowski Leon.  
 Pisek Wilh., Jagiell. 12.  
 Podlewski K., Sobieskiego 10.  
 Prus Jan, Kościuszki 7.  
 Rapp Leon, Piekarska 15.  
 Rapaport Józef, Karola Ludwika 31.  
 Reitzes D., Skarbkowska 27.  
 Rieger Zygmunt, rad. zdr. pl. Halicki 10.  
 Riwezes Filip, Kaźmierzowska 51.  
 Roicki Ant., Sokoła 1.  
 Rosenbusch L., Kopernika 14.  
 Rosenzweig Leo, Sykstuska 6.  
 Rosner Jan, Cłowa 2.  
 Rosner Ig., l. m., Sykstuska 14.  
 Rożański Józef, prym. szp. Sykstuska 36.  
 Sawicki Edward, prym. szp. Batorego 32.  
 Schmidt Edm., l. m., Akademicka 11.  
 Schram Hilary, Halicka 20.  
 Seifmann Piotr, dyr. sz. w.  
 Sielski Szczęs., Akademicka 8.

Dr Sieradzki Antoni, Chorążczy-  
zny 12 B.

Singer Menele, Krasickich 20.  
Skałkowski Wł., Teatralna 16.  
Skałkowski Bronisław, Pie-  
karska 4.

Smitowski Miecz., Sobieskie-  
go 7.

Snutny K., Chorążczyzna 14.  
Sobolewski Kaźm., sek. szp.  
Sochanik Stanisław.

Sochański J., Hetmańska 10.  
Sokal Mayer.

Stachiewicz Teofil, Plac Ma-  
ryacki 8.

Stahlberger Teod., Sobiesk. 9.  
Stark J., Karola Ludwika 37.  
Steinhaus Józef, em. lek. pow.,  
Kamińskiego 6.

Stella-Sawicki Jan, ins. szp.  
Kurnicka 13.

Strojnowski Edw., Plac Ma-  
ryacki 6 i 7.

Szuskiewicz Piotr, Chorąż-  
czyzny 18, lek. polic.

Świątkiewicz Mich., Ormiań-  
ska 29.

Szpilman Józef, doc. szk. wet.  
Sztembarth Celestyn, sek. szp.  
Batorego 26.

Szydłowski Zdzisław.

Taschmann Albert, Rynek 43.  
Tatareczuch Władysław, l. m.,  
Kołatąja 3.

Teodorowicz Tad., Ossoliń-  
skich 19.

Tomanek Józef, Teatralna 21.  
Tyszkowski Leon.

Urich Teofil, Jagiell. 2.

Uhma Czesław, Zielona 14.

Wachtel Ant., Wałowa 11.

Wagner Arnold, l. k. Koper-  
nika 10.

Wechsler Emil, Bernardyński  
plac 15.

Wehr Wiktor, Sykstuska 19.

Weigel Józef, Akademicka 22.

Weiss Adolf, Akademicka 3,  
(dentysta).

Wernicki Józ. Mickiewicza 3.

Wiczkowski Józef, chem. szp.  
p., Skarbowska 4.

Dr Widman Oskar, pr. szp., Gro-  
dziekich 2.

Wiktor Jan, l. m., plac Strze-  
lecki 2.

Willer Abr., Kazimierzow. 5.

Zakreys Franc., Grodecka 50.

Zavadil Teofil, Pańska 20.

Ziembicki Grzeg. syn, pr. szp.  
3 Maja 5.

Zion Oswald. Kościuszki 5.

C. Aderschlager Adolf, Kościel-  
na 1.

Beschloss Manisch v. Maksym.  
Żółkiewska 29.

Blaustein Edw., Skarbkw-  
ska 7.

Chilf Sam., Sobieski 13.

Dokupil Jan, Halicka 54.

Gabel Hil, Sobieskiego 24.

Gallasch Józef, Janowska 32.

Gasiorowski Juliusz, l. k.  
Dworzec.

Grabsheid Max, pl. Krakow-  
ski 19.

Haynrich Józef, Czackiego 6.

Knopf Salom., dom inwalid.

Krainer Eman., Krakowska 7.

Lateiner Jak., Żółkiewska 65.

Latainer Leon, Karol. Ludw. 31.

Letz Samuel, pl. Gołuchow-  
skich 15.

Isowski Maryan, dentysta pl.  
Trybunalski 1.

Madeyski Edw., ortoped. Pie-  
karska 21.

Mark Sal., Halicka 1.

Rosenkranz Maur., plac Ha-  
licki 13.

Szymonowicz Jan, Teatr. 23.

Weis Ign., Karola Ludw. 11.

Zawirski Konst., Halicka 34.

Zrogowski Jan Halicka 26.

W. Barański Ant., Prof. Dr.

Cielenkiewicz Woje.

Eppler. W. p.

Kadyi Henryk, Prof. Dr.

Kubicki Leon, w. m. Bat. 7.

Kretowicz Paweł, n. szk. w.

Kulczycki Włodzim.

Królikowski Stanisław.

Littich Aleks., W kraj.

Markowski Tomasz.

W. Miziura Andrzej.  
 Nowicki Józef.  
 Pilch Antoni.  
 Prus Jan Dr.  
 Seifman Piotr, Dyr. sz. w.  
 Szpilman Joz. Dr.

1. Pow. Bialski.

D. Bogdanik Józ., Biała pr. szp.  
 Kapelusz Eug., Biała l. szp.  
 Kwieciński Maciej, Biała.  
 Nycz Wincenty, Biała l. p.  
 Długolecki Ferd., Kęty l. p.  
 Dworzański Karol  
 Łucki Sas Julian, Oświęcim.  
 Marynowski Józef,  
 Schlank Maurycy „ l. k.  
 Slosarczyk Antoni,  
 C. Kupka Józef, Biała l. m.  
 Spelda Aleks.,  
 Kunz J., Wilamowice l. g.  
 W. Krwawiec B., Dr. Biała w. p.  
 Orzechowski M., Oświęcim.

2. Pow. Bobrecki.

D. Głowiński Winc., Bóbrka l. p.  
 Żukotyński Fr.,  
 C. Sochacki Fel., Chodorów.  
 Handt Izidor „ l. m.  
 Roth Wolf, Bóbrka.  
 Sternberg Bern., Strzeliska.  
 W. Łucki Joz., Bóbrka w. p.

3. Pow. Bocheński.

D. Bielański Gust., Bochnia l. p.  
 Fränkel J.  
 Górski Czesław, „ l. sal.  
 Nodzyński Bolesł., „ Sek. S.  
 Oświęcimski Sz., „ pr. sz.  
 Bartmański Ferdynand, Nie-  
 połomice l. m.  
 Piórko Ad., Niepołomice.  
 Dobruchowski Adam, Wiśnicz  
 l. domu karn.  
 C. Wieselmann Mor., Wiśnicz l. m.  
 W. Fertig Zygm., Bochnia w. p.

4. Pow. Bohorodczanski.

D. Męciński Konstanty, Boho-  
 rodeczany l. p.  
 Palester Henr., Bohorodeczany.  
 Feuerstein N., Słotwina l. sk.

C. Tumin Ad., Bohor. l. m.  
 W. Schwetter Feliks, Bohor.

5. Pow. Borszczowski.

D. Dorożyński Jak., Borsz. l. p.  
 Mosler Maks., Borszczów.  
 Jodłowski Jan, w Bilezu złot.  
 Kalinowicz Mikołaj, Korolów-  
 ka l. m.  
 Dawidowicz Emil, Mielnica.  
 Szujnowski Maryan, Skała.  
 Seidner Abraham, Skała.  
 C. Zahlik Joach., Jezierzany.  
 Poeller Herm., Skała l. m.  
 W. Rohr H., Borszczów w. p.

6. Pow. Brodzki.

D. Jendl - Sausenhofen Ignacy,  
 Brody l. p.  
 Goldhaber Paweł, Brody l. m.  
 Kalach Feliks, Brody.  
 Leiblinger Fel., Brody.  
 Mann Józ., Brody l. sz. izr.  
 Schapira Aleks., Brody l. sz.  
 Silbermann Edw.,  
 Sołtysik Stan., „ pr. sz.  
 Strumiński Adam,  
 Borzemski Eust., Łukawiec.  
 Madejski Wł., Pieniaki l. s.  
 Zaorski Bronisł., Podkamień.  
 Baczyński Eust., Załóżce l. m.  
 Borysiewicz Wiktor, Załóżce.  
 C. Grünfeld Iz., Brody l. m.  
 Leider Dawid, Toporów.  
 Nussbaum Melchior, Podka-  
 mień l. m.  
 Rager Izidor, Załóżce.  
 Rosenbaum Leon, Łopatyn l. m.  
 W. Harasymowicz Dyon., w. p.

7. Pow. Brzeski.

D. Pietrzycki Ant., Brzesko l. p.  
 Bernacki Franc.,  
 Bernadzikowski Sz.,  
 Łowczowski Wiktor, Czechów.  
 Palka Konrad, Radłów.  
 Michalik Józef, Szezurowa.  
 Kisielski Fr., Zakliczyn l. m.  
 Kluczyński Zbign.,  
 C. Czernek Henr., Wojn. l. m.  
 W. Kisiel Daniel, w. p.



## 8. Pow. Brzeżański.

- D. Skibicki Adam, lek. pow.  
 Teitelbaum Melech, Brzeżany.  
 Uranowicz Tadeusz, l. m.  
 Zauderer Albert, pr. szp.  
 Milerowicz Józ., Kozowa l. m.  
 Fleischmann Adolf, Kozowa.  
 C. Schenker E., Brzeż. sek. szp.  
 W. Langhaus Joz., w. p.

## 9. Pow. Brzozowski.

- D. Lic Henr., Brzozów l. p.  
 Ślaczka Ant., " l. m.  
 Gąsek Jan, Dynów.  
 Śnieżek Ludwik, Jasienica.

## 10. Pow. Buczacki.

- D. Hirschler Miecz., Buczacz l. p.  
 Krzyżanowski Edw., " l. m.  
 Nacht Fabiusz, "  
 Stokosiński Franc., Jazłowiec.  
 Koerner Ed., Monasterzyska.  
 Bobek Jan, Potok Złoty.  
 C. Mosler Mojżesz, Buczacz.  
 Feder Jak., Jazłowiec l. m.  
 Adler Szymon, Monaster. l. m.  
 W. Majkowski Bazyli, Buczacz  
 wet. pow.

## 11. Pow. Chrzanowski.

- D. Berggrün Alfr., Chrzanów l. p.  
 Klein Leon, " l. m.  
 Rieser "  
 Damski W., Jaworzno l. gór.  
 Dura Józef, Krzeszowice l. s.  
 Borelowski Wal., Siersza l. g.  
 Schneck Karol, Szczak. l. f.  
 Steinkeller Hen., Trzebin. l. m.  
 W. Ochnicz Michał, Chrzan. w. p.

## 12. Pow. Cieszanowski.

- D. Jabłoński Jac., Cieszan. l. p.  
 Jüngst Wacław.  
 Szymański Henryk.  
 Müldner Józef, Oleszyce.  
 C. Rotter As., Cieszanów l. m.  
 W. Serwacki Michał w. p.

## 13. Pow. Czortkowski.

- D. Wągrowski Karol, Czortków  
 l. p.

- D. Bubeniczek Franc., em. lek.  
 pułk. Czortków.

Stoekl Adolf, Czortków l. m.  
 Lutyński Ludw., Jagielnica l.  
 fabr.

- C. Oestersetzer Ad., Czortków.  
 W. Machalski, Czortków w. p.

## 14. Pow. Dąbrowski.

- D. Kramarzyński Mieczysł., Dą-  
 browa l. p.  
 Millet Abraham, Dąbrowa.  
 Ozimek Stanisław, "  
 Zaremba Ant., l. m. sąd.  
 Rudnicki Karol, Szczucin l. m.  
 Cymbler Walery, l. m. Żabno.  
 C. Kluczycki Wit., Mendrzechów  
 W. Szczerba Jan, Dąbrowa w. p.

## 15. Pow. Dobromiński.

- D. Bieńczowski Aleks., Dobro-  
 mil l. p.  
 Cwiklicer Ludw., Dobr. l. sal.  
 Puchalski Szczepan, Dobromil.  
 Bendel Samuel, Bircza l. m.  
 C. Brauner Leon, Dobrom. l. m.  
 W. Bardach Zach.

## 16. Pow. Doliniański.

- D. Peters Józef, Dolina l. p.  
 Kotłowski Stan., Dolina l. m.  
 Neschling Lazar, Bolechów.  
 Nowak Józef, Wygoda l. f.  
 Podlusiński Mikołaj, Bolechów  
 l. m. i kol.  
 Witoszyński Teofil, Różniatów.  
 C. Kujłowski Leon, Bolechów  
 l. sal.  
 Baumöhl Naf., Dolina 6.  
 W. Fedorowicz Włó. w. p.

## 17. Pow. Drohobycki.

- D. Janowski Ig., Drohobycz l. p.  
 Antoniewicz Włodzimierz,  
 Drohobycz l. m.  
 Friedmann Henr., Drohobycz.  
 Hofner Oskar, "  
 Jurkiewicz Kaźm., " l. s.  
 Lechowski Wik. "  
 Bermann Dawid, Borysław.  
 Löw Bernh., Borysław l. gór.  
 Penner Ignacy, Borysław.  
 Mayer Józef, Medenica.

- C. Reich Baruch, Drohobycz l. m.  
 Rosenöhl Joach. „ l. kol.  
 Kelhofer Sam., Borysł. l. m.  
 W. Gottlieb Aleks., Droh. w. p.  
 Chotiner Eleazar, Borysł. w. g.

18. Pow. Gorlicki.

- D. Wronski Bartł., Gorlice l. p.  
 Bielewicz Feliks, „  
 Frühling Marc., „  
 Grzybczyk Stan. „  
 Kretowicz Walenty „  
 Neumann Eugen. „  
 Przesmycki Jan „  
 Katyński Ludwik, Biecz.  
 Kukulski Antoni „  
 C. Koller Jerzy, Gorlice l. m.  
 W. Janowicz St. w p.

19. Pow. Grodecki.

- D. Danielski Jan, Gródek l. p.  
 Gawroński Aleksan., Gródek  
 l. m. i kol.  
 C. Landau Ad., Gródek.  
 Schöps Ignacy, Janów.  
 W. Ponicki Franc., Gródek w. p.

20. Pow. Grybowski.

- D. Kronenberg Karol, Grybów  
 l. p.  
 Jakubowski Adam, Grybów  
 l. m.  
 Mikołajski Stefan, Cieżkowice  
 l. m. i kol.

21. Pow. Horodeński.

- D. Schmidt Filip, Horodenka  
 as. san.  
 Jastrzębski Julian, „ l. m.  
 Roszkó Antoni, Horod. l. sz.  
 Bujalski Maryan, Obertyn.  
 Lukaszewicz Wal., Czernelica.  
 C. Burnatowicz Rom., Obertyn  
 l. m.  
 Kurzer Gustaw, Horod. l. m.  
 Landes Leon „  
 W. Skuciński Jan w. p.

22. Pow. Husiatyński.

- D. Frydmann Zeno, Husiatyn l. p.  
 Auerhahn Wilh. Chorostków.  
 Wilson Rysz., Kopeczyńce.

- C. Hladij Sz., Chorostk. l. m.  
 Margules Elias, Husiatyn.  
 Pomeranz Filip „  
 Rares Izydor, Husiatyn l. m.  
 Siebner Nath., Kopyczyńce  
 l. m.  
 Sobelsohn Dawid, Probuźna  
 l. m.  
 W. Gródecki Miecz., Husiat. w. p.

23. Pow. Jarosławski.

- D. Marynowski Miecz., Jarosław  
 l. pow.  
 Dietzius Adolf, Jarosław lek.  
 m. kol.  
 Friedwald Abr., Jarosław.  
 Meissels Zygm., Jarosław.  
 Plech Aur., Jarosł. em. l. p.  
 Richter Fryder., Jarosław.  
 Rossberger Sal. Jarosław.  
 Trzaskowski Bron., Jarosław.  
 Turzański Grzeg. l. m.  
 Jastrzębski Walery, Sieniawa.  
 C. Ackerbauer Schmerl., Jarosł.  
 Becher Salom., Jarosław.  
 Thalheim Joachim, Pruchnik  
 l. m.  
 Reiss Abr., Radymno l. m.  
 Morecki Pink., Sieniawa l. m.  
 W. Waśniewski Fr., Jarosł w. p.

24. Pow. Jasielski.

- D. Biesiadecki Jan, Jasło l. p.  
 Cieglewicz Stan. „  
 Hicner Aleks. „ l. m.  
 Friedberg Józ., Jasło as. san.  
 Kadyj Józef, Jasło s. sz.  
 Macudziński Wal., Jasło pr. sz.  
 Natter Wiktor, Frysztak.  
 Pawlicki Teod., Zmigród.  
 C. Spiegel Em., Frysztak l. m.  
 W. Pawlikiewicz Jan, Jasło w. p.

25. Pow. Jaworowski.

- D. Hordyński Andrzej, Jawo-  
 rów l. pow.  
 Gracka Józef, Krakowiec.  
 C. Bendel Zygm., Jaworów.  
 Gabel Rubin „  
 Piotrowski Ign., Wielkie Oczy.  
 W. Bernstein Józ., Jaworów w. p.

## 26. Pow. Kałuski.

- D. Wurst Adolf, Kałusz 1. p.  
 Kurowiec Jan " "  
 C. Kiczeles Herm., " 1. kol.  
 Finkelstein Maur. " 1. m.  
 Hand Leop., Wojniłów.  
 W. Nowak Jan, Kałusz w. p.

## 27. Pow. Kamionecki.

- D. Janiszewski Ant., Kamionka  
 as. san.  
 Stupnicki Wł., Kamionka 1. m.  
 Czerkawski Jul., Dziedziłów.  
 Prochaska Teofil, Busk.  
 Ciuk Aleks., Radziechów.  
 C. Raps Maks., Kamionka.  
 Siegelbaum Jakób, Busk.  
 Brand Jul., Radziechów.  
 W. Kwieciński Stanisław, w. p.

## 28. Pow. Kolbuszowski.

- D. Filewicz Jan, Kolbuszowa 1. p.  
 Billig El., " "  
 W. Marko Dymitr " w. p.

## 29. Pow. Kołomyjski.

- D. Rosner Maks., Kołomyja 1. p.  
 Głaczyński Wł., " pr. sz.  
 Goldhammer S. " "  
 Hulles Jakób " "  
 Jaworski Boleś " "  
 Kobryński Włod. " "  
 Orski Jan " "  
 Piaskiewicz Wł., " 1. m. i k.  
 Rosenheck Sal. " "  
 Silberstein Izidor " "  
 Sysak Gabryel " "  
 Steuermark " 1. pułk.  
 Schorsz Józ. " "  
 Morawski Mat., Gwoździec.  
 Vinzenz Al., Peczeniżyn.  
 C. Aleksandrowicz, Kołomyja.  
 Reder Eman., " "  
 Ternier Hersch " "  
 Zaleski Antoni " "  
 Mazacz Jan, Peczen., 1 m.  
 W. Wiliński, Kołomyja w. p.  
 Hamerman " w. m.

## 30. Pow. Kosowski.

- D. Tarnawski Apol., Kosów 1. p.  
 Bażant Wacł., Kosów 1. sal.

- D. Skomorowski Jan, Kutry 1. m.  
 C. Rudich Leon, Kosów.  
 W. Gnatewicz Piotr, Kosów w. p.

## 31. Pow. Krakowski.

- D. Ponikło Stan., Kraków 1. p.  
 Michalik, Czernichów.

## 32. Pow. Krośnieński.

- D. Coghen Antoni, Krosno 1. p.  
 Humiecki Mod., Krosno.  
 Kocay Aleks., Krosno.  
 Mazurkiewicz Dyon., Krosno  
 1. m.  
 Wain Jan, Krosno.  
 Kropaczek Franc., Dukla.  
 Reiss Karol, Dukla 1. m.  
 Przysłowski Jakób, Korezyn  
 1. gm.  
 C. Horak Karol, Dukla.  
 W. Szydlowski Zenon, w. p.

## 33. Pow. Łańcucki.

- D. Witkowski Edward, Łańcut  
 1. p.  
 Fleszar Jan, Łańcut 1. m.  
 Mach Seb., Kańczuga.  
 Nidecki Apolin., Leżajsk 1. m.  
 Ilowiecki Mat., Przeworsk.  
 Koncewicz Jan " 1. m.  
 Hand Jonat., Żołynia 1. m.  
 C. Arzt Ignacy, Łańcut 1. sk.  
 Peszkowski Ad. Leżajsk.  
 Dobiasz Teod., Przew. 1. m.  
 W. Dulęba Maryan, Przew. w. p.  
 Szymański Ant. "

## 34. Pow. Limanowski.

- D. Ściborowski Kazim., 1. p.  
 Kruk Kazim., Limanowa.  
 Odrobina Jerzy, Mszana 1. k.  
 W. Atlas Herman w. p.

## 35. Pow. Liski.

- D. Dembowski M., Lisko 1. p.  
 Edelheit Zygm. " "  
 Jaremkiewicz Mich., Ustrzyki.  
 Lenartowicz " "  
 Dulęba, Lutowisko.  
 C. Freysinger Józ., Lisko 1. m.  
 Propst Jakób, Lutowisko 1. m.  
 W. Rutkowski Kaz. w. p.



## 36. Pow. Lwowski.

- D. Obtulowicz Ferd., Lwów l. p.  
 Kolberger, Kulpark. s. sz.  
 Maliszewski H. " pr. "  
 Neusser Gust. " dyr. sz.  
 Pluciński Mich., Kulpark. p. sz.  
 Kruszyński Kazim., Winniki.  
 Acker Sal., Szczerzec.  
 Last Szym., "  
 Antoniewicz Eust., Winniki.  
 Bernolak Jan, Winniki l. f.  
 C. Raps Maur., Jaryczów.

## 37. Pow. Mielecki.

- D. Warzycki Br., Mielec as. san.  
 Iwański Kar., Radomyśl l. m.  
 Kijas Błażej, Mielec em. l. p.  
 Lorentski And., Radomyśl.  
 Szafer Wład., Mielec.  
 Staniszewski Wład., Mielec.  
 C. Schabus Em., Mielec l. m.  
 W. Łukaszewski Andrzej w. p.

## 38. Pow. Mościski.

- D. Lebedowicz Em., Mościska l. p.  
 Kudas Jan "  
 Pordes Majer, Sadowa W. l. k.  
 C. Korner Wilh., Mościska l. m.  
 Raab Hen., Sąd. Wisznia l. m.  
 W. Grochowski Kar. Mośc. w. p.

## 39. Pow. Myślenicki.

- Kniehynicki Klem., Myślenice, l. p.  
 Łodziński Wikt., Myśl. l. m.  
 Dereniowski Bol., Jordanów l. m.  
 Uchacz Bł., Maków l. sk.  
 Spitzel Jakób, Rabka.  
 W. Vergesslich Joz. w. p.

## 40. Pow. Nadworniański.

- D. Głowiński Winc., Nadwórna l. p.  
 Bogdański Bronisł., Delatyn l. m. i sal.  
 Bibring Szym., Nadwórna.  
 C. Feuerstein Maur., Nadwórna l. m.  
 W. Fischer Joachim w. p.

## 41. Pow. Niski.

- D. Loewy Alojz., Nisko l. p.  
 Hernich Franc., Rudnik l. m.  
 Szostkiewicz Stan., Bojanów.  
 C. Hand Saul, Ulanów l. m.  
 W. Piskorski Jan w. p.

## 42. Pow. Nowosądecki.

- D. Przybylski Wacł., N. Sącz l. p.  
 Fierich Tytus, N. Sącz.  
 Głuchowski Miecz., N. Sącz.  
 Kijas Tadeusz "  
 Kołaczkowski Józ. "  
 Kosferkiewicz Franc. "  
 Kozubski Ludwik, N. Sącz l. k.  
 Mohr Dawid "  
 Richter Józef " l. m.  
 Sławik Karol "  
 Zengteller Lac. " pr. sz.  
 Kmiotowicz Fran., Krynica l. g.  
 Chilewski Aleks., S. Sącz l. k.  
 Gawełkiewicz Leop. " l. k.  
 Lehman Józef, "  
 C. Zauderer Maur., N. Sącz.  
 W. Sołtykiewicz Jan " w. p.  
 Stuber Krystyn " w. m.

## 43. Pow. Nowotarski.

- D. Blumenfeld Hen. N. Targ l. p.  
 Schein Herman " l. m.  
 Hammerschlag Rudolf, Krościenko.  
 Chramiec And., Zakopane.  
 Chwistek Bronisł. "  
 Kulczycki Maryan, "  
 W. Lubliner-Leon, N. Targ w. p.

## 44. Pow. Pilzneński.

- D. Januszkiewicz Ignacy (syn.), Pilzno as. s.  
 Mydlarski Wład., Pilzno.  
 Gumowski Fr., Brzostek l. m.  
 Januszkiewicz Ign. (ojc.) Dulczówka em. l. p.  
 W. Kruczkowski Sylw., Pilzno w. p.  
 Reiss Samuel, Czarna w. m.

## 45. Pow. Podhajecki.

- D. Dzikowski Zygm., Podhajce l. p.

D. Galusiński Antoni, Podhajce  
pr. szp.

Lidechower Maur., Podhajce.  
Zirhoffer Karol, " "  
W. Panek Jan, Podhajce w. p.

#### 46. Pow. Przemyski.

D. Cassina Ferd., Przemysł l. p.  
rad. zdr.

Dukiet Józef, " "  
Keller Maurycy, " "  
Kiebuziński Baz., " "  
Lityński Luc., " l. k.  
Mannheim M., l. k. chor.  
Rosenbluth Efr., Przemysł.  
Schoeffer Franc., (dentysta).  
Szyszkowski Mich., Przemysł.  
Smolarski Zygm., " l. m.  
Trybulec Franciszek, " "  
Ziemiański Leon, " "  
Salay, Przem., em. l. sztab.  
Gasiorek Franc., Dubiecko.  
Rączka Stan., Niżankowice.

C. Chilf Joach., Przemysł (dent.).  
Schnitzer, " " "  
Biber Maur., " sek. szp.  
i więz.

Salwer Joachim, Przemysł.  
W. Fried Ferd., Przemysł w. p.  
Nestajko Euz., " w. m.

#### 47. Pow. Przemysłański.

D. Waligórski Alb., Przemysłany  
l. p.

Barbag Herman, " "  
Dolnicki Cyryl, Gliniany.  
Moch Jan, Hanaczów.

C. Kostmann Ign., Przemysłany  
l. m.

Sternberg Józef, " "  
W. König Pinkas, w. p.

#### 48. Pow. Rawski.

D. Lisiński Ludw., Rawa l. p.  
Dadlez Julian, " "

Szajnowski Wład., Uhnów.  
C. Elner Mark., Niemir. l. m.

Herold Izidor, Rawa.  
Hirsch Henryk, Lubycza.

Kibitz Bernard, Uhnów.  
Kibitz Natan, Rawa.

W. Weissberg Adolf, w. p.

#### 49. Pow. Rohatyński.

D. Wasylewski Tyt., Rohatyn l. p.  
Schaff S., " "

Terlecki A., " l. m.  
Halarewicz B., Bołszowce l. m.

Płochocki Tadeusz, Bursztyn.  
C. Chamaides Bern., Bołszowce.

Goldschneider Jakób, Boka-  
czowce l. k.

Frost A., Bursztyn.  
W. Weissberg Abr., Rohatyn

w. p.

#### 50. Pow. Ropeczycki.

D. Wyszatycki Fr., Ropecz. l. p.  
Roller Fryd, " l. m.

Bentkowski Zygm., Dębica.  
Sędzielowski Fr. Sędziszów.

C. Benda Ant., Dębica l. m i k.  
Reiss Elias, Dębica.

Sztolzenberg Kar., Sędzisz.  
W. Banach Antoni, Dębica.

Kalakowski Wł., Sędziszów.

#### 51. Pow. Rudecki.

D. Żelazowski Wiktor, l. p.  
Maciulski Józef, Kołbajówce.

Jakliński Leon, Komarno l. sk.  
C. Bardasch M., " l. m.

Gizelt Józef, Rudki l. m.  
W. Andykowski Maryan, w. p.

#### 52. Pow. Rzeszowski.

D. Barzycki Józ., Rzeszów l. p.  
Lachowicz Eug., " a. s.

Bujniewicz Jakób, " s. sz.  
Drobner Edward, " "

Elsner Hirsch, " "  
Fiałkowski Wojc., " "

Jabłoński Stan., " pr. sz.  
Kraus Herman, " "

Niesiołowski Wł., " "  
Szczepański Włodz., " a. s.

Segel Edward, " "  
Zagórski Ad., " l. m.

Zennermann Wojc., " "  
Kolasiński Alf., Błażowa.

Patryn Józef, Strzyżów l. m.  
Szczepański Tyt., Strzyżów.

Solecki Jan, Tyczyn.  
C. Bernfeld Leon, Tyczyn l. m.

C. Herzum Józ., Głogów l. m.  
 Reiner Iz., Rzeszów.  
 Rotter Herm., "  
 W. Rasp Karol, Dr med. w. p.

*53. Pow. Samborski.*

D. Skalski Wł., Sambor l. p.  
 Biegelmayr Alf., " p. s.  
 Chrzaszczewski Woj., Sambor.  
 Kopaczyński Wład., "  
 Markiewicz Henryk "  
 Omeis Jerzy "  
 C. Luster Herm., "  
 Reis Leon, "  
 W. Rożankowski Jan, w. p.

*54. Pow. Sanocki.*

D. Czyżewicz Wład., Sanok l. p.  
 Drewiński M., " l. szp.  
 Kozłowski Emil, " l. m.  
 Zaleski Karol, " l. m.  
 Lemer Tytus "  
 Herzig Naftali, "  
 Robel Emil, l. m.  
 Wienkowski Józef, em. lek.  
 sztab. Sanok.  
 Bielecki Ign., Rymanów.  
 Krzyszkowski Er., Rymanów.  
 Galant Józef, Zagórz l. k.  
 C. Stangenhaus Józef, Sanok  
 sek. szp.  
 Atlas Sal., Bukowsko l. m.  
 W. Olbrycht Piotr, San. w. p.

*55. Pow. Skałacki.*

D. Najedło Feliks, Skałat l. p.  
 Vorzimmer Herm., "  
 Hausel Fischel, Grzymałów.  
 Wojtkowski Jan, "  
 Dawid Salom., Podwołoczyska.  
 Świderski Jan "  
 C. Bardach T., Grzymałów.  
 Freudenthal Sal., "  
 Berger Elias, Podwołocz.  
 Bügeleisen Wilh., Touste.  
 Starwer Maurycy, Skałat.  
 Metal Izaak, Podwołocz. l. m.  
 W. Tychowski Wikt., " w. p.  
 Lille Osias, Podwołoczyska.

*56. Pow. Śniatyński.*

D. Werner Kar., Śniatyn l. p.  
 Lic Feliks, Zabłotów.

D. Mehrer Izidor, Śniatyn l. m.  
 C. Pomeranz Izidor Śniatyn.  
 Berger Aron, Śniatyn.  
 W. Faulent Karol " w. p.  
 Prager Sam., Zabłot. w. m.

*57. Pow. Sokalski.*

D. Broniowski Ant., Sokal l. p.  
 Jajus Miron, " l. m.  
 Łuszczkiewicz J., "  
 Urech, "  
 Wyspiański Gwido " p. s.  
 Feuerstein El., Krystynop.  
 Langsam. Bełz.  
 C. Markl Józef, Wareż l. m.  
 Pordes Sal., Krystynopol.  
 Blum Zygmunt, Bełz.  
 W. Eitelberg Br., Sokal w. p.

*58. Pow. Stanisławowski.*

D. Wolański Kaj., Stanisławów  
 l. p.  
 Csessnak Julian " as. s.  
 Drzewicki Stefan, "  
 Frankfurter Józef l. m.  
 Gąsiorowski Leodgard, l. w.  
 Kónkolniak Grze., Stanisł. p. s.  
 Lachawiec Apol., "  
 Machnowski Wacł., " l. k.  
 Ochsenhorn Mojż., "  
 Ostafiński Maryan "  
 Sztencel Bernard "  
 Wnękowicz Stanisł. "  
 Żukowski Aleks. "  
 Konarzewski J., Halicz l. m.  
 Mołczkowski Dyon., " l. k.  
 C. Grader Maur., Stanisławów.  
 Hoffman Jan " l. sz.  
 Klaar Szymon " l. k.  
 Kurzer Leon, Stanisławów.  
 Rosenbaum Max., "  
 Sternschuss Henr., "  
 Szczepkowski Tyt., " l. kar.  
 W. Pawlikiewicz Jan, " w. p.  
 Frucht Maurycy, " w. m.

*59. Pow. Staromiejski.*

D. Balicki Stan., l. p.  
 Laskiewicz Alfred, Stara Sól.  
 Mężyk Jan, Chyrów lek. zakł.  
 wychow. OO. Jezuitów.



C. Obuszkiewicz Stanisł., Stare  
miasto l. i wet. m.  
Berko Hersz, Staremiasto.  
Schubert Mikołaj, Chyrów l. k.

60. Pow. Stryjski.

D. Serkowski Bol., Stryj l. p.  
Jakobi Lucyan, "  
Jeż Andrzej, "  
Meisels Jul., "  
Papieski Antoni, "  
Strzechowski Wil., "  
Medwey Aleks., Morszyn.  
Michalski Wiktor, Skole.  
Mironowicz Kor., " 1. s.  
C. König Iz., Stryj sek. szp.  
Rosenberg Nach., Stryj.  
Temple Dym., Stryj l. m.  
Kräuterblüth Jak., Skole.  
W. Smołuchowski Jan, w. p.

61. Pow. Tarnobrzęski.

D. Momidłowski Waler., Tarno-  
brzeg a. s.  
Machalski Leon, Tarnobrzeg  
em. lek. pow.  
Orzechowski Leonard. "  
Reifer Ad., Tarnobrzeg l. m.  
Dumaire Wł., Rozwadów "  
Hochstim Adolf, Rozwadów.  
Bakowski Teofil, Baranów.  
C. Hellmann Tob., Tarnobrzeg.  
W. Zörner Ferd., w. p.

62. Pow. Tarnopolski.

D. Gładyszowski Emil, Tarno-  
pol l. p.  
Celewicz Aleks. "  
Eckhard Józ., Tarnopol p. s.  
Karmin Józef, "  
Korngrün Joach., "  
Leiblinger Izyd., "  
Moszkowicz Jak. "  
Münzer Maks., "  
Rosenfeld Ad., " p. s. ż.  
Swistun Atan., "  
Weirauch Sam., "  
Weissberg Zygm., "  
Zgórski Kazim., "  
Brudziński Ludw., Mikulińce.  
Koller Bolesław, "

C. Brauner Izzydor, Tarnop. s. sz.  
Planer Jakób, "  
W. Harasimowicz Stan., w. p.

63. Pow. Tarnowski.

D. Stanko Wojc., Tarnów. l. p.  
Białkowski Wład., "  
Glaser Leopold, "  
Józefczyk Tad., "  
Kaczkowski Wit., "  
Kowalski Henr., "  
Lerner Wilhelm, "  
Metzger Jan, " 1. m.  
Pilzer Herman, " s. sz.  
Pochroń Józef, " 1. sk.  
Schützer Leon, " 1. sz. iz.  
Skowroński Wł., " p. s.  
Walczyński Józef, "  
Wolfram Adolf, "  
Zbigniewicz Jan, " s. sz.  
Kalisz Al., Tuchów l. m.  
W. Sikorski Narcyz, w. p.  
Hirsch Herman, w. m.

64. Pow. Tłumacki.

D. Litwinowicz Orest, Tłumacz  
l. p.  
Richter Arnold, Tłumacz l. m.  
Ebersohn M., Tyśmienica.  
C. Nussbaum Al., " 1. m.  
Philip Herman, Ottynia l. m.

65. Pow. Trembowelski.

D. Grünhaut Bern., l. p.  
Olpiński Jul., Trembowla.  
Glücksman Nathan, Budzanów.  
Kummer Leon, Strusów.  
Stoklassa Józ., Budz. l. m.  
C. Fischer Leon, Trembowla.  
Hrazdilek Ed., Strusów.  
Neustein Joach., Tremb. l. m.  
Rosenstock Ad., Janów.  
W. Sigall Hirsch, w. p.

66. Pow. Turczański.

D. Ciepielowski K., Turka l. p.  
Kowalski Karol, "  
C. Kelhofer Sal., " 1. m.  
W. Panek Jan, w. p.

67. Pow. Wadowicki.

D. Zawadziński Stanisław, Wa-  
dowice l. p.

D. Bukowski August, Wadowice.  
 Gedl Władysław, „  
 Opydo Franciszek, „  
 Zborowski Józef, Andrychów.  
 Żędzianowski Stan., „ 1. m.  
 Lewandowski, Tłuczan.  
 Keller Rajmund, Zator.  
 Tarchalski Józ., „ 1. m.  
 Gęslak Jan, Zebrzydowice 1. s.  
 C. Erychleb Jan, Kalwarya.  
 Weczerka August, Wadowice.  
 W. Hryniewiecki Em. „ w. p.

68. *Pow. Wielicki.*

D. Kownacki J., Wieliczka 1. p.  
 Podobiński Ant., „ 1. m.  
 Steiner Stan. „ 1. sal.  
 Malinowski Kaz., Dobczyce.  
 Morawiecki Józef, Gdów.  
 Aronsohn Sam., Podgórze.  
 Pancewicz Izidor, Podgórze.  
 Skakalski Eu., Podgórze 1. m.  
 Świętek Winc., „ 1. k.  
 Nawrat Stanisł., Skawina.  
 W. Sochaniewicz Teofil.

69. *Pow. Zaleszczycki.*

D. Sobolewski Franc., 1. p.  
 Blutreich Izaak, Zaleszczyki.  
 Sołowski Jan, „ p. sz.  
 Kretz Ber., Tłuste 1. m.  
 Pawlikiewicz J., Uścieczko.  
 C. Reischer Ignacy, Zaleszczyki  
 sek. sz. i 1. m.  
 W. Gałek Józ., Zaleszcz. w. p.

70. *Pow. Zbarański.*

D. Węgrzynowski W., Zbar. a. s.  
 Berger Michał, Zbaraż 1. m.  
 C. Mantel Maur., „ 1. sz.  
 Reisner Wilh., „ 1. m.  
 W. Horodnicki Mikołaj w. p.

71. *Pow. Złoczów.*

D. Zaleski Eust., Złoczów 1. p.  
 Glasgall Jakób „  
 Heyne Bolesław „ 1. m.  
 Stein Elias „ 1. k.  
 Wysocki Aleks., p. s.  
 Wójtowicz Edm. Olszanica.  
 1. sz. w Nowosiólkach.

D. Skórski Marj., Zborów 1. m.  
 C. Aderschlager Izaak, Biały  
 Kamień 1. m.  
 Hirschhorn F., Jezierna 1. m.  
 Hassman Lud., Nowosiółki 1. sz.  
 Fuchs Mojż., Olesko 1. m.  
 Raps Mayer, Pomorzany 1. m.  
 Tokayer Jak., Pomorzany.  
 Bienenwald S., Sasów 1. m.  
 Łucyk Jakób, Zborów.  
 Tischner Dion, Złoczów s. sz.  
 Nagler Maur., „  
 Deutsch Hen., Złoczów 1. m.  
 Eskreis Markus „ s. sz.  
 W. Dorożyński T., Złoczów w. p.

72. *Pow. Żółkiewski.*

D. Krzyształowicz Adam, Żół-  
 kiew 1. p.  
 Dżymalik Sylw., Żółkiew.  
 Muszkiet Karol „ p. sz.  
 Olejnik Michał, Mosty.  
 Radlmeser Karol, Żółkiew.  
 C. Bardon Em., Kulików 1. m.  
 Elner Sal., Żółkiew s. sz.  
 Sakler Elias, Mosty w.  
 W. Raff Chaskel, Żółkiew w. p.

73. *Pow. Żydaczowski.*

D. Goldhaber Adolf 1. p.  
 Ortyński Włodz., Żydaczów.  
 Kraetschmar Fel., Drohowyż.  
 Kurasiewicz Józ., Rozdół 1. s.  
 Gozdecki Józ., Żurawno 1. m.  
 C. Petersil Józef, Rozdół 1. m.  
 Sakler Elias, Żurawno 1. m.  
 Wehrn Leon, Mikołajów 1. m.  
 W. Stupnicki A., Żydaczów w. p.

74. *Pow. Żywiecki.*

D. Szajna Józ., Żywiec as. s.  
 Podgórski Czesław, Żywiec.  
 Seidler Ant., Żywiec 1. sk.  
 Czop Zyg., Miłowka 1. m.  
 Gawlik Jan, Sucha 1. hut.  
 Niezabitowski Ad., Sucha 1. m.  
 Janota Rud., Węg. górk.  
 Blumenfeld Joa., Zabłocie.  
 C. Klein Ad., Rajcza 1. sk.  
 W. Bogdan Grzeg., Żywiec w. p.



# ALFABETYCZNY SPIS LEKARZY.

Skrócenia przy końcu nazwisk:

**Kr.** oznacza **Kraków.**

**L.** „ **Lwów.**

Numerą odnoszą się do powiatów.

- |                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>A</b> cker S. 36.     | Bielecki J. 54           | Buszek J. <b>Kr.</b>         |
| Antoniewicz W. 17.       | Bielewicz F. 18          | Buzdygan M. <b>Kr.</b>       |
| Antoniewicz E. 36.       | Biegelmajer A. 53        | Bylicki W. <b>L.</b>         |
| Aronsohn S. 68.          | Bieńczowski A. 15        |                              |
| Aschkenazy Z. <b>L.</b>  | Biesiadecki J. 24        | <b>C</b> assina F. 46        |
| Auerbach E. <b>L.</b>    | Biesiadzki A. <b>Kr.</b> | Celewicz A. 62               |
| Auerhahn W. 22.          | Billig E. 28             | Cercha M. <b>Kr.</b>         |
|                          | Blatteis J. <b>Kr.</b>   | Chądzyński J. <b>L.</b>      |
| <b>B</b> aczyński E. 6   | Blatteis S. <b>Kr.</b>   | Chilewski A. 42              |
| Balicki S. 59            | Blumenfeld H. 43         | Chmielecki J. <b>Kr.</b>     |
| Bandrowski J. <b>Kr.</b> | Blumenfeld J. 74         | Cholewicz F. <b>Kr.</b>      |
| Barański A. <b>L.</b>    | Blutreich J. 69          | Chomin A. <b>L.</b>          |
| Barącz R. <b>L.</b>      | Błotnicki T. <b>L.</b>   | Choróbski S. <b>Kr.</b>      |
| Barbag H. 47             | Bobek J. 10              | Chramiec A. 43               |
| Bartmański F. 3          | Bobkiewicz H. <b>Kr.</b> | Chrzaszczewski W.            |
| Barzycki J. 52           | Bogdanik. 1              | 53                           |
| Bažant W. 30             | Bogdański W. <b>L.</b>   | Chwistek Br. 43              |
| Bakowski T. 61           | Bogdański B. 40          | Cięglewicz S. 24             |
| Beck. <b>Kr.</b>         | Borelowski W. 11         | Ciepielowski K. 66           |
| Bendel S. 15             | Borzemski E. 6           | Ciuk A. 28                   |
| Bentkowski Z. 50         | Borzęcki. <b>Kr.</b>     | Coghen A. 32                 |
| Berezowski K. <b>L.</b>  | Bory J. <b>L.</b>        | Csessnak J. 58               |
| Berger M. 70             | Borysiewicz W. 6         | Cwiklicer L. 15              |
| Berggrün A. 11           | Bossowski Al. <b>Kr.</b> | Czapliński S. <b>Kr.</b>     |
| Bermann D. 17            | Braun S. <b>Kr.</b>      | Czerkawski J. <b>L.</b> (28) |
| Bernacki F. 7            | Braunstein. <b>Kr.</b>   | Czop Z. 74                   |
| Bernadzikowski S. 7      | Broniowski A. 57         | Czyżewicz A. <b>L.</b>       |
| Bernolak J. 36           | Browicz T. <b>Kr.</b>    | Czyżewicz W. 54              |
| Berthleff K. <b>L.</b>   | Brudziński L. 61         | Cybulski N. <b>Kr.</b>       |
| Bett M. <b>L.</b>        | Bubeniczek F. 13         | Cymbler W. 14.               |
| Białkowski W. 63         | Bujalski M. 21           |                              |
| Bibring S. 40            | Bujniewicz J. 52         | <b>D</b> adlez J. 48         |
| Bielański Z. 3           | Bukowski A. 67           | Damski W. 11                 |



Danielski J. 19  
 Dawid S. 55  
 Dawidowicz E. 5  
 Dębicki K. **L.**  
 Dekanski S. **L.**  
 Dembowski M. 35  
 Dereniowski B. 39  
 Dietzius A. 23  
 Długolecki F. 1  
 Dobniński W. **L.**  
 Dobruchowski A. 3  
 Dolnicki C. 47  
 Domański S. **Kr.**  
 Dorożyński J. 4  
 Doskowski J. **Kr.**  
 Drobner E. 52  
 Drobner J. **Kr.**  
 Drożdż B. **Kr.**  
 Drzewicki S. 58  
 Drzymalik S. 72  
 Dubanowicz P. **L.**  
 Dukiet J. 46  
 Duleba. 35  
 Dumaire W. 61  
 Dura S. 11  
 Durst A. **L.**  
 Dworzański K. 1  
 Dziembowski J. 42  
 Dzikowski Z. 45.

Ebers H. **L.**  
 Ebersohn M. 64  
 Eckhard J. 62  
 Edelheit 35  
 Ehrlich D. **L.**  
 Eichhorn T. **Kr.**  
 Elektrowicz E. **L.**  
 Elsner H. 52.

Feigel L. **L.**  
 Festenburg E. **L.**  
 Feuerstein E. 57  
 Feuerstein N. 4  
 Fiałkowski L. **L.**  
 Fiałkowski N. 52  
 Fierich T. 42  
 Filewicz J. 28  
 Filimowski A. **Kr.**  
 Filipkiewicz S. **Kr.**  
 Fleischmann A. 8  
 Fleszar J. 33  
 Fraenkel J. 3

Frankfurter J. 58  
 Frankowski W. **L.**  
 Friedberg J. 24  
 Friedmann H. 17  
 Friedwald A. 23  
 Frühling M. 18  
 Frydmann Z. 22  
 Fuchs F. **L.**

Gabryszewski A. **Kr.**  
 Galant J. 54  
 Galusiński A. 45  
 Gasek J. 9  
 Gasiorek F. 46  
 Gasiorowski L. 58  
 Gawałkiewicz L. 42  
 Gawlik J. 74  
 Garbiński K. **Kr.**  
 Gawlikowski S. **Kr.**  
 Gawroński A. 19  
 Gedl W. 67  
 Gesang B. **L.**  
 Geślak J. 67  
 Glaser L. 63  
 Glasgall J. 71  
 Gładyszowski E. 62  
 Głowiński W. 40  
 Gluziński A. **Kr.**  
 Gluziński L. **L.**  
 Glücksmann N. 65  
 Głaczyński W. 29  
 Głowacki B. **L.**  
 Głowiński W. 2  
 Godlewski K. **L.**  
 Gold J. **Kr.**  
 Goldhaber A. 73  
 Goldhaber P. 6  
 Goldhammer J. 29  
 Gołębiowski K. **L.**  
 Gońka A. **L.**  
 Górski C. 3  
 Gostyński J. **L.**  
 Gozdecki J. 73  
 Grabowski K. **Kr.**  
 Gracka J. 25  
 Gross K. **L.**  
 Grünhaut B. 65  
 Grzybczyk S. 18  
 Gumowski F. 44  
 Gussmann J. **L.**  
 Gwiazdomorski J. **Kr.**

Habicht K. **Kr.**  
 Haim L. **Kr.**  
 Halarewicz B. 49  
 Halban L. **Kr.**  
 Hand J. 33  
 Hansel F. 55  
 Harajewicz J. **Kr.**  
 Harajewicz W. **Kr.**  
 Hellmann. **L.**  
 Hernich F. 41  
 Herzig N. 54  
 Heyne B. 71  
 Hiener A. 24  
 Hirsch H. **Kr.**  
 Hirschler M. 10  
 Hochstim A. 61  
 Hofner O. 17  
 Hordyński A. 25  
 Hoszard F. **L.**  
 Hulles J. 29  
 Humiecki M. 31  
 Hyżycki S. **Kr.**

Jabłoński J. 12  
 Jabłoński S. 52  
 Jajus M. 57  
 Jakliński L. 51  
 Jakobi L. 60  
 Jakubowski A. 20  
 Jakubowski M. **Kr.**  
 Jana S. **L.**  
 Janda F. **L.**  
 Janiszewski A. 27  
 Janota R. 74  
 Janowski J. 17  
 Januszkiewicz J. o.  
 44  
 Januszkiewicz J. s.  
 44  
 Jaremkiewicz M. 35.  
 Jasiński W. **L.**  
 Jastrzębski J. 21  
 Jastrzębski W. 23  
 Jaworski W. **Kr.**  
 Jaworski B. 29  
 Jendl J. 6  
 Jendl T. **L.**  
 Jeż A. 60  
 Jłowicki M. 33  
 Jodłowski J. 5  
 Jordan H. **Kr.**  
 Józefczyk T. 63

- Junger J. Kr.  
 Jüngst W. 12  
 Jurkiewicz K. 17  
 Jurowicz J. Kr.  
 Jwański K. 37.  
  
**K**aczkowski W. 63  
 Kaden K. Kr.  
 Kadyj J. 24  
 Kadyj H. L.  
 Kalach F. 6  
 Kalinowicz M. 5  
 Kalisz A. 63  
 Kapelusze E. 1  
 Karpiński S. Kr.  
 Katiński L. 18  
 Kaufmann M. Kr.  
 Karmin J. 62  
 Keller M. 46  
 Keller R. 67  
 Kicki T. L.  
 Kiebuziński B. 46  
 Kijas B. 37  
 Kijas T. 42  
 Kilarski J. L.  
 Kirschner A. Kr.  
 Kisieliński F. 7  
 Klein L. 11  
 Kluczyński Z. 7  
 Kmietowicz F. 42  
 Kniaziołucki Z. L.  
 Kniehyniecki K. 39  
 Kobryński W. 29  
 Kobylański A. L.  
 Kocay A. 31  
 Koerner E. 10  
 Kohn M. Kr.  
 Kolasiński A. 52  
 Kolberger 36  
 Koller B. 62  
 Kołaczkowski J. 42  
 Komorowski B. Kr.  
 Konarzowski J. 58  
 Konarzewski J. L.  
 Koncewicz J. 33  
 Kopff L. Kr.  
 Konkolniak G. 58  
 Kopaczyński W. 53  
 Korczyński E. Kr.  
 Korczyński L. Kr.  
 Korngrün J. 62  
 Kosterkiewicz F. 42  
  
 Kosiński F. L.  
 Kosiński L. Kr.  
 Kossak L. L.  
 Kotłowski S. 16  
 Kownacki J. 68  
 Kowalski H. 63  
 Kowalski K. 66  
 Kozierowski E. L.  
 Kozłowski B. Kr.  
 Kozłowski S. Kr.  
 Kozłowski E. 54  
 Koy S. Kr.  
 Koźmiński F. Kr.  
 Kozubski L. 42  
 Kraus H. 52  
 Kraetschmar F. 73  
 Kramarzyński M. 14  
 Kramarzyński K. Kr.  
 Krasowski S. Kr.  
 Kretowicz W. 18  
 Kretz B. 69  
 Krobicki T. L.  
 Krokiewicz A. L.  
 Kropaczek F. 32  
 Krongold W. Kr.  
 Kronenberg K. 20  
 Króweczyński J. L.  
 Kruk K. 34  
 Kruszyński K. 36  
 Kryński L. Kr.  
 Krzyształowicz A. 72  
 Krzyształowicz S. Kr.  
 Krzyżanowski E. 10  
 Krzyżanowski T. L.  
 Krzyszzkowski E. 54  
 Krygowski T. L.  
 Kudas J. 38  
 Kucharski P. L.  
 Kuhn A. L.  
 Kukulski A. 18  
 Kulczycki M. 43  
 Kummer L. 65  
 Kurasiewicz J. 73  
 Kurowiec J. 26  
 Kuźniar W. Kr.  
 Kwaśnicki A. Kr.  
 Kwieciński M. 1.  
  
 Lachawiec A. 58  
 Lachowicz E. 52  
 Lachowicz Z. L.  
 Landau S. L.  
  
 Langie A. Kr.  
 Langsam. 57.  
 Laskiewicz A. 59  
 Last S. 36  
 Lateiner E. L.  
 Lebedowicz E. 38  
 Lechowski W. 17  
 Legeżyński W. L.  
 Lehmann. 42  
 Lemer T. 54  
 Leiblinger F. 6  
 Leiblinger J. 62  
 Lenartowicz. 35  
 Lerner W. 63  
 Lewandowski J. 67  
 Lic F. 56  
 Lic H. 9  
 Loewy A. 41  
 Lorentski A. 37  
 Löw B. 17  
 Lidehower M. 45  
 Lityński L. 46  
 Lisiński L. 48  
 Litwinowicz O. 64  
 Lukas A. L.  
 Lustig S. Kr.  
 Lustgarten L. Kr.  
 Lutyński L. 13.  
  
**L**azarski J. Kr.  
 Łepkowski W. Kr.  
 Łodziński W. 39  
 Łopacki L. L.  
 Łowczowski W. 7  
 Łucki J. 1  
 Łukasiewicz W. 21  
 Łuszczkiewicz J. 57.  
  
**M**ach S. 33  
 Machalski L. 61  
 Machnowski W. 58  
 Machek E. L.  
 Maciulski J. 51  
 Macudziński W. 24  
 Marcisiewicz F. Kr.  
 Markiewicz H. 53  
 Mars A. Kr.  
 Mączka T. Kr.  
 M dejski B. Kr.  
 Madejski W. 6  
 Madurowicz M. Kr.  
 Mahl J. L.

- Majer J. Kr.  
 Majewski A. L.  
 Malinowski K. 68  
 Malinowski G. Kr.  
 Maliszewski H. 36  
 Mann J. 6  
 Mannheim M. 46  
 Marynowski M. 23  
 Mazurkiewicz D. 32  
 Mayer J. 17  
 Mayzel T. Kr.  
 Meciński K. 4  
 Medwey A. 60  
 Meisels J. 60  
 Meisels Z. 23  
 Mehrer H. L.  
 Mehrer J. 56  
 Meller D. L.  
 Mendelsburg H. Kr.  
 Merczyński E. L.  
 Merunowicz J. L.  
 Metzger J. 63  
 Meżyk J. 59  
 Michalik 31  
 Michalik J. 7  
 Michalski W. 60  
 Mikołajski S. 20  
 Mildner J. 12  
 Milerowicz J. 8  
 Milewski T. Kr.  
 Millet A. 14  
 Mironowicz K. 60  
 Moch J. 47  
 Mohr D. 42  
 Mołczkowski D. 58  
 Momidłowski S. Kr.  
 Momidłowski W. 61  
 Morawiecki J. 68  
 Morawski M. 29  
 Mossing K. L.  
 Mosler M. 5  
 Moszkowicz J. 62  
 Mukowicz E. L.  
 Murdzieński F. Kr.  
 Muszkiet K. 72  
 Münz E. Kr.  
 Münzer M. 62  
 Mydlarski W. 44.  
 Nacht F. 10  
 Najedło F. 55  
 Natter W. 24  
 Nawrat S. 68  
 Neschling L. 16  
 Neumann E. 18  
 Neusser G. 36  
 Nidecki A. 33  
 Niesiołowski W. 52  
 Niezabitowski A. 74  
 Nodzyński B. 3  
 Nowak J. 16  
 Nowiński S. L.  
 Nycz H. Kr.  
 Nycz W. 1  
 Obaliński A. Kr.  
 Obtułowicz F. L.  
 Ochsenhorn M. 58  
 Odrobina J. 34  
 Oettinger J. Kr.  
 Olejnik M. 72  
 Olpiński J. 65  
 Olszewski B. Kr.  
 Omeis J. 53  
 Opieński J. L.  
 Opolski W. L.  
 Opydo F. 67  
 Orski J. 29  
 Orzechowski L. 61  
 Ortyński W. 73  
 Ostafiński M. 58  
 Oświecimski S. 3  
 Ozimek S. 14  
 Paleczny B. Kr.  
 Palesten H. 4  
 Papee J. L.  
 Papieski A. 61  
 Palka K. 7  
 Pancewicz J. 68  
 Pareński S. Kr.  
 Paszkowski S. Kr.  
 Patryn J. 52  
 Pawlicki T. 24  
 Pawlikiewicz J. 69  
 Pawlikowski A. L.  
 Penner J. 17  
 Peszkowski A. 33  
 Peters J. 16  
 Piasecki W. Kr.  
 Piaskiewicz W. 29  
 Piątkowski M. Kr.  
 Pięniątek P. Kr.  
 Pietrzycki A. 7  
 Pilzer H. 63  
 Piotrowski E. Kr.  
 Piotrowski G. L.  
 Piotrowski L. L.  
 Piórko A. 3  
 Pisek W. L.  
 Plech A. 23  
 Pluciński M. 36  
 Płochocki T. 49  
 Pochroń J. 63  
 Podgórski C. 74  
 Podlewski K. L.  
 Podłuski M. 16  
 Podobiński A. 68  
 Pohorecki W. Kr.  
 Ponikło S. Kr.  
 Pordes M. 38  
 Porebowicz J. Kr.  
 Prochaska T. 27.  
 Prus J. L.  
 Przesmycki J. 18  
 Przybylski W. 42  
 Przysłowski J. 32  
 Puchacki E. Kr.  
 Puchalski S. 15  
 Raczyński J. Kr.  
 Radecki P. Kr.  
 Radlmesser R. 72  
 Rapaport J. L.  
 Rapp L. L.  
 Reifer A. 61  
 Reiss K. 32  
 Regiec J. Kr.  
 Reitzes D. L.  
 Richter A. 64  
 Richter F. 23  
 Richter J. 42  
 Rieger Z. L.  
 Rieser 11  
 Riwczes F. L.  
 Robel E. 54  
 Roicki A. L.  
 Roller F. 50  
 Rościszewski E. Kr.  
 Rosenblatt E. Kr.  
 Rosenzweig A. Kr.  
 Rosenzweig L. L.  
 Rosner Al. Kr.  
 Rosner An. Kr.  
 Rosner Ig. L.  
 Rosner J. L.



- Rosenfeld A. 62  
 Rosenberg A. **Kr.**  
 Rosenbusch L. **L.**  
 Rosenblüth E. 46  
 Rosenheck S. 29  
 Rossberger S. 23  
 Roszko A. 24  
 Roth A. 3  
 Rożański J. **L.**  
 Ruczka S. 46  
 Rudnicki K. 14  
 Rutkowski **Kr.**  
 Rutowski K. **Kr.**  
 Rydel L. **Kr.**  
 Rydygier L. **Kr.**  
  
**Salay** 46  
 Sawicki E. **L.**  
 Sawicki S. **L.**  
 Schaitter J. **Kr.**  
 Schaff S. 49  
 Schaffer W. 37  
 Schapira A. 6  
 Schein H. 43  
 Schlank M. 1  
 Schmidt E. **L.**  
 Schmidt F. 21  
 Schoeffer F. 46  
 Schneck K. 11  
 Schneider L. **Kr.**  
 Schorsch J. 29  
 Schramm H. **L.**  
 Schumann F. **K.**  
 Schützer L. 63  
 Schwarz A. **Kr.**  
 Ściborowski K. 34  
 Ściborowski W. **Kr.**  
 Segiel E. 52  
 Seifmann P. **L.**  
 Seidler A. 74  
 Seidner A. 5  
 Sędziowski F. 50  
 Sękowski B. 60  
 Siedlecki J. **Kr.**  
 Sielski S. **L.**  
 Sieradzki A. **L.**  
 Silbermann E. 6  
 Silberstein J. 29  
 Singer M. **L.**  
 Skakalski E. 68  
 Skalski W. 53  
 Skałkowski B. **L.**  
 Skałkowski W. **L.**  
 Skibiński A. 8  
 Skobel S. **Kr.**  
 Skomorowski J. 30  
 Skórczewski B. **Kr.**  
 Skowroński W. 63  
 Skórski M. 71  
 Skrzyński S. **Kr.**  
 Sławik K. 42  
 Słaczka A. 9  
 Sliwiński M. **Kr.**  
 Słosarczyk A. 1  
 Słapa W. **Kr.**  
 Smitowski M. **L.**  
 Smolarski Z. 46  
 Smorągiewicz K. **Kr.**  
 Smutny K. **L.**  
 Śnieżek L. 9  
 Sobolewski F. 69  
 Sobolewski K. **L.**  
 Sochanik S. **L.**  
 Sochański J. **L.**  
 Sokołowski H. **Kr.**  
 Sokal M. **L.**  
 Solecki J. 52  
 Sołtysik S. 6  
 Spira R. **Kr.**  
 Spitzel J. 39  
 Sroczyński F. **Kr.**  
 Stachiewicz T. **L.**  
 Starachowicz J. **Kr.**  
 Stopezański A. **Kr.**  
 Strojnowski E. **L.**  
 Strumiński A. 6  
 Steuermark 29  
 Stein E. 71  
 Steiner S. 68  
 Stahlberger T. **L.**  
 Stanko W. 63  
 Staniszewski W. 37  
 Stark J. **L.**  
 Steinhaus J. **L.**  
 Stokłosiński F. 10  
 Steinkeller H. 11  
 Stoeckl A. 12  
 Stupnicki W. 27  
 Stoklassa J. 65  
 Strzechowski W. 60  
 Surzycki J. **Kr.**  
 Süsskind A. **Kr.**  
 Świątek W. 68  
 Świątkiewicz M. **L.**  
 Switalski L. **Kr.**  
 Swiderski M. 55  
 Swistun A. 62  
 Szafer W. 37  
 Szajna J. 74  
 Szajnowski W. 48  
 Szewczyk J. **Kr.**  
 Szymkiewicz K. **Kr.**  
 Szpilmann J. **L.**  
 Szymański H. 12  
 Stenzel B. 58  
 Szyszkowski W. 46  
 Sysak G. 29  
 Szczepański W. 52  
 Szczepański T. 52  
 Szostkiewicz S. 41  
 Sztembarth C. **L.**  
 Szuszkiewicz P. **L.**  
 Szydłowski Z. **L.**  
 Szujnowski M. 5  
  
**Tarchalski** J. 67  
 Tarnawski A. 30  
 Taschmann A. **L.**  
 Tataczuch W. **L.**  
 Teichmann L. **Kr.**  
 Teitelbaum M. 8  
 Teodorowicz T. **L.**  
 Terlecki A. 49  
 Tomanek J. **L.**  
 Torczyński T. **Kr.**  
 Trybulec F. 46  
 Trzaskowski B. 23  
 Trzebiński R. **Kr.**  
 Turzański G. 23  
 Tuszyński F. **Kr.**  
 Tyszkiewicz W. **Kr.**  
 Tyszkowski L. **L.**  
  
**Uchacz** B. 39  
 Uhma Cz. **L.**  
 Uranowicz T. 8  
 Urech 57  
 Ulrich T. **L.**  
  
**Vincenz** A. 29  
 Vorzimmer H. 55  
  
**Wachholtz** L. **Kr.**  
 Wachtel A. **L.**  
 Wagner A. **L.**  
 Wain J. 32

Walentowicz A. <b>Kr.</b>	Witkowski E. 33	Zarewicz A. <b>Kr.</b>
Warzycki B. 37	Witoszyński T. 16	Zauderer A. 8
Wągrowski K. 13	Wnękowicz S. 58	Zawadil T. <b>L.</b>
Walczyński J. 63	Wohlfeld M. <b>Kr.</b>	Zawadziński S. 67
Waligórski A. 47	Wojtaszek J. <b>Kr.</b>	Zbigniewicz J. 63
Wasylewski T. 49	Wojtkowski J. 55	Zborowski J. 67
Wechsler E. <b>L.</b>	Wójtowicz E. 71	Zengteller L. 42
Wehr W. <b>L.</b>	Wolański K. 58	Zennermann W. 52
Weigel J. <b>L.</b>	Wolfram A. 63	Zgórski K. 62
Weirauch S. 62	Wronski B. 18	Zieleniewski M. <b>Kr.</b>
Weiss A. <b>L.</b>	Wurst A. 26	Ziembicki G. <b>L.</b>
Weissberg Z. 62	Wysocki A. 71	Ziembicki J. <b>Kr.</b>
Węgrzynowski W. 70	Wyspiański G. 57	Ziemiański L. 46
Werner K. 56	Wyszatycki F. 50	Zion O. <b>L.</b>
Wiczowski J. <b>L.</b>		Zirhoffer K. 45
Widmann O. <b>L.</b>	Żagórski A. 52	Zoll J. <b>Kr.</b>
Wienkowski J. 54	Zaleski A. 29	
Wiktor J. <b>L.</b>	Zaleski E. 71	Żelazowski W. 51
Wilkoś A. <b>Kr.</b>	Zaleski K. 54	Żędzianowski S. 67
Willer A. <b>L.</b>	Zaorski B. 6	Żukotyński F. 2
Wilson R. 22	Zaremba A. 14	Żukowski A. 58
Wiszniewski L. <b>Kr.</b>	Zaremba T. <b>Kr.</b>	Żulawski K. <b>Kr.</b>



## SPIS CHIRURGÓW.

Ackerbauer S. 23	Biber M. 46	Elner M. 48
Aderschläger A. <b>L.</b>	Bienenwald S. 71	Ellner S. 72
Aderschläger J. 71	Bigeleisen W. 55	Erychleb J. 67
Adler S. 10	Blaustein E. <b>L.</b>	Eskreis M. 71
Arzt J. 33	Blum Z. 57	
Atlas S. 54	Brand J. 27	
	Brauner J. 62	Feder J. 10
Bandl Z. 25	Brauner L. 15	Feuerstein M. 40
Bardach T. 55	Burnatowicz R. 21	Finkelstein M. 26
Bardasch D. 6		Fischer L. 65
Bardasz M. 51	Chamajdes B. 49	Freudenthal S. 55
Bardon E. 72	Chilf J. 46	Freysinger J. 34
Baumöhl N. 16	Chilf S. <b>L.</b>	Fuchs M. 71
Becher S. 23	Czauderna K. 5.	
Benda A. 50	Czernek H. 7	
Berger A. 56		Gabel H. <b>L.</b>
Berger E. 55		Gabel R. 25
Berko H. 59		Gallasch J. <b>L.</b>
Bernfeld L. 52	Deutsch H. 71	Gasiorowski J. <b>L.</b>
Beschloss M. <b>L.</b>	Dobijasz T. 33	Giselt J. 51
	Dokupil J. <b>L.</b>	Goldscheider J. 49

- Grabscheid M. **L.**  
 Grader M. 58  
 Grünfeld J. 6  
  
**H**and S. 41  
 Hand L. 26  
 Handt J. 2  
 Heinrich J. **L.**  
 Hellman T. 61  
 Herold J. 48  
 Herzum J. 52  
 Hirsch H. 48  
 Hirschhorn F. 71  
 Hladij S. 22  
 Hoffman J. 58  
 Horak K. 32  
 Hradilek E. 65  
**K**elhofer S. 66  
 Kehlhofer S. 17  
 Kibitz B. 48  
 Kibitz N. 48  
 Kiczales H. 26  
 Klaar S. 58  
 Klein D. 74  
 Kluczycki W. 14  
 Knopf S. **L.**  
 Koller J. 18  
 König J. 60  
 Korner W. 38  
 Kostmann J. 47  
 Kräuterblüth J. 60  
 Kreiner E. **L.**  
 Kujłowski L. 16  
 Kuns J. 1  
 Kupka J. 1  
 Kurzer G. 21  
 Kurzer L. 58  
  
**L**andau A. 19  
 Landes L. 21  
 Lateiner L. **L.**  
 Leider D. 6  
 Letz S. **L.**  
 Lisowski M. **L.**  
 Luster H. 53  
 Lucyk J. 71  
  
**M**adejski E. **L.**  
 Margulles E. 22  
 Malina F. 33  
  
 Mantel M. 70  
 Mark S. **L.**  
 Markiel J. 57  
 Masacz J. 29  
 Metal J. 55  
 Minceles L. 5  
 Morecki P. 23  
 Mosler M. 10  
  
**N**agler M. 71  
 Neustein J. 65  
 Nussbaum A. 64  
 Nussbaum M. 6  
  
**O**buszkiewicz S. 59  
 Ostersetzer A. 13  
  
**P**acławski W. 5  
 Peszkowski A. 33  
 Petersil J. 73  
 Philipp H. 64  
 Piotrowski J. 25  
 Pistol D. 29  
 Plahner J. 62  
 Pöller H.  
 Pomeranz F. 22  
 Pomeranz J. 56  
 Pordes J. 71  
 Pordes S. 57  
 Prager M. 38  
 Probst J. 35.  
  
**R**aab H. 38  
 Rager J. 6  
 Raps M. 27  
 Raps M. 71  
 Rares J. 22  
 Reich B. 17  
 Reiner J. 52  
 Reiss A. 23  
 Reiss E. 50  
 Reiss L. 53  
 Reischer J. 69  
 Reisner W. 70  
 Röder E. 29  
 Rosenbaum L. 6  
 Rosenbaum M. 58  
 Rosenberg N. 60  
 Rosenkranz M. **L.**  
 Rosenstock A. 65  
  
 Rosenstock J. 65  
 Rosenöhl J. 17  
 Roth W. 2  
 Rotter A. 12  
 Rotter H. 52  
 Rudich L. 30  
  
**S**akler E. 72  
 Salver J. 46  
 Schabbus E. 37  
 Schenker E. 8  
 Scheps J. 19  
 Schnitzer P. 46  
 Schubert M. 59  
 Siebner N. 22  
 Siegelbaum J. 27  
 Sobelsohn D. 22  
 Sochacki F. 2  
 Spelda A. 1  
 Spiegel E. 24  
 Stangenhaus J. 54  
 Starwer M. 55  
 Stauber A. 29  
 Sternberg B. 2  
 Sternberg J. 47  
 Sternschuss H. 58  
 Stolzenberg K. 50  
 Szymonowicz J. **L.**  
 Szczepkowski T. 58  
  
**T**emple D. 60  
 Ternner H. 29  
 Thalheim J. 23  
 Thumin A. 4  
 Tischner D. 71  
 Tokayer J. 71  
 Trost A. 49.  
  
**U**rich S. 2.  
  
**W**eczerka A. 67  
 Wehrn L. 73  
 Weiss J. **L.**  
 Wieselmann M. 3.  
  
**Z**aleski A. 29  
 Zallik J. 5  
 Zauderer M. 42  
 Zawirski K. **L.**  
 Zrogowski J. **L.**



## OGÓLNE PRZEPISY POCZTOWE.

**Należytość za listy zwyczajne** w całym państwie austr. do wagi 20 gr. ( $\frac{0}{10}$  ł. ct.) jest 5 ct., nad 20 do 250 gr. (15 ł. ct.) 10 ct., listy takie mogą być przy oddaniu opłacone lub nie, a wtenczas za listy niefrankowane do 20 gr. 10 ct., od 20 do 250 gr. 15 ct., listy za mało frankowane podlegają tej samej opłacie, z tą różnicą, że wartość przyklepionych marek odlicza się.

Za listy, które w miejscu doręczane bywają, opłaca się: do 20 gr. 3 ct., od 20 do 250 gr. 6 ct. Za nieopłacone, opłaca odbiorca 6 ct. do 20 gr.; 9 ct. do 250 gr.

Listy kartkowe po 3 ct. dla doręczenia adresatom w miejscu nadania zamieszkałym, jakoteż listy kartkowe po 5 ct., które do wszystkich krajów monarchii austriackiej, Prus i Niemiec przesyłane być mogą.

**Karty korespondencyjne po 2 ct.** mogą być przesyłane do wszystkich krajów monarchii austriackiej, Prus i Niemiec — karty te można wysłać zagranicę z dolepieniem odpowiedniej należytości. Karty korespondencyjne mogą być rekomendowane jak listy za opłatą 10 ct. za rekomendację, lub przyklepieniem marki 10 ct.

**Na listy rekomendowane** otrzymuje się receptis. Należytość rekomendacyjna do wszystkich krajów europejskich wynosi 10 ct., zaś 5 ct. w miejscu nadania (loco).

Jeżeli nadawca po upływie pewnego czasu nie otrzymał odpowiedzi, natenczas ma prawo przy urzędzie nadawczym zrobić zapytanie (reklamację) za opłatą 10 ct. Jeżeli zaś był dołączony receptis zwrotny, natenczas reklamacja nie podlega żadnej opłacie; jeżeli pokaże się, że list zaginął, wtenczas ma prawo żądać wynagrodzenia 20 złr., gdy list był do miejsca w obrębie monarchii położonego adresowany, zaś 21 złr., gdy był za granicę wysłany.

Za granicę muszą być pieczętowane jedną lub dwiema pieczętkami, w kraju zaś mogą być tylko zalepiane. Listy rekomendowane do Prus i Niemiec mogą być posyłane na koszt adresata.

**Druki.** Do państwa Austriackiego, Bośni, Hercegowiny, ks. Lichtenstein oraz Niemiec wynosi opłata: do 50 gr. 2 ct., do 150 gr. 3 ct., do 250 gr. 5 ct., do 500 gr. 10 ct.; do 1 kilogr. 15 ct. Waga nie może przenosić kilogr. (2 fnt. ct.). Niedostatecznie opłaconych druków nie wysyła się, lecz zwrócone są oddawcom.

**Listy pilne.** Jeżeli oddawca życzy sobie, ażeby list natychmiast po odejściu do miejsca przeznaczenia był doręczonym, winien dopisać na kopercie po lewej stronie u dołu „*doręczyć zaraz przez umyślnego posłańca*“ (expres). Za to dopłaca się 15 ct., jeśli adresat mieszka w miejscu, gdzie się znajduje urząd

pocztowy. Za każde  $7\frac{1}{2}$  kilometra (miał) odległości od urzędu pocztowego płaci się posłańcowi 50 ct., zawsze jednak adresat jest odpowiedzialny za uiszczenie przypadającej kwoty. Na kopercie można i godzinę oznaczyć, o której list musi być koniecznie wręczony. — Należność uiszcza się przylepianiem marek odpowiedniej wartości, zaś przy pieniężnych, gotówką. Za doręczenie awiza razem z przesyłką opłata wynosi 30 ct.

### Taryfa opłaty listów.

Do	Należność za opłatę				
	Listy		kor. kart.	Druki	
	za każde gr.	ent.		za każde gr.	ent.
Belgii, Bułgarii, Chin (p. Rosyę)	15	10 5		50	3
Danii i Islandyi . . . . .	"	10 5		50	3
Egiptu . . . . .	do "	" "		do "	"
Niemiec z Alzacyą i Lotarynią,	do 15	5		do 50	2
Helgoland i Luxemburg . . .				" 250	5
	nad 15	10 2		" 500	10
	— 250			" 1000	15
Francyi z Algierem . . . . .	15	10 5		50	3
Gibraltar przez Niemcy . . . .	15	10 5		50	3
Grecyi i wysp Japońskich, Korfu,					
Cefalonia, Zante . . . . .	15	10 5		50	3
Wielkiej Brytanii i Irlandyi . .	15	10 5		50	3
Włoch . . . . .	15	10 5		50	3
Czarnogóry . . . . .	15	7 4		50	2
Niderlandów . . . . .	15	10 5		50	3
Norwegii . . . . .	15	10 5		50	3
Persyi przez Rosyę . . . . .	"	" "		"	"
Portugalii z Maderą i w. Azorskich	15	10 5		50	3
Rumunii (Mołdawii i Wołoszczyzny)	15	10 5		50	3
Rosyi z Polską . . . . .	15	10 5		50	3
Stany Zjednocz. Północn. Ameryki	"	" "		"	"
Szwajcaryi . . . . .	15	10 5		50	3
Serbii (z Węgier) . . . . .	15	5 4		50	2
(z Austrii) . . . . .	15	7 3		50	2
Hiszpanii . . . . .	15	10 5		50	3
Turecyi europ. i azyatyckiej przez					
Tryest, Belgrad, Orsowę . . .	15	10 5		50	3

Listy z pieniędzmi winny być zaopatrzone w kopercie trwałej pięcioma pieczęciami, w urzędowej zaś kopercie dwiema, lub też jeżeli wartość przenosi 500 złr., a waga 250 gramów, przynieść je można na pocztę, ale nie zapieczętowane, aby urzędnik mógł sprawdzić kwotę znajdującą się w nich, wten-

czas jednak portoryum musi być zaraz uiszczone i wynosi 50% więcej, niż zwyczajne.

Gotówkę brzęczącą posyłając, należy obwinąć w papier i przypieczętować wewnątrz koperty, aby się nie poruszała.

**Opakowanie.** Przedmioty małej wartości, którym przyciśnięcie nie szkodzi, nie przepuszczające tłuszczu lub wilgoci, nie przenoszące ciężaru 5 kilogr., na nie wielką odległość pakować można w papier mocny i obwiązać sznurkiem.

**Powziątki pocztowe w kraju** (Nachnahme). Wolno wysyłać przesyłki do wszystkich w kraju poczt monarchii austr., jakoteż węgierskiej za pobraniem do wysokości 500 złr.

**Przekazy pieniężne** (Postanweisungen). Za pośrednictwem urzędów pocztowych można przekazywać wypłaty w kraju do wysokości 500 złr. w. a.

Przesyłający opłaca porto przyklepieniem marki do 10 złr. 5 ent., od 10 do 50 złr. 10 ent., do 150 złr. 20 ct., od 150 do 300 złr. 30 ct., od 300 do 500 złr. 50 ct.

Drogą zaś telegraficzną przyjmują i wypłacają przekazy pieniężne i znaczki pocztowe (Postanweisungen) do wysokości 500 złr. w. a. Przy przesyłkach przekazów drogą telegraficzną opłata pocztowa jest ta sama, co przy przekazach zwykłych, z dodatkiem opłaty depeszy zawisłej od ilości słów.

**Przekazy za granicę** mogą być przesyłane do całych Niemiec, Szwajcarii, Bawarii i Wirtembergu, Bułgarii, Rumunii, Turcji i Egiptu, jako też do Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak również ze wszystkich tych krajów do Monarchii austr. i węgierskiej. Blankiety są inne jak w kraju. Kwoty mogą być przesyłane do wysokości 200 złr. albo 400 marek czyli 500 franków.

**Zlecenia pocztowe.** Za pośrednictwem urzędów pocztowych można ściągać od innych osób drobne wierzytelności do wysokości 500 złr. Blankietów nabywa się w urzędach pocztowych po cenie  $\frac{1}{2}$  centa; a dołączwszy dokument (n. p. weksel, rachunek lub kwit itp., przesyła się w kopercie zapieczętowanej, jako opłacony list polecony pod adresem urzędu pocztowego, gdzie debent mieszka.

W razie uiszczenia kwoty na blankiecie wyrażonej, wydaje poczta adresatowi załączone dokumenta, a pieniądze przesyła wierzycielowi za przekazem, po straceniu zwykłej należności przekazowej.

Zlecenia pocztowe są i do Niemiec dozwolone; w takim razie wierzytelności obliczają się na austriacką monetę wedle kursu wiedeńskiego.

Na jednym blankiecie można najwyżej 5 zleceń naraz wysyłać, ale nie trzeba zapomnieć o dołączeniu dokumentu każdego zlecenia, gdyż w takim razie zlecenie musiałoby być zwrócone bez skutku po upływie dni 14.





## PORADNIK TELEGRAFICZNY.

W depeszach europejskich 15, w poza europ. 10 liter stanowi jedno słowo, wyraz więcej liter liczący, liczy się za dwa. Pięć cyfer w europ., 3 cyfry w poza europ. depeszach, stanowią słowo.

Bliższe oznaczenie, w jaki sposób chce oddawca przesłać depeszę, można w sposób skrócony oznaczać, dwie takie zgłoski liczą się za słowo.

**Mp.** Depesza do rąk własnych adresata.

**D.** Pilno. Depesza taka ma pierwszeństwo przed innemi; (taksa potrójna).

**Rp.** Odpowiedź zapłacona. Należytość zależy od ilości żądanej odpowiedzi.

**Rpd.** Odpowiedź zapłacona pilna. Należytość jak przy depeszy pilnej.

**Xp.** Posłaniec zapłacony.

Na żądanie nadawcy, można otrzymać receptis za opłatą 5 ct.

Nadawca może zażądać wstrzymania depeszy, lub jeżeli już wysłana, wstrzymać doręczenie tejże, w pierwszym przypadku otrzymuje zwrot opłaty po straceniu 25 ct., w drugim przypadku musi nadać nową depeszę.

### Opłata składa się:

- I. W monarchii austro-węg., do ks. Lichtenstein, Bośni, Hercegowiny i do Niemiec za każde słowo 3 ct., opłata musi wynosić najmniej 30 ct., czyli że depesza złożona z mniej niż 10 słów kosztuje tak samo jak 10 słów 30 ct.
- II. Taksa ogólna przy depeszach zagranicznych wynosi 30 ct. a prócz tego za pojedyncze słowo:

Algier i Tunis . . . . .	13 ct.
Ameryka północna . . . . .	57 "
"      południowa . . . . .	4 Złr. 45 "
Anglia . . . . .	13 "
Belgia, Dania i Niderlandy . . . . .	11 "
Czarnogóra, Niemcy Szwajcarya i Serbia . . . . .	4 "
Bułgarya . . . . .	9 "
Egipt . . . . .	84 "
Francya . . . . .	8 "
Greya . . . . .	22 "
Hiszpania i Turcja eur. . . . .	14 "
Holandya . . . . .	11 "
Portugalia . . . . .	17 "
Rumunia . . . . .	6 "
Rosya i Szwecya . . . . .	12 "
Włochy . . . . .	8 "

# SKALA STEMPOWA.

## SKALA I.

na weksle.

				złr. ct.
nad	75	złr.	Do	złr.
			75	—·05
nad	75	złr.	150	—·10
"	150	"	300	—·20
"	300	"	450	—·30
"	450	"	600	—·40
"	600	"	750	—·50
"	750	"	900	—·60
"	900	"	1050	—·70
"	1050	"	1200	—·80
"	1200	"	1350	—·90
"	1350	"	1500	1—
"	1500	"	3000	2—
"	3000	"	4500	3—
"	4500	"	6000	4—
"	6000	"	7500	5—
"	7500	"	9000	6—
"	9000	"	10500	7—
"	10500	"	12000	8—
"	12000	"	13500	9—

Od każdych zaś następnych 1500 złr. o 1 złr. więcej, przyczem jednak kwoty poniżej 1500 złr. uważane będą za pełne.

## SKALA II.

kwity i dokumenta w sprawach prawnych.

				złr. ct.
nad	20	złr.	Do	złr.
			20	—·07
nad	20	złr.	40	—·13
"	40	"	60	—·19
"	60	"	100	—·32
"	100	"	200	—·63
"	200	"	300	—·94
"	300	"	400	1·25
"	400	"	800	2·50
"	800	"	1200	3·75
"	1200	"	1600	5—
"	1600	"	2000	6·25
"	2000	"	2400	7·50
"	2400	"	3200	10—
"	3200	"	4000	12·50
"	4000	"	4800	15—
"	4800	"	5600	17·50
"	5600	"	6400	20—
"	6400	"	7200	22·50
"	7200	"	8000	25—

Nad 8000 złr. od każdych 400 złr. opłaconą być ma n leżytość wraz z nadzwyczajnym dodatkiem po złr. 1 ct. 25. przyczem sumy niżej 400 złr. uważają się jako pełne.

## SKALA III.

ugody pożyczkowe, kontrakty służbowe, kwity na wygrane loteryjne.

				złr. ct.
nad	10	złr.	Do	złr.
			10	—·07
nad	10	złr.	20	—·13
"	20	"	30	—·19
"	30	"	50	—·32
"	50	"	100	—·63
"	100	"	150	—·94
"	150	"	200	1·25
"	200	"	400	2·50
"	400	"	600	3·75
"	600	"	800	5—

				złr. ct.
nad	800	złr.	Do	złr.
			1000	6·25
nad	800	złr.	1200	7·50
"	1000	"	1600	10—
"	1200	"	2000	12·50
"	1600	"	2400	15—
"	2000	"	2800	17·50
"	2400	"	3200	20—
"	2800	"	3300	22·50
"	3200	"	4000	25—
"	3300	"		

Nad 4000 złr. od każdych 200 złr. opłaconą być ma należność wraz z nadzwyczajnym dodatkiem po 1 złr. 25 ct., przyczem sumy niżej 200 złr. uważają się jako pełne.

Andrzej  
c. i k. dostawca  
nadworny



Saxlehner  
właściciel  
źródła słynnego

„Hunyadi János.“

Uznane zalety

# Saxlehner'a

## wody gorzkiej

według orzeczenia powag lekarskich:

**Szybkie, pewne, łagodne  
działanie.**

Przy dłuższem stosowaniu łatwo się znosi.  
Jednostajny i trwały skutek.  
Mała dawka. — Łagodny smak.

**Skarb ten natury** rozbierany i uznany  
przez **Liebig'a, Bunsena, Fresenius'a**  
jest jedynym w swoim rodzaju.

W celu uchronienia się przed naśladownictwem  
uprasza się zwolenników

**naturalnej wody „Hunyadi-Janos“**

zwrócić uwagę, czy na etykiecie i korku jest  
firma :

**„Andreas Saxlehner.“**



# Konstantego Wiszniewskiego

Aptekarza w Krakowie

WYROBY

farmaceutyczno - lekarskie :

**Kołaczyki** (Tabletki) z wyciągiem **Kaskarowym** polecane przez Towarzystwo lekarskie Krakowskie na wniosek komisji tegoż Towarzystwa pismem z dnia 4 kwietnia 1888 r. L. 308 i odznaczone na wystawach krakowskiej i lwowskiej. Jako lek przeczyszczający odszczególnia się od innych środków zawierających aloes, że nie sprawia bólesci i nie osłabia, a pobudza apetyt.

Zażywać można trzy razy dnia po 1, 2 do 3 jednorazowo.

Następnie: **Krażki sublimatowe** po pół i jednym gramie.

Dalej: **Kołaczyki** z różnych przetworów leczniczych stałych, tak organicznych jakoteż i nieorganicznych, przyrządzone na odpowiednim aparacie, przez silne zgniecenie, bez dodatku jakiegokolwiek materji kleistej. Kołaczyk z powodu gładkiej powierzchni położony na języku i popiwszy wodą, łatwo przesliznie się przez gardło bez doznania wstrętnego niekiedy smaku.

Gotowe zawsze na składzie kołaczyki są różnego ciężaru:

**Z Antipiryny, Phenacetyny Dwuwęglanu sody, Bromku, Sody, Węglanu Lityny, Kwasu salicylowego, Chininy, Chloranu potażu, Węglanu Guajakolu, Pyrofosforanu żelaza i sody burzące, z Peptonem żelaza, Morfiny, Korzenia rzewieniowego, Wyciągu Kruszyny, Korzenia Pięciorniku (Tomentilla), Proszku mięsnego, Proszku Kurelli, Pepsyny, Hemoglobiny, Proszku Dowera, z Senesu Aleksandryjskiego, pozbawionego żywicy przez**

wymoczenie w spirytusie, które wyrabiam tak małe, że można i dzieciom podawać.

Następnie **stożki kakaowe** próżne, które mogą być napełnione gliceryną czystą lub też połączone z jodkiem potażu, karbolanem cynku, octanem ołowiu, Ichtyolem, Taliną i t. d.

Również **preciki kakaowe** bardzo cienkie, do których można dodać Jodoformu lub jakikolwiek przetwór leczniczy.

Także **wina lecznicze**, wyrabiane na Maladze lub winie Lakryma Christi, jako to: wino chinowe, wino żelaziste, wino chinowo-żelaziste, wino rzewieniowe, wino rzewieniowo-chinowe, wino kondurangowe, wino peptonowe, wino pepsynowe, wino pięciornikowe, także wino kaskarowe, nie gorzkie i t. d.

Dalej **Odwaniacz** (Płyn desinfekcyjny) środek do usunięcia wszelkiej woni cuchnącej, a bezwonny.

---

---

## TROMMSDORFFA SOLE-SOZOJODOŁOWE

(Sole kwasu Dijodparafenolsulfonowego).

Do użycia w miejsce jodoformu, **bezwonne, łatwo rozpuszczalne, nie trujące. Łatwe do użycia w każdej postaci:** np. jako zasyпка już to szczerzej soli Soz. lub z talkiem, w maści z Lanoliną, jako wata lub gaza Sozójodolowa, w postaci precików i roztworów w rozmaitem stężeniu, we wodzie, Collodium itp. Wielkiej wartości, **do antisept. opatrunku ran, w chorobach skóry, nosa, połyku i krtani, w chorobach chronicznych przewodu usznego, w owrzodzeniach gruźliczych krtani, zapaleniach oka, w wiewiórze, chorobach kobiecych.** Dobre usługi oddaje też w **zapaleniach stawowych i reumatyzmach, w chorobach żołądka, cukrzycy i raku.** Opisów naukowych o dotychczasowych znakomitych skutkach udziela bezpłatnie:


H. TROMMSDORFF, Chemische Fabrik in Erfurt.

**Skład: Wiedeń, I., Rathausstrasse 2.**

# ICHTYOL

stosuje się ze skutkiem:

w chorobach kobiecych i błednicy, w chorobach skóry, narządów trawienia i krążenia, cierpieniach gardła i nosa,



jakoteż w chorobach zapalnych i gośćcowych wszelkiego rodzaju, jużto skutkiem jego własności redukujących, kojących i przeciwnilnych, udowodnionych przez spostrzeżenia kliniczne i doświadczenia, jużteż dzięki jego działaniu przyspieszania resorbcyi i zwiększania przemiany materyi.

Środek ten polecają gorąco klinicyści i wielu lekarzy i używa się go stale w klinikach uniwersyteckich i szpitalach miejskich.

Naukowe rozprawy o Ichtuolu i formułki lecznicze rozsyła darmo i oplatnie:

**Ichtyol-Gesellschaft, Cordes Hermann & C.  
HAMBURG.**



Jodowo-  
solankowe

# ZDROJOWISKO HALL

Wyższa  
Austria

**Najsilniejsza jodowa solanka  
na kontynencie.**

**Znakomite rezultaty** we wszystkich cierpieniach żółzowych, jakoteż w chorobach części rodnych i ich następstwach. **Wyborne urządzenia lecznicze** (kąpiele, picie wód, zawijania, wziewania, mięsienie, kefir). **Stosunki klimatyczne są nadę korzystne**; stacya kolei żelaznej, droga przez Line n. D. (Kremsthalbahn) albo przez Steyr (Steyrthalbahn).

**Sęzon od 15 Maja do 30 Września.**

Dokładne prospekta w rozmaitych językach  
otrzynać można

**w zakładzie zdrojowym w Hall.**

## **W D O M U.**

Każdej chwili wygodnie i tanio urządźć można

**Naturalne solne kąpiele, wziewania, rozpylania itp.**

**za pomocą C. K. HALLEŃSKIEGO ŁUGU SOLNEGO**

sporządzonego w c. k. kopalniach soli przez **Dra Sedlitzy'ego** c. k. aptekarza nadwornego w Saleburgu. Wskazania takie, jak dla naturalnych uzdrowisk solnych, szczególnie **choroby narządów brzusznych** u kobiet, **choroby dzieci** (żółzy) itd. Od r. 1878 polecają go PP. Profesorowie: **K. i. G. Braun, Chrobak, Rokitansky, Späth, Widerhofer** itd.

Stosują go we wszystkich klinikach i szpitalach.

**W Wiedniu:** Główny skład u **Henryka Mattoniego** i **S. Ungara** i we wszystkich aptekach i składach wód mineralnych. 1 kg. 60 ct., paczka 5-kg. 2 złr. 70 ct.

W celu uniknienia pomyłek należy zwracać uwagę na fir. „Hallein“ gdyż według chemicznej analizy **tylko ten ług solny zawiera najważniejsze lecznicze sole**, podczas gdy inne t. z. ługi solne są tylko spłóczynami soli i zawierają 99<sup>9</sup>/<sub>10</sub> soli kuchennej. Analiza i próby bezpłatnie.

# BILIŃSKA SZCZAWA RODZIMA

Najznakomitsza szczawa alkaliczna (zawiera na 1000 części: 33.6339 węglanu sodowego), może zastąpić wodę Vichy w zupełności i używa się: Zewnętrznie w **Artrytyzmie**, **tumor albus**, w **porażeniach**, **neuralgiach**, **impotencji**, wewnątrznie w **nieżytach narządu oddechowego**, **nieżycie oskrzeli**, **Bronchiectasyi**, **naciekach gruźliczych**, **niestrawności**, **nieżycie żołądka**, przy **kwaśnem odbijaniu**, **zgadze**, **kardialgii**, **żółtaczce**, **nieżycie żołądka i dwunastnicy**, **kamieniach żółciowych**, **nieżytach pęcherza**, **kamieniach pęcherzowych**, **Ischuryi i Dysuryi**, **chorobie Bright'a**, **kamieniach nerkowych**, **dnie**, **zastojach krwi**, **haemorrhoidach i zółtach**.

## Rozbiór szczawy Bilińskiej

*przez prof. Dra Hupperta w Pradze.*

na 10.000 części:

Siarkanu potażowego . . . . .	2.3496
„ sodowego . . . . .	7.1917
Chlorku sodu . . . . .	3.8146
Węglanu sodowego . . . . .	33.6339
„ litowego . . . . .	0.1089
„ wapniowego . . . . .	4.1050
„ magnowego . . . . .	1.7157
„ żelazawego . . . . .	0.0279
„ manganowego . . . . .	0.0107
Fosforanu glinowego zasadowego . . . . .	0.0022
Kwasu krzemowego . . . . .	0.4339
Razem części stałych . . . . .	53.3941
Na pół wolnego kwasu węgl. . . . .	16.7323
Kwasu węglowego wolnego . . . . .	14.0921
Razem wszystkich składników . . . . .	81.2185
Kwasu węglowego razem . . . . .	47.5567
Cieężar gatunk. . . . .	1.00663 przy 14° C.
Ciepłota źródła . . . . .	12. 30° C.

**Dyrekcya zdrojowa w Bilin (Czechy).**

# Notatnik

na rok

1893.

KWARTAŁ I.





# STYCZEŃ.

---

**1. Niedziela. Nowy Rok.**

**2. Poniedziałek.**

# STYCZEŃ.

---

**3.** Wtorek.

**4.** Środa.



# STYCZEŃ.

---

**5.** Czwartek.

**6.** Piątek. **Trzech Króli.**

# STYCZEŃ.

---

7. Sobota.

8. Niedziela.

# STYCZEŃ.

---

**9.** Poniedziałek.

**10.** Wtorek.



# STYCZEŃ.

---

**11.** Środa.

**12.** Czwartek.

# STYCZEŃ.

---

**13.** Piątek.

**14.** Sobota.

# STYCZEŃ.

---

**15. Niedziela.**

**16. Poniedziałek.**



# STYCZEŃ.

---

**17.** Wtorek.

**18.** Środa.

# STYCZEŃ.

---

**19.** Czwartek.

**20.** Piątek.

# STYCZEŃ.

---

**21.** Sobota.

**22.** Niedziela.



# STYCZEŃ.

---

**23.** Poniedziałek.

**24.** Wtorek.

# STYCZEŃ.

---

**25.** Środa.

**26.** Czwartek.

# STYCZEŃ.

---

**27.** Piątek.

**28.** Sobota.



# STYCZEŃ.

---

**29. Niedziela.**

**30. Poniedziałek.**

# STYCZEŃ.

---

**31.** Wtorek.

# LUTY.

**1.** Środa.

**2.** Czwartek. **Ocz. NMP.**



# LUTY.

---

**3.** Piątek.

**4.** Sobota.

# LUTY.

---

**5. Niedziela.**

**6. Poniedziałek.**

# LUTY.

---

7. Wtorek.

8. Środa.



LUTY.

---

**9.** Czwartek.

**10.** Piątek.

# LUTY.

---

**11.** Sobota.

**12.** Niedziela.

## LUTY.

---

**13.** Poniedziałek.

**14.** Wtorek.



## LUTY.

---

**15.** Środa.

**16.** Czwartek.

# LUTY.

---

**17.** Piątek.

**18.** Sobota.

# LUTY.

---

**19. Niedziela.**

**20. Poniedziałek.**

# LUTY.

---

**21.** Wtorek.

**22.** Środa.



# LUTY.

---

**23.** Czwartek.

**24.** Piątek.

# LUTY.

---

**25.** Sobota.

**26.** Niedziela.

## LUTY.

---

**27.** Poniedziałek.

**28.** Wtorek.

# MARZEC.

---

**1.** Środa.

**2.** Czwartek.



# MARZEC.

---

**3.** Piątek.

**4.** Sobota.

# MARZEC.

---

**5. Niedziela.**

**6. Poniedziałek.**

# MARZEC.

---

7. Wtorek.

8. Środa.

# MARZEC.

---

**9.** Czwartek.

**10.** Piątek.



# MARZEC.

---

**11.** Sobota.

**12.** Niedziela.

## MARZEC.

---

**13.** Poniedziałek.

**14.** Wtorek.

# MARZEC.

---

**15.** Środa.

**16.** Czwartek.

# MARZEC.

---

**17.** Piątek.

**18.** Sobota.



# MARZEC.

---

**19. Niedziela.**

**20. Poniedziałek.**

# MARZEC.

---

**21.** Wtorek.

**22.** Środa.

# MARZEC.

---

**23.** Czwartek.

**24.** Piątek.

# MARZEC.

---

**25.** Sobota. **Zwiast. NMP.**

**26.** Niedziela.



# M A R Z E C.

---

**27.** Poniedziałek.

**28.** Wtorek.

# MARZEC.

---

**29.** Środa.

**30.** Czwartek.

MARZEC.

---

**31.** Piątek.

ADRESA.

---



ADRESA.

---



Konc. Zakład fabr. wód min. sztucz.

# K. RZĄCY i CHMURSKIEGO

w Krakowie,

przyrządza pod kontrolą komisji przemysłowej  
Towarzystwa lekarskiego

## Wody sztuczne:

Selterska . . . . .	flaszka	18 ct.
Bilińska . . . . .	"	15 "
Gieshüblerska . . . . .	"	10 "
Vichy, Grande-Grille i Celestins		
	flaszka duża	40 ct., mała 25 ct.

## Wody lecznicze:

Bromowa mocn. i słabsza,	flaszka	28 i 20 ct.
Jodowa	"	20 "
Litowa	"	15 "
Żelazista (pyrofosforanowo-żelazista)		mocn.
	i słabsza,	flaszka 25 i 22 ct.
Kwaśna sodowa moc. i słabsza,	flaszka	12 ct.
Hygieniczna sodowa	"	10 "

Przy większych zamówieniach  
przyrządza się i inne wody, tudzież Kumys  
i limonadę magnezyową.

## SKŁAD WIN

szampańskich

i Koniaku musującego.

# Notatnik

na rok

1893.

KWARTAŁ II.





# KWIECIEŃ.

**1.** Sobota.

**2.** Niedziela. W. Zmartw. P.

## K W I E C I E Ń.

---

**3.** Poniedziałek. **Wielk.**

**4.** Wtorek.

# KWIECIEŃ.

---

**5.** Środa.

**6.** Czwartek.



# KWIECIEŃ.

---

7. Piątek.

8. Sobota.

# KWIECIEŃ.

---

**9. Niedziela.**

**10. Poniedziałek.**

# K W I E C I E Ń.

---

**11.** Wtorek.

**12.** Środa.

## K W I E C I E Ń.

---

**13.** Czwartek.

**14.** Piątek.



# KWIECIEŃ.

---

**15.** Sobota.

**16.** Niedziela.

# KWIECIEŃ.

---

**17.** Poniedziałek.

**18.** Wtorek.

# K W I E C I E Ń.

---

**19.** Środa.

**20.** Czwartek.

## KWIECIEŃ.

---

**21.** Piątek.

**22.** Sobota.



## K W I E C I E Ń.

---

**23.** Niedziela.

**24.** Poniedziałek.

# K W I E Ć I E Ń.

---

**25.** Wtorek.

**26.** Środa.

## KWIECIEŃ.

---

**27.** Czwartek.

**28.** Piątek.

# KWIECIEŃ.

---

**29.** Sobota.

**30.** Niedziela.



**1.** Poniedziałek.

**2.** Wtorek.

**3.** Środa.

**4.** Czwartek.

**5.** Piątek.

**6.** Sobota.

**7. Niedziela.**

**8. Poniedziałek. Stan. b.**



**9.** Wtorek.

**10.** Środa.

**11.** Czwartek. **Wniebow. P.**

**12.** Piątek.

**13.** Sobota.

**14.** Niedziela.

**15.** Poniedziałek.

**16.** Wtorek.



**17.** Środa.

**18.** Czwartek.

**19.** Piątek.

**20.** Sobota.

**21. Niedziela. Zesł. Ducha ś.**

**22. Poniedziałek Świąt.**

**23.** Wtorek.

**24.** Środa.



M A J.

---

**25.** Czwartek.

**26.** Piątek.

M A J.

---

**27.** Sobota.

**28.** Niedziela. ŚŚŚ. Trójcy.

# M A J.

---

**29.** Poniedziałek.

**30.** Wtorek.





# CZERWIEC.

---

**1.** Czwartek. **Boże Ciało.**

**2.** Piątek.

# CZERWIEC.

---

**3.** Sobota.

**4.** Niedziela.

## CZERWIEC.

---

**5.** Poniedziałek.

**6.** Wtorek.

## CZERWIEC.

---

**7.** Środa.

**8.** Czwartek.



## CZERWIEC.

---

**9.** Piątek.

**10.** Sobota.

## CZERWIEC.

---

**11. Niedziela.**

**12. Poniedziałek.**

## CZERWIEC.

---

**13.** Wtorek.

**14.** Środa.

## CZERWIEC.

---

**15.** Czwartek.

**16.** Piątek.



# CZERWIEC.

---

**17.** Sobota.

**18.** Niedziela.

## CZERWIEC.

---

**19.** Poniedziałek.

**20.** Wtorek.

## CZERWIEC.

---

**21.** Środa.

**22.** Czwartek.

## CZERWIEC.

---

**23.** Piątek.

**24.** Sobota.



## CZERWIEC.

---

**25. Niedziela.**

**26. Poniedziałek.**

## CZERWIEC.

---

**27.** Wtorek.

**28.** Środa.

## C Z E R W I E C.

---

**29.** Czwartek. **Piotra i P.**

**30.** Piątek.

ADRESA.

---



# ADRESA.

---



# LUDWIK KNAPIŃSKI

W KRAKOWIE

Rynek Nr. 44. (Linia A—B).

## PIERWSZA KRAJOWA FABRYKA

narzędzi chirurgicznych,  
bandaży,  
przyrządów ortopedycznych.

Odznaczona wielkim medalem srebrnym  
na WYSTAWIE LEKARSKIEJ W KRAKOWIE  
w r. 1891.

Posiada największy aparat do niklowania.

Przyjmuje wszelkiego rodzaju narzędzia  
ostre i tępe: do ostrzenia, niklowania i prze-  
rabiania w oprawy metalowe.

Podejmuje się najdokładniejszego wyko-  
nania nowych narzędzi, według rysunków lub  
wzorów.

Wszelkie miejscowe i zamiejscowe za-  
mówienia, reparacye, uskutecznia po cenach  
umiarkowanych, w jak najkrótszym czasie, rę-  
cząc za dobroć i dokładność wykonania.

# Notatnik

na rok

1893.

KWARTAŁ III.





# LIPIEC.

---

**1.** Sobota.

**2.** Niedziela.

# LIPIEC.

---

**3.** Poniedziałek.

**4.** Wtorek.

# LIPIEC.

---

**5.** Środa.

**6.** Czwartek.



# LIPIEC.

---

7. Piątek.

8. Sobota.

# LIPIEC.

---

**9. Niedziela.**

**10. Poniedziałek.**

L I P I E C.

---

**11.** Wtorek.

**12.** Środa.

# LIPIEC.

---

**13.** Czwartek.

**14.** Piątek.



L I P I E C.

---

**15.** Sobota.

**16.** Niedziela.

# LIPIEC.

---

**17.** Poniedziałek.

**18.** Wtorek.

# LIPIEC.

---

**19.** Środa.

**20.** Czwartek.

# LIPIEC.

---

**21.** Piątek.

**22.** Sobota.



# LIPIEC.

---

**23. Niedziela.**

**24. Poniedziałek.**

# LIPIEC.

---

**25.** Wtorek.

**26.** Środa.

# LIPIEC.

---

**27.** Czwartek.

**28.** Piątek.

# LIPIEC.

---

**29.** Sobota.

**30.** Niedziela.



# LIPIEC.

---

31. Poniedziałek.

# SIERPIEŃ.

---

**1.** Wtorek.

**2.** Środa.

# SIERPIEŃ.

---

**3.** Czwartek.

**4.** Piątek.

# SIERPIEŃ.

---

**5.** Sobota.

**6.** Niedziela.



# SIERPIEŃ.

---

**7.** Poniedziałek.

**8.** Wtorek.

# SIERPIEŃ.

---

**9.** Środa.

**10.** Czwartek.

# SIERPIEŃ.

---

**11.** Piątek.

**12.** Sobota.

# SIERPIEŃ.

---

**13. Niedziela.**

**14. Poniedziałek.**



# SIERPIEŃ.

---

**15.** Wtorek. **Wnieb. NMP.**

**16.** Środa.

# SIERPIEŃ.

---

**17.** Czwartek.

**18.** Piątek.

# SIERPIEŃ.

---

**19.** Sobota.

**20.** Niedziela.

## SIERPIEŃ.

---

**21.** Poniedziałek

**22.** Wtorek.



# SIERPIEŃ.

---

**23.** Środa.

**24.** Czwartek.

# SIERPIEŃ.

---

**25.** Piątek.

**26.** Sobota.

# SIERPIEŃ.

---

**27. Niedziela.**

**28. Poniedziałek.**

# SIERPIEŃ.

---

**29.** Wtorek.

**30.** Środa.



# SIERPIEŃ.

---

**31.** Czwartek.

# WRZESIEŃ.

---

**1.** Piątek.

**2.** Sobota.

# WRZESIEŃ.

---

**3. Niedziela.**

**4. Poniedziałek.**

# WRZESIEŃ.

---

5. Wtorek.

6. Środa.



# WRZESIEŃ.

---

**7.** Czwartek.

**8.** Piątek. **Narodz. NMP.**

# WRZESIEŃ.

---

**9.** Sobota.

**10.** Niedziela.

# WRZESIEŃ.

---

**11.** Poniedziałek.

**12.** Wtorek.

# WRZESIEŃ.

---

**13.** Środa.

**14.** Czwartek.



# WRZESIEŃ.

---

**15.** Piątek.

**16.** Sobota.

# WRZESIEŃ.

---

**17. Niedziela.**

**18. Poniedziałek.**

# WRZESIEŃ.

---

**19.** Wtorek.

**20.** Środa.

## WRZESIEŃ.

---

**21.** Czwartek.

**22.** Piątek.



# WRZESIEŃ.

---

**23.** Sobota.

**24.** Niedziela.

## WRZESIEŃ.

---

**25.** Poniedziałek.

**26.** Wtorek.

# WRZESIEŃ.

---

**27.** Środa.

**28.** Czwartek.

# WRZESIEŃ.

---

**29.** Piątek.

**30.** Sobota.



ADRESA.

---



# Alfred Biasion

w Krakowie, Rynek gł. Nr. 14 I piętro, (firma zał. w r. 1801).

## FABRYKA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

BANDAŻY i MASZYN ORTOPEDYCZNYCH.

## GŁÓWNY SKŁAD PRZYBORÓW OPATRUNKOWYCH

antyseptycznych do pielęgnowania chorych.

Dostawca c. k. Klinik, Uniw. Jagiell., Szpitali  
i c. k. Kolei państwowych.

Odznaczony 8 medalami i nagrodą c. k. Ministerstwa Handlu.

(Własnoręczne poświadczenia WW. pp. Profesorów za dokładne wykonywanie zleceń do przejrzenia poleca:

**Narzędzia chirurgiczne najnowszych konstrukcyj**, maszyny ortopedyczne, nogi sztuczne i szczudła, **gorsety przeciw skoliozie** wszelkich systemów, pasy przepuklinowe i brzuszne kobiece, **pończochy gumowe**, przybory dla szpitali i pielęgnowania chorych, **przyrządy elektryczne** z prądem stałym i przerywanym, **Mikroskopy** do badań achromatyczne, **Termometry Maxim-minut**, (najnowsze każdy stopień podzielony na 50). **Katetery** i **bougie**, strzykawki do ran, i **Prawatza**, oraz wszelkie przybory szklanne, irygatory, hegary i klizopompy kompletne, **brzytwy**, **scyzoryki** i **nożyczki** własne i angielskie, **prezerwatywy**, **pessaria**, **occlusiva**, płótno gumowe na podkłady, **poduszki gumowe** i **materace** do napełnienia powietrz. i wodą, **bandaże** z flaneli, kaliko, organtyny i muślinu, torby i etui na narzędzia, stoły szklanne i szafki na narzędzia, **fotele dla chorych** do zamieniania w łóżko, **skrzynie ratunkowe** do nagłych opatrunków, przyrządy do **hypodermoklizy**, **enteroklizy** i **infuzji**, **pasy dla kobiet menstruacyjne** „**DIANA**“ z wkładami antyseptycznymi.

Przy większych zamówieniach udzielam WW. pp. lekarzom za poprzednią umową spłaty ratami.

**Narzędzia nadsyłane** do wypalania, ostrzenia lub naprawy uskuteczniają się natychmiast z gwarancją dokładnego wykonania. Na żądanie przesyłam najnowszy **cennik polski** **illustrowany**.  
**Ceny fabryczne niskie, zamówienia odwrotnie.**

# Notatnik

na rok

1893.

KWARTAŁ IV.





# PAŹDZIERNIK.

---

**1. Niedziela. NMP. Róż.**

**2. Poniedziałek.**

# PAŹDZIERNIK.

---

**3.** Wtorek.

**4.** Środa.

# PAŹDZIERNIK.

---

**5.** Czwartek.

**6.** Piątek.



# PAŹDZIERNIK.

---

**7.** Sobota.

**8.** Niedziela.

# PAŹDZIERNIK.

---

**9.** Poniedziałek.

**10.** Wtorek.

# PAŹDZIERNIK.

---

**11.** Środa.

**12.** Czwartek.

# PAŹDZIERNIK.

---

**13.** Piątek.

**14.** Sobota.



# PAŹDZIERNIK.

---

**15. Niedziela.**

**16. Poniedziałek.**

# PAŹDZIERNIK.

---

**17.** Wtorek.

**18.** Środa.

# PAŹDZIERNIK.

---

**19.** Czwartek.

**20.** Piątek.

# PAŹDZIERNIK.

---

**21.** Sobota.

**22.** Niedziela.



# PAŹDZIERNIK.

---

**23.** Poniedziałek.

**24.** Wtorek.

# PAŹDZIERNIK.

---

**25.** Środa.

**26.** Czwartek.

# PAŹDZIERNIK.

---

**27.** Piątek.

**28.** Sobota.

# PAŹDZIERNIK.

---

**29. Niedziela.**

**30. Poniedziałek.**



# PAŹDZIERNIK.

---

31. Wtorek.

# LISTOPAD.

---

**1. Środa. Wszystkich ŚŚ.**

**2. Czwartek.**

# LISTOPAD.

---

**3.** Piątek.

**4.** Sobota.

# LISTOPAD.

---

**5. Niedziela.**

**6. Poniedziałek.**



# LISTOPAD.

---

7. Wtorek.

8. Środa.

# LISTOPAD.

---

**9.** Czwartek.

**10.** Piątek.

# LISTOPAD.

---

**11.** Sobota.

**12.** Niedziela.

# LISTOPAD.

---

**13.** Poniedziałek.

**14.** Wtorek.



# LISTOPAD.

---

**15.** Środa.

**16.** Czwartek.

# LISTOPAD.

---

**17.** Piątek.

**18.** Sobota.

# LISTOPAD.

---

**19. Niedziela.**

**20. Poniedziałek.**

# LISTOPAD.

---

**21.** Wtorek.

**22.** Środa.



# LISTOPAD.

---

**23.** Czwartek.

**24.** Piątek.

# LISTOPAD.

---

**25.** Sobota.

**26.** Niedziela.

# LISTOPAD.

---

**27.** Poniedziałek.

**28.** Wtorek.

# LISTOPAD.

---

**29.** Środa.

**30.** Czwartek.



# GRUDZIEŃ.

---

**1.** Piątek.

**2.** Sobota.

# GRUDZIEŃ.

---

**3. Niedziela.**

**4. Poniedziałek.**

## GRUDZIEŃ.

---

**5.** Wtorek.

**6.** Środa.

# GRUDZIEŃ.

---

**7.** Czwartek.

**8.** Piątek. **Niep. Pocz. NP.**



# GRUDZIEŃ.

---

**9.** Sobota.

**10.** Niedziela.

## GRUDZIEŃ.

---

**11.** Poniedziałek.

**12.** Wtorek.

## GRUDZIEŃ.

---

**13.** Środa.

**14.** Czwartek.

# GRUDZIEŃ.

---

**15.** Piątek.

**16.** Sobota.



# GRUDZIEŃ.

---

**17. Niedziela.**

**18. Poniedziałek.**

# GRUDZIEŃ.

---

**19.** Wtorek.

**20.** Środa.

# GRUDZIEŃ.

---

**21.** Czwartek.

**22.** Piątek.

# GRUDZIEŃ.

---

**23.** Sobota.

**24.** Niedziela.



## GRUDZIEŃ.

---

<b>25.</b> Poniedziałek. <b>B. Nar.</b>	<b>26.</b> Wtorek. <b>Szczepana m.</b>
---	--

# GRUDZIEŃ.

---

**27.** Środa.

**28.** Czwartek.



# GRUDZIEŃ.

**29.** Piątek.

**30.** Sobota.



# GRUDZIEŃ.

---

**31. Niedziela.**



ADRESA. D

---



**Pierwsza krajowa fabryka  
opatrunków cbirurgicznych  
M. L. DOBRZEWOLSKIEGO  
magistra i.armacji,  
w Nowej Wsi przy Krakowie,  
poczta Łobzów,**

nagrodzona medalem srebrnym na Wystawie  
krajowej 1887 r.,

premiowana dyplomem honorowym  
na Wystawie przyrodniczo-lekarskiej 1888 r.,  
zostająca pod kontrolą

**Komisji Przem. krak. Tow. lekarskiego,**  
polecona przez

**krakowskie Towarzystwo lekarskie,**

wyrabia i sterylizuje wszystkie opatrunki  
antyseptyczne, a dostarcza je niżej cen fa-  
bryk zagranicznych. Sporządza też niektóre  
przetwory farmaceutyczne oraz środki dez-  
infekeyjne, jak: wapno karbolowe, torf kar-  
bolowy i sublimatowy, a oblicza je przy  
hurtownym odbiorze nadzwyczaj tanio.

**Cenniki przesyła na żądanie.**

**PP. Aptekarzom, Lekarzom i Zarządcom szpitali,  
przy znacznych stałych odbiorach opatrunków,  
robi specjalne nizkie oferty.**